

# جواہر ہومیوپیتھی

28

"شکر"



ہومیوپیتھک ڈاکٹر مسعود ایم صدیقی  
ایم اے ڈی ایچ ایم ایس

ریڈرز پبلیکیشنز

لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم ○

## پیش لفظ

شفا منجانب اللہ ہے۔  
انسانی جسم کو اس کے خالق نے کچھ اس طرح بنایا ہے کہ جیسے ہی جسم کے اعضا کے افعال میں کسی قسم کا نقص پیدا ہوتا ہے تو اس کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں اور اگر ان علامات کی بنیاد پر مرض کی بروقت تشخیص و علاج کر لیا جائے تو شفا یابی حاصل کی جاسکتی ہے۔  
عام زندگی میں دیکھا گیا ہے کہ ایلوپیتھک طریقہ علاج سے مایوس ہو کر اکثر مریض ہومیو پیتھک طریقہ علاج کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہومیو پیتھ ڈاکٹر صحیح تشخیص کر کے مرض کا اصل سبب تلاش کر لے اور علامات کی بنیاد پر صحیح اور متعلقہ دوا تجویز کر لے تو ہومیو پیتھک ادویات اپنا جادوئی اور تیر بہدف اثر دکھاتی ہیں۔  
کسی بھی قسم کی کوئی بیماری یا حادثہ زندگی میں کسی بھی وقت اور کہیں بھی پیش آ سکتا ہے اور اگر اس کا بروقت اور صحیح علاج کر لیا جائے تو صحت یابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اسی امر کو پیش نظر رکھتے ہوئے زیر نظر کتاب کو اتنا آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عام آدمی جو طبی اصطلاحات سے بھی واقف نہ ہو اس کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے۔  
اس کتاب میں اعضاء انسانی اور مرض کی مناسبت سے مختصر علامات بیان کر کے متعلقہ دوا تجویز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت اور دوا کی خوراک کا وقفہ بھی بیان کر دیا گیا ہے تاکہ ہومیو ڈاکٹرز کے علاوہ عام آدمی کو بھی دوا تجویز کرنے میں آسانی ہو۔  
امید ہے کہ ہومیو پیتھک طریقہ علاج سے دلچسپی رکھنے والے حضرات اس کتاب کو مفید و معاون پائیں گے۔

مسعود ایم صدیقی

# فہرست

- 66 ○ آنسو/ آنکھوں سے پانی بہنا  
67 ○ بصارت کی تکلیفات  
71 ○ لکڑے  
72 ○ ناخونہ  
73 ○ آنکھ کے پردے کی تکلیفات  
75 ○ گوبانجی/ انجن ناری  
77 ○ اندھا پن  
79 ○ بھیگا پن  
80 ○ ناک  
83 ○ نکسیر  
85 ○ ٹھنڈ/ نزہ زکام  
89 ○ انفلو انزا  
90 ○ نزلے زکام کے ساتھ بخار  
92 ○ چھینکیں  
92 ○ الرجی سے ناک میں درم  
93 ○ ناک کے سے  
95 ○ کان کا بہنا  
98 ○ کان کا درد/ سوزش  
99 ○ کن پیزے/ گل سوئے  
101 ○ زائدہ حلیمہ/ کپٹی کی ہڈی کا ابھار  
102 ○ کان کا گومڑا/ مسہ  
102 ○ بہرہ پن  
104 ○ کان کا میل  
105 ○ درم زرخہ/ آلہ صوت کی سوزش  
108 ○ سوزش حلقوم  
109 ○ درم آلود گلا  
110 ○ گلے کے غدود کا درم  
113 ○ آواز یا گلا بیٹھنا  
11 ○ حسایت/ قوت ادراک  
15 ○ سر درد  
18 ○ درد شقیقہ (آدھے سر کا درد)  
20 ○ سر چکراتا  
23 ○ بالوں کا گرنا  
25 ○ وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہو جانا  
27 ○ سر کی خشکی/ سرکی  
29 ○ جوئیں  
30 ○ دماغی خلل  
32 ○ مخبوط الحواسی/ پاگل پن  
35 ○ جنون  
○ استقا الدماغ (دماغ کے پردوں میں پانی آ جانا)  
36 ○ دماغ کی مصلیوں/ پردوں کا درم  
39 ○ دماغ کی سوزش  
41 ○ دل  
42 ○ دل کا دھڑکنا  
43 ○ دل کی ارد گرد کی شرائن، وریدیں  
44 ○ رگیں، نالیاں، خون کے چھپھڑے  
46 ○ بلند فشار خون  
49 ○ خون کا کم دباؤ  
50 ○ دل بیٹھنا یا دم گھٹنا (سینے کا درد)  
54 ○ آنکھ  
59 ○ آنکھوں میں جلن  
60 ○ بامنی (پلکوں کی سوجن)  
62 ○ آشوب چشم  
63 ○ انگوڑی پردے کا درم  
65 ○ پردہ قرنیہ کا درم



171	○ حلی کی تکلیفات	116	○ خرائٹ بھرا
173	○ لیبے کی تکلیفات	117	○ خراہٹ
174	○ بد ہضمی	120	○ گلے اور ناک کا ٹسے اور غدد
177	○ ضعف معدہ/بد ہضمی	122	○ زبان کی تکلیفات
178	○ آلات ہاضمہ کے زخم	124	○ منہ کی خشکی
180	○ حلی	125	○ منہ کے چھالے
182	○ ریاخ/بادی/ہوا کا بننا	127	○ منہ کے زخم/چھالے
184	○ ڈکاریں	128	○ زائتہ
185	○ غذا/کھانے کی بد ہضمی	129	○ سانس کی بدبو
186	○ بھوک مرجانا	129	○ تھوک
188	○ اشتہا/بھوک	131	○ ہکھانا/تلتانا
189	○ تیزابیت	133	○ دانت
191	○ پیٹ کا درد	134	○ دانت ٹکنا
193	○ اسہال/دست/گیس	135	○ دانتوں کا درد
196	○ پیچش	138	○ مسوڑھوں کی بیماریاں
199	○ قبض	139	○ مسوڑھوں سے خون جاری ہونا
201	○ تے/الٹیاں	140	○ پائوڑیا/مسوڑھوں سے پیپ آنا
203	○ بیضہ	142	○ سکروی
205	○ بچوں کا بیضہ	143	○ سانس رک جانا
206	○ مقعد کا سرک جانا (کاچ ٹکنا)	146	○ دم
208	○ کرم/کیرے	151	○ ہوا کی نالیوں کا پھیلاؤ
210	○ بوایر/خشک سے		○ ذات الجنب/بھسکڑے کے پردے
213	○ ہرنیا/فتق/آنت بڑھ جانا	152	○ کی سوزش
215	○ مقعد کا لمبا پھوڑا	154	○ کھانسی/گلا بیٹھنا
216	○ ناسور مقعد	159	○ مزمن کھانسی
218	○ درم قولون/بڑی آنت کا درم	161	○ کھانسی (حاد)
219	○ درد قولنج/مروڑ	163	○ خشک کھانسی
221	○ بوایر/بوایر کے مہاسے	164	○ کالی کھانسی
223	○ درم زائیدہ	166	○ یرقان
225	○ فضلے/پاخانے کی تکلیفات	169	○ پتے میں پتھری کا درد



287	○ شدید کھلی	229	○ مٹانے کی پتھری
	○ پیپ والے 'سادہ' گوشت خور	231	○ مٹانے کے غدود کی تکلیفات
289	○ پھوڑے	233	○ گردے کی پتھری
295	○ جسم کی بو	236	○ سوزش / درم گردہ
	○ جسم میں کسی چیز کے چبھ جانے کی	239	○ مٹانے کی سوزش
296	○ تکلیف	240	○ مٹانہ اور پیشاب کی نالی کی سوزش
296	○ فانی لیریا	242	○ بخار (سادہ)
298	○ چکتے	244	○ لمیریا (بخار)
301	○ زہریلا گلہڑ	254	○ نمونیہ
302	○ کھیکھ	256	○ تپدق
304	○ بانٹ کا گلنا سڑنا	250	○ تپ محرقہ
306	○ ناسور / زخم	257	○ لال بخار
309	○ زہر کے اثرات	258	○ ڈینگو (ہڈ توڑ بخار)
310	○ کوڑھ / جذام		○ پیپ یا زہریلے مادے سے آنے
312	○ پھل بہری / سفید داغ	259	○ والا بخار
313	○ جلنا	261	○ پرسوت کا بخار
314	○ کیرے اور جانوروں کا کائنا	263	○ جلدی امراض
316	○ بستر کے زخم	264	○ سرخ باد
317	○ زخم کے ریشہ دار ابھار	266	○ مہاسے / چہرے کے دانے پھنسیاں
319	○ چونیس / زخم	268	○ گرمی دانے
322	○ داد	270	○ داد / چنبل
323	○ کاکڑا لا کڑا	273	○ آبلے / چھالے
324	○ خسرو	274	○ بھری / بلٹوہا / انگل بھیڑا
327	○ چچک	274	○ سے
329	○ کمر / ریڑھ کی تکلیفات	277	○ پتی / چھپاکی
332	○ درد کمر	280	○ چنڈی / گدی / کیل 'ابھار
335	○ ریڑھ کے مہروں میں پیپ پڑ جانا	281	○ بوائیاں
337	○ اعصاب 'پنوں کا تناؤ	282	○ خشک خارش
338	○ ہڈی ٹوٹنا / ہڈیوں کے زخم	284	○ تر خارش
	○ ریڑھ کے ستون کے مہروں کی	286	○ پیپ / بھنسیوں والی خارش

422	○ دوران حمل کی تکلیفات	339	سوزش / تکلیفات
	○ عورتوں میں خواہش جماع کا	345	○ چینی اترنا، ڈھکن سرک جانا
423	غیر معمولی جذبہ	349	○ وجع الفاصل
426	○ موقوفیء حیض	355	○ درد اعصاب
428	○ دودھ کے غدود کی تکلیفات	357	○ ورم اعصاب
430	○ چھاتی سے دودھ دینا	358	○ عرق النساء / لنگڑی کا درد
431	○ درد زہ / زچگی کی دردیں	361	○ پیشاب کی تکلیفات
434	○ اسقاط حمل	366	○ بول الدم
439	○ جنسی خواہش (زنانہ)	368	○ پیشاب نکل جانا
441	○ بانجھ پن	370	○ بول زلالی (الیومن)
443	○ رعشہ (پنوں میں کچاؤ)	372	○ ذیابیطس
445	○ کینسر	374	○ جلق (مشت زنی)
448	○ خون کی کمی	376	○ جریان منی
450	○ ادھرنگ / فالج	377	○ احتلام، سرعت انزال
453	○ مرگی	379	○ جنسی خواہش (مردانہ)
455	○ رسول	381	○ ایستادگی / مباشرت
457	○ پیٹ کی جھلی کی سوزش	384	○ اعضاء تناسل کی خارش
459	○ پسینہ	389	○ خضیوں کی سوزش
463	○ موٹاپا	390	○ خضیوں کی تحلی میں پانی آ جانا
465	○ حالت نزاع	392	○ آتشک
467	○ بے ہوشی	395	○ سوزاک
469	○ بے حسی	397	○ نامردی
471	○ نمکینی / افسردگی	400	○ حیض / ماہواری
473	○ سکتہ	408	○ سیلان الرحم
475	○ پریشانی	411	○ رحم کی تکلیفات
477	○ زود حسی / گھبراہٹ	413	○ خصیت الرحم کی تکلیفات
479	○ رونا	418	○ رحم کا سرک جانا
483	○ غصہ / جھنجھلاہٹ	419	○ رحم کا مس
485	○ خودکشی کا رجحان		○ آپریشن سے پہلے اور بعد کے لئے
487	○ بے خوابی / نیند نہ آنا	420	○ احتیاطی دوائیں

- 534 ○ سوکھیا مسان
- 537 ○ تمباکو نوشی
- 538 ○ نشے کی عادت
- 538 ○ نشے کے اثرات بد
- 540 ○ نشہ چھڑانے کے لئے ادویات
- 541 ○ نبض کی تکلیفات
- 543 ○ بائیں جانب کی ادویات
- 545 ○ دائیں جانب کی ادویات
- مختلف اوقات میں مرض میں
- 546 ○ کمی بیشی
- 548 ○ صبح کے وقت کی تکلیفات
- 549 ○ متضاد نوعیت کی علامات
- کچھ وقفے کے بعد پرانی علامات
- 551 ○ ظاہر ہونے کا رجحان
- 553 ○ امراض کو دبائے جانے کے اثرات
- 555 ○ مانع امراض ادویات
- 557 ○ خصوصی علامات کے حامل امراض
- 558 ○ انسدادی ٹیکے کے امراض
- 559 ○ پیشہ ورانہ امراض
- 489 ○ خواب
- 491 ○ بھیانک خواب
- 493 ○ پانی سے خوف (مرگی جیسی علامات)
- 494 ○ حساسیت (الرجی)
- 497 ○ خواہش / پسندیدگی
- 498 ○ ناپسندیدگی / نفرت
- 501 ○ اوسے نوفیلیا
- ناک کی ہڈی کی تکلیف
- (ناک بند ہونا)
- 503 ○ غددوں کی بیماریاں
- 504 ○ ہچک
- 506 ○ ہسٹریا / باؤگولہ
- 507 ○ دورے
- 509 ○ خوف / ڈر
- 510 ○ جمائیاں
- 512 ○ لو لگنا
- 514 ○ لو لگنے کے اثرات
- 515 ○ سوزی بیماریاں
- 517 ○ پیاس ندارد
- 518 ○ شدید پیاس
- 518 ○ خوبصورتی کی ہلکی ضربیں
- 519 ○ چلنے کا انداز
- 521 ○ لاغری
- 523 ○ چہرے کی جلد کا دق
- 524 ○ ناخن کی تکلیفات
- 525 ○ کزاز / چاندنی بدن اکڑ جانا (ٹیسس)
- 527 ○ حرارت کی تبدیلی
- 529 ○ کہنی کا تھو
- 531 ○ خبیث
- 532 ○ دانت گرنا
- 533 ○ دانت گرنا





# حسایت / قوت ادراک

## Sensations

حسایت اور قوت ادراک اچھی صفات ہیں لیکن بعض دفعہ عام آدمی یا کوئی مریض بلاوجہ کے احساسات اور وہموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے نفساتی مرض کہا جاتا ہے جس میں کچھ عجیب و غریب سے محسوسات، خیالات، شکوک و شبہات اور وہم پیدا ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کا سبب اعصابی تناؤ، اعصابی کمزوری، ذہنی پریشانی، دماغ پر چوٹ، غم و غصہ، گھریلو فکرات، کاروباری الجھنیں خوف و خدشات، فاقہ کشی، مذہبی تعصبات، حافظے کی کمزوری اور پست حوصلگی وغیرہ ہو سکتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ دل کی حرکت رکتی ہوئی محسوس ہو۔  
سکوٹا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ کسی بلندی یا کسی جگہ سے گرنے کا احساس۔  
بیلا ڈونا 200 'ہفتہ وار' تین مرتبہ
- ☆ کپکپی کا احساس۔ چلنے سے آفاقہ محسوس ہو۔  
ڈروسرا 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ چھاتی سے پیٹ یا معدے میں گرم پانی ٹپکنے کا احساس۔  
سگونییریا 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ کسی دوسرے کے بستر میں ہونے کا احساس۔  
پروڈیم 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ ایسا محسوس ہو کہ تمام چیزیں اور تمام لوگ کالے ہیں۔  
سٹرامونیم 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ ایسا محسوس ہو کہ خوراک یا گلے کی نالی سے پانی باہر نکلا پڑ رہا ہے۔

ورائرزم الیم 200 یا 1M چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ ایسا محسوس ہو کہ بستر میں کھٹل رینگ رہے ہیں۔ بستر بہت سخت محسوس ہو۔ کھوپڑی میں مغز حرکت کرتا ہوا محسوس ہو۔ سخت بے چینی اور پریشانی ہو۔

آرسنک الیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ دوہرے وجود کا احساس۔ ایسا محسوس ہو کہ وقت اور فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔

کنابلس انڈیکا 200 یا 1M چار گھنٹے  
بعد تین مرتبہ

☆ جھنجھناہٹ کا احساس۔ چہنے اور چھرا لگنے کا احساس۔ سن ہونے کا احساس۔

اکونائٹ نیپلس 30 یا 200 چار گھنٹے  
بعد تین مرتبہ

☆ ایسا محسوس ہو کہ وہ منتشر ہو رہا ہے یا بکھر رہا ہے۔

ہیشیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد تین  
مرتبہ

☆ کمرے میں کتے یا بلی ادھر ادھر دوڑتے ہوئے محسوس ہوں۔

ایتھوزاسناپیم 200 یا 1M ہفتہ میں  
تین مرتبہ

☆ ایسا محسوس ہو کہ پیٹ میں کیڑے رینگ رہے ہیں۔

کوکولس انڈیکا 200 چار گھنٹے بعد تین  
مرتبہ

☆ بستر میں جب کروٹ لے تو ایسا محسوس ہو کہ پانی کی مشک یا تھیلا مڑ رہا ہے۔

ادرنی تھوکیلیم 200 یا 1M چار گھنٹے  
بعد تین مرتبہ

☆ جسم میں ٹھنڈے پانی کا احساس۔

رہنن کولس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

- ☆ ایسا محسوس ہو کہ اس کا وجود اس دنیا کے لئے نامناسب ہے۔  
اورم میٹلیکم 200 یا 1M ہفتہ وار  
تین مرتبہ
- ☆ ایسا محسوس ہو کہ مریض اجنبی جگہ پر ہے۔  
اوپیم 200 یا 1M چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ
- ☆ ایسا محسوس ہو کہ کتا گوشت اور ہڈیاں مٹھوڑ رہا ہے۔  
ٹائٹریک ایسڈ 200 یا 1M چار گھنٹے  
بعد  
تین مرتبہ
- ☆ ایسا محسوس ہو کہ کمرہ بہت چھوٹا ہے۔  
سائیکل من 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ
- ☆ ٹانگ کے اوپر چوہا دوڑتا ہوا محسوس ہو۔  
ایبلنٹس 30 یا 200 ہفتہ وار  
تین مرتبہ
- ☆ ایسا محسوس ہو کہ بازوؤں اور لاتوں پر چوہا دوڑ رہا ہے۔  
کلیریا فاس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ
- ☆ ایسا محسوس ہو کہ بازوؤں اور ٹانگوں پر گیلے کپڑے پہن رکھے ہوں۔  
ڈرائرم ڈرائڈ 200 یا 1M چار گھنٹے  
بعد  
تین مرتبہ
- ☆ تمام جسم پر چیونٹیاں ریگتی ہوئی محسوس ہوں۔  
سٹس کیناؤس 30 یا 200 چار گھنٹے  
بعد  
تین مرتبہ
- ☆ ٹھنکن کا احساس۔  
ڈائبرنم اوپولس 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ



☆ ہونٹوں پر کھٹل ریگلتے ہوئے محسوس ہوں۔

بوریکس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

☆ جسم کے اندر کوئی زندہ چیز محسوس ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔  
ایسا محسوس ہو کہ جسم پھونک یا بے لوج ہے۔

تھوہا 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین

☆ ایسا محسوس ہو کہ نشہ کیا ہوا ہے اور کھوپڑی پھٹ جائے گی۔

میزیریم 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین

☆ ایسا محسوس ہو کہ ہاتھ کے اوپر مکڑیاں رینگ رہی ہیں۔

دسکم البم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد،

☆ ایسا محسوس ہو کہ کالے بادلوں نے مریض کو اپنی پلیٹ میں لے لیا ہے۔

سیکی فوگا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

☆ جسم کی سطح یا جلد پر کپڑے ریگلتے ہوئے محسوس ہوں۔

فانسورس 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ ایسا محسوس ہو کہ زبان جل گئی ہے۔ یا دودھ یا کسی بھاپ سے جھلس گئی ہے۔

پلاٹینم 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین

☆ بستر کے بت چھوٹا ہونے یا سکڑ جانے کا احساس۔

سلفر 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین

☆ ایسا محسوس ہو کہ کوئی مریض کا پیچھا کر رہا ہے یا ہتھوڑے مار رہا ہے۔

لیکے سس 200 یا 1M چار گھنٹے بعد،

تین مرتبہ



## سر درد Headach

(See migraine & Sinusitis etc also)

اس تکلیف میں سر کی جلد اور گوشت میں درد ہوتا ہے۔ ابرو اور پیشانی کی جلد کو حرکت دینے سے درد میں زیادتی ہوتی ہے۔ سردرد دو قسم کا ہوتا ہے۔ درد سردموی اور درد صفراوی۔ دموی سردرد سارے سر پر خاص طور پر پیشانی اور گدی میں زیادہ ہوتا ہے۔ نازک مزاج لوگوں کی آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اور کھیاں سی اڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ پتلے خون کے مریضوں کا جسم زرد، زبان، لب اور مسوڑھے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ ان کا دل دھڑکتا ہے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ درد صفراوی کسی ایک مقام مثلاً "کنپٹی" پیشانی یا داہنی آنکھ پر ٹھہر جاتا ہے۔ یہ عموماً صبح کے وقت بستر سے اٹھنے پر ہوتا ہے۔ یہ درد عام طور پر چند گھنٹوں سے چار پانچ دن تک رہتا ہے۔ ڈکار آنے سے اس درد کو افاقہ ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ کانوں میں بجھناٹ کے ساتھ سردرد۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے سردرد۔  
کالی فاس 6x یا 30، تین گھنٹے بعد
- ☆ شدید پیاس، قبض، پھاڑنے والا سردرد جھکنے اور حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہو۔  
برائی اونیا 30 یا 200، تین گھنٹے بعد،  
چھ مرتبہ
- ☆ مسلسل متلی کے ساتھ سردرد جبکہ زبان صاف ہو۔  
اپی کاک 30، تین گھنٹے بعد
- ☆ معدے کی بد نظمی۔ زیادہ کھا لینے کی وجہ سے سردرد۔ زبان پر سفید تہہ جی ہو۔ نہانے  
خاص طور پر دریا میں نہانے سے سردرد بڑھ جائے۔  
انٹم کروڈم 30 یا 200، چار گھنٹے بعد،  
تین مرتبہ
- ☆ صبح دس گیارہ بجے کے درمیان خالی پن کا احساس۔ صبح سویرے سردرد زیادہ ہو۔  
سلفر 200 یا 1M، ہفتہ وار، تین مرتبہ

- ☆ آنکھ کی بصارت میں بد نظمی۔ آنکھ پر بوجھ کی وجہ سے سردرد۔
- ☆ روٹا 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ سر کے بالائی حصے پر دباؤ۔ شدید درد خصوصاً "سکول جانیوالے بچوں کا سردرد۔
- ☆ ایسڈ فاس 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ پیاس ندارد۔ مرغن اور مسالہ دار خوراک کھانے کی وجہ سے۔ کھلی ہوا میں بہتر محسوس کرے۔

- ☆ ہلٹاٹلا 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ سر کی طرف سیلان خون۔ شدید تپکن کا درد۔
- ☆ بیلاڈونا 30 'تین گھنٹے بعد
- ☆ درد گدی سے شروع ہو کر سر کی طرف جائے۔ مریض خاموشی سے لیٹے رہنا چاہے۔
- ☆ پیشاب کرنے کے بعد بہتر محسوس کرے۔

- ☆ جیلی میم 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد
- ☆ کسی ایک مقام پر درد، گدی پر درد چلنے اور شور سے درد میں اضافہ۔
- ☆ نیوکوکسین 200 '10 منٹ بعد
- ☆ کسی مایوسی یا صدمے اور رنج کے بعد سردرد۔ اعصابی سردرد۔ دھواں سانس کے ساتھ اندر جانے کے بعد تکلیف بڑھ جائے۔

- ☆ اگنیشیا 200 یا 1M 'تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والا مریض۔ بیٹھ کر وقت گزارنے کا عادی مریض۔ نشہ آور مشروبات پینے کے بعد سردرد۔

- ☆ نکس وامیکا 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ ناک کی جڑ میں دباؤ اور درد۔ ناک میں سرسراہٹ۔ ناک کی نسیج میں ورم کی وجہ سے سردرد۔

- ☆ کالی بیج 30 'چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ خشک ٹھنڈی ہوا لگ جانے سے اچانک سردرد۔ طبیعت میں فکرمندی ہو۔
- ☆ اکو نائٹ 30 یا 200 'آدھا گھنٹہ بعد
- ☆ تین مرتبہ
- ☆ سر کا بھاری پن۔ ماتھے میں درد۔ اعصابی درد دائیں آنکھ کے اوپر اور پیچھے۔ لیٹنے کھانے



اور آرام کرنے سے بہتر ہو۔

پنی سلینم 30 یا 200 '10 منٹ بعد'  
تین مرتبہ

☆ چمکدار روشنی سے حسیت۔ آنکھوں سے پانی جاری ہونے کے ساتھ سردرد۔

یوفرزیا 30 'تین گھنٹے بعد'

☆ لو لگنے کی وجہ سے سردرد۔ گیس لائٹ کے نیچے کام کرنے کی وجہ سے شدید سردرد۔

گلوٹائن 6 یا 30 'دو گھنٹے بعد'

☆ سورج کی گرمی کی وجہ سے سردرد۔ سورج نکلنے کے بعد سے غروب ہونے تک درد بڑھتا

جائے۔ ابتدا دل کے اسباب سے ہوئی ہو۔

کالیم لیسٹ فولیا 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'

☆ سکول جانیوالی لڑکیوں کا سردرد۔ ماہواری کے ایام میں دھوپ میں جانے کی وجہ سے سر

درد۔ ہتھوڑے لگنے کا سادرد۔

نیرم میور 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ اعصابی چوٹ کی وجہ سے سردرد۔ سر کو پیچھے لیجانے سے درد میں کمی محسوس ہو۔

ہا پرکیم 30 'تین گھنٹے بعد'

بائیو کبی نیشن نمبر 12 سردرد کے لئے مفید دوا ہے۔

مذکورہ ادویات کے علاوہ سپائی جیلیا، سٹونیریا، لیکے سس،

لائیکوپوڈیم میگنسیا فاس اور ڈیمیانہ بھی اچھی دوائیں ہیں۔



# آدھے سر کا درد / درد شقیقہ

## Migraine

(see headach also)

اکثر یہ مرض موروثی ہوتا ہے لیکن امراض گردہ، عام جسمانی کمزوری، خون کی خرابی، بے خوابی اور بصارت کے امراض بھی اس کا سبب ہوتے ہیں۔ کثیف آب و ہوا، زیادہ دماغی محنت اور مصائب و آلام، تیز دھوپ اور گرم لو میں پھرنا بھی اس مرض کا سبب ہو سکتے ہیں۔ اس مرض کا دورہ سا پڑتا ہے اور آدھے سر میں درد ہوتا ہے یعنی ایک جانب زیادہ شدید اور دوسری طرف قدرے کم ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ درد طلوع آفتاب کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ بعض دفعہ سرشام شروع ہو کر رات بھر رہتا ہے اور صبح کو آرام آ جاتا ہے اس درد میں جی متلاتا ہے اور ابکائیاں آتی ہیں۔ درد ابرو میں یا ایک جانب کن پٹی میں ٹھہر جاتا ہے اور بعض اوقات دو تین یوم تک رہتا ہے۔ جب یہ درد ٹھیک ہونے لگتا ہے تو مریض کو نیند آ جاتی ہے اور سو کر اٹھنے کے بعد مریض خود کو بالکل صحت مند محسوس کرتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کمزور و ناتواں، چڑچڑے مزاج کے موٹے مریض۔ جو اکثر بے حس اور بے پروا سے رہیں۔ ان کے مزاج (moods) میں تبدیلی آتی رہے۔ ان کے طور طریقوں میں بھی اچانک اور عجیب سی تبدیلی ہوتی رہے۔ خواتین کے موقوفی حیض کے دوران بے قاعدگی اور پریشانی کی وجہ سے یادداشت کمزور ہو جائے۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے آدھے سر کا درد ہو۔ اوپرے رنگت والے مریض۔ ناک کے اوپر پیلی سی پٹی بنی ہو۔ شدید اور چبھنے والے درد ہوں۔ درد بائیں جانب کی کنپٹی پر ٹھہر جائے۔

سیپا 200 '10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ نظام عصب کی کسی بیماری میں مبتلا شخص۔ بد مزاج چڑچڑا، مراقی، اور صغراوی مزاج مریض۔ شراب کے اثرات بد کی وجہ سے سردرد یا ضرورت سے زیادہ کافی، تمباکو اور مسالے استعمال کرنے کے نتیجے میں سردرد۔ ذہنی تھکاوٹ۔ فکر مندی۔ کاروباری پریشانیاں اور فکرات، جنسی بے اعتدالی۔ تنہائی پسند، غمگین۔ بیٹھے ہوئے وقت گزارنے والا مریض۔

نکس و امیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ موقوفی حیض کے دوران۔ ماہواری سے پہلے گرمی ہے۔ سونے کے دوران اور سونے کے بعد شدید درد۔ بائیں جانب کا آدھا سردرد۔

لکے سس 30 یا 200 '10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ دماغی کام کرنے سے سردرد۔ ٹھنڈ لگنے سے۔ سر کھلا رہنے سے۔ کسی قسم کے دباؤ یا بوجھ کی وجہ سے۔ مسلسل بیٹھے رہنے یا لو لگ جانے کی وجہ سے سردرد۔

گلوٹامین 30 'تین گھنٹے بعد

☆ نظام عصب کے مرض میں مبتلا اشخاص۔ شور و غل کے سبب خوفزدہ۔ آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے۔ زرد چہرہ۔ بائیں جانب کی آنکھ کے اوپر ٹھہرا ہوا درد خاص طور پر بائیں پتلی کا درد۔ درد اعصابہ متعلقہ پلک۔ پشت سر سے بائیں آنکھ کی طرف بڑھنے والا تیز پھاڑنے والا چیرنے والا اور چبھنے والا درد جو کہ وقفے وقفے سے ہو۔ سورج کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سردرد بھی بڑھے۔ جب درد کا حملہ شدید ہو تو صفراوی تے ہو جائے۔ جیسے جیسے سورج ڈوبنا شروع ہو ہولے ہولے آہستہ آہستہ سردرد کم ہو جائے۔ ایسا محسوس ہو کہ کھوپڑی کی ہڈی کے مقام اتصال پر سر کھلا ہوا ہے۔

سپائی جیلیا 200 یا 1M '10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ صفراوی مزاج کے اعصابی طور پر کمزور اور گیس کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لئے۔ اساتذہ اور طلبہ میں دماغی تھکن کی وجہ سے آدھے سر کا درد۔ دھندلا یا آدھا دکھائی دینا یا اندھا پن۔ دائیں جانب کا سردرد۔ خاص طور پر جو اتوار کے روز ہو۔ بعض اوقات پورے معدے میں درد ہو۔ آنتوں کی نالیوں میں شدید درد کے حملے کے دوران زور دار تیزابی تے۔ گرم اور بہار کے موسم میں تکلیف میں اضافہ ہو۔ رات کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے سونے اور تے کرنے کے بعد تکلیف میں افادہ ہو۔

آئرس ورسیکالر 200 یا زیادہ '10 منٹ

بعد تین مرتبہ

☆ چڑچڑے اور خوفزدہ قسم کے لوگوں کے لئے۔ موقوفی حیض کے دور سے پہلے یا اس کے دوران کے سردرد کے لئے۔ چہرے سے تھکا ماندہ معلوم ہو۔ سر بند سا ہو یا بوجھل۔ گالوں پر محدود جگہ پر سرخی۔ دائیں آنکھ کے اوپر درد۔ اعصابی چیرنے والا تپکن والا درد۔ اکثر اوقات آنھویں روز ہو۔ صبح سویرے سردرد ہو۔ گدی سے درد شروع ہو اور اوپر کی طرف



پہلے۔ آنکھ کے مقام پر ٹھہر جائے۔ سورج کے ساتھ گھٹنے بڑھنے والا درد۔ سر میں شدید قسم کی ٹھن یا دباؤ کا احساس ہو۔

سینگونیا C 200 دس منٹ بعد 'تین مرتبہ

☆ معاون دوا۔

بیس لینم 200 یا 1M 'پندرہویں روز' تین مرتبہ

دیگر اہم ادویات : ہلاڈونا، برائی اونیا، کاربوٹیج، نیڑم میور، سفیلیم، سلفر، تھوجا، فاسفورس اور میڈورنیم وغیرہ۔

## سرچکرا نا

### Vertigo/Giddiness

اس مرض میں مریض کو چکر آتے ہیں۔ ارد گرد کی چیزیں گھومتی نظر آتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پاتا۔ کسی چیز کا سہارا لیتا ہے یا گر پڑتا ہے۔ جی متلاتا اور تے آتی ہے۔ ٹھنڈے پینے آنے لگتے ہیں۔ اس مرض کے اسباب نشہ آور اشیاء کا زیادہ استعمال، رطوبات جسم کا زیادہ خارج ہو جانا، بلڈ پریشر، سر میں چوٹ لگ جانا، حیض کا کثرت سے آنا۔ بد ہضمی اور بعض عصبی امراض مثلاً "سکتہ" مرگی اور درد شقیقہ وغیرہ ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ جگر میں درد کے ساتھ سر چکرائے۔ آگے کی جانب گر پڑنے کا رجحان یعنی ایسا لگے کہ آگے کی طرف گر پڑے گا۔

چیلی ڈونیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ پانی دیکھنے یا کوئی پل پار کرتے ہوئے سر چکرانے لگے۔

فیرم فاس 12x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ آنکھیں اوپر کو اٹھانے اور کانوں میں غرآنے کی سی آوازوں کے ساتھ۔ کشتی یا کسی سواری پر چڑھتے ہوئے چکر آئیں۔

پڑولیم 30 تین گھنٹے بعد

☆ بہت زیادہ مادہ منویہ ضائع ہو جانے کی وجہ سے چکر۔ صبح کے وقت چکر۔ کھڑے ہوئے

ایسا محسوس ہو کہ گر پڑے گا۔

فاسفورک ایسڈ 30 'چار گھنٹے بعد

☆ کھلی ہوا میں چکر آئیں۔ شام کو کھانے کے بعد سر چکرائے۔

فاسفورس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ سمندر میں چکر آئیں۔ شور سے چکر بڑھیں۔ آنکھیں بند کرنے سے مٹلی کے ساتھ چکر آئیں۔

تھیرڈیان 30 'چار گھنٹے بعد

☆ بصارت کے دھندلانے کے ساتھ چکر۔ چلتے ہوئے یا کسی چیز کے آر پار دیکھتے ہوئے تکلیف بڑھے۔ حیض کے دب جانے سے چکر آئیں۔

ساخے مین 30 'چار گھنٹے بعد

☆ غنودگی کے ساتھ چکر آئیں۔ سیٹ سے اٹھتے ہوئے بڑھ جائیں۔

۱۔ تھیوزا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ رطوبات کے اخراج کو روک دینے کی وجہ سے۔ آنکھیں بند کرنے اور سونے کے بعد زیادہ چکر آئیں۔

لیکے سس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ نیند اڑ جانے۔ چلتی ہوئی یا حرکت کرتی ہوئی چیزیں دیکھنے سے چکر آئیں ایسے فالج کی وجہ سے جس میں اعصابی حرکت ماؤف ہو جائے لیکن حس باقی رہے۔

کوکولس انڈیکا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ دائیں جانب مڑنے پر زیادہ چکر آئیں۔

سینو قس Q یا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ جب کسی چیز پر صحیح طور پر نگاہ نہ جما سکے تو چکر آئیں۔ بیٹھے ہونے کی حالت میں زیادہ چکر آئیں اور چلنے کی صورت میں بہتر محسوس کرے۔

الیومنا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ افقی یا سیدھی حالت میں چکر آئیں۔ ایسا محسوس ہو کہ چکروں کی وجہ سے بائیں جانب کو گر جائے گا۔

سیلی سائیکلک ایسڈ 30 'چار گھنٹے بعد

☆ نیچے کی جانب جاتے یا حرکت کرتے ہوئے چکر آئیں۔ مگر جانے کا خوف محسوس کرے۔

بوریکس 30' چار گھنٹے بعد

☆ کرسی سے اٹھتے ہوئے یا حرکت کرنے سے چکر آئیں۔ سکون کے ساتھ لیٹنے سے بہتر محسوس ہو۔

برائی ادویا 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ سر درد اور گرنے کے احساس کے ساتھ چکر آئیں۔ خصوصاً "مرگی کی" ششٹی کیفیت میں۔

ٹکلیا یا فاس 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ بوڑھے اور غیر شادی شدہ مرد و خواتین کو چکر آئیں۔ آنکھیں کھولنے، حرکت کرنے یا سر گھمانے سے چکر آئیں۔

کوئیم 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ صبح کو سو کر اٹھنے کے بعد چکر آئیں۔ اوپر کی جانب دیکھنے سے سر چکرائے۔

ہلساٹیل 30 یا 200' چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ شام کے کھانے کے بعد یا حس ختم ہو جانے کی وجہ سے چکر آئیں۔

ٹکس دامیکا 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ اندھیرے میں چکر آئیں۔ اونچی عمارتوں کو دیکھنے سے چکر آئیں۔

ار بنٹم نائٹرکیم 30' چار گھنٹے بعد

☆ پڑھنے سے سر چکرائے۔

نیزم میور 30' چار گھنٹے بعد

☆ چارپائی جیسے گھوم رہی ہو۔ کمرے کی چیزیں گھومتی محسوس ہوں۔

کوئیم 30' چار گھنٹے بعد

☆ چلتے ہوئے ایسا محسوس ہو کہ نشتے میں دمت ہو۔

بیلی میم 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ لیٹنے یا جھکنے سے تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔

رہس ٹاکس 30' چار گھنٹے بعد

بایو کیمک کی کالی فاس 6x بھی مفید دوا ہے۔



# بالوں کا گرنا

## Falling of Hair

بال کا گرنا تو فطری عمل ہے کیونکہ انفرادی طور پر ایک بال کی عمر دو تا پانچ سال ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا سوتا سکر جاتا ہے اور بال کر جاتا ہے۔ لیکن کچھ مدت کے بعد یہی سوتا فعال ہو جاتا ہے اور نیا بال پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن بالوں کا زیادہ گرنا ایک مرض ہے۔ کبھی بال تھوڑے تھوڑے گرنے اور کبھی سارے گرنے سے گنج ہو جاتا ہے۔ بالوں کی نشوونما میں ہارمونز اثر انداز ہوتے ہیں لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہارمونز کی کمی سے بال گرتے ہیں لیکن تاحال اس کی اصل وجہ اور گنج پن کا علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ عام خیال یہ ہے کہ جسمانی اور دماغی کمزوری، بعض قسم کے بخار، سل، داد یا بفر وغیرہ قسم کی بیماریاں بھی بال گرنے کا سبب ہوتی ہیں۔ ویسے عمر کے ساتھ ساتھ بال گرنا فطری ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ بال جڑوں پر کھڑے ہو جائیں۔ سر میں گرمی کے احساس کے ساتھ بال گرنے لگیں۔  
سلفر آئیوڈینم 6، چار گھنٹے بعد
- ☆ سر اور جسم کے دوسرے حصوں سے بال گرنے لگیں اور بال جھڑنے والی جگہیں چمکدار اور گنچی رہ جائیں۔  
سلیئم 6 یا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ سر میں کثرت سے سفید خشکی کے ساتھ بالوں کا گرنا۔  
کالی میور 6x یا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ بالوں کی جڑوں میں پھنسیاں اور مچالے ہوں اور بال گریں۔  
سیپا 30 یا 200، ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ بالوں میں قدرتی ملائمت نہ ہو۔ بالوں کی جڑیں اور کنارے خشک ہوں۔ بال الجھے ہوئے اور گتھے ہوئے ہوں۔ بال درمیان کے کسی حصے سے ٹوٹنے لگیں۔  
ایسڈ فلور 200 یا 1M، ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ کھوپڑی میں سوزش اور جھپن۔ بال کھینچنے کا احساس۔ غیر صحت مند بال۔ بال گریں۔  
میکنسیا کارب 30، چار گھنٹے بعد



☆ پھنسیوں اور سوزش کی وجہ سے بال سر سے گریں۔

زکرم فاس 30 'چھ گھنٹے بعد

☆ کھوپڑی پر ایگزیمیا ہو۔ بال آپس میں الجھ جائیں۔

میزیریم 30 'چار گھنٹے بعد

☆ سر سے کچھوں میں بال گریں اور وہ حصے کبجے ہو جائیں۔ بہت زیادہ سکری کی وجہ سے بال گریں۔

فاسفورس 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین

مرتبہ

☆ کمزوری کی وجہ سے سر اور جسم کے دوسرے حصوں سے بال گریں۔

ایسڈ فاس 6 یا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ کھوپڑی کا ورم اور سوجن۔ مریض کنگھا کرنے شیو کرنے اور بال کٹوانے سے گریز کرنا ہو۔

چائنا 6 یا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ چہرے پر غیر ضروری بال 'خصوصاً' خواتین میں۔

اولیم بیکورس 3x 'چار گھنٹے بعد

☆ کھوپڑی کا ایگزیمیا۔ گھونگھریالے، نرم اور سرخ بال۔

میزیریم 30 'چار گھنٹے بعد

☆ کھوپڑی سے بدبو آئے۔ خشک الجھے ہوئے اور گتے ہوئے بال۔

سورینم 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین

مرتبہ

بالوں کی مناسب افزائش کے لئے بائو کیمک کی ٹکیریا فاس

6x ہر چار گھنٹے بعد دینا بہت مفید ہے۔ ٹھنڈ محسوس کرنوالے

مریض جنہیں کنگھا کرتے ہوئے، چھینکیں آجائیں کے لئے

سیلیا 6x چار گھنٹے بعد دینا فائدہ مند ہے۔

بائو کیمک دوائیں :

☆ جب بال بہت باریک ہو جائیں اور گرنے لگیں۔

نیٹرم میور 6x یا 12x

چار گھنٹے بعد

☆ چھوٹوں میں بالوں کا گرنا۔

سلیسیا 12x چار گھنٹے بعد

☆ طویل بیماری کے بعد یا بہت کمزوری کی وجہ سے بالوں کا گرنا۔

کلکیریا فاس 6x چار گھنٹے بعد

☆ بہت زیادہ سکری۔ بال چھوٹوں میں گریں۔ اور اس جگہ تنج ہو جائے۔

کالی سلف 6x چار گھنٹے بعد

مندرجہ بالا ادویات کو علیحدہ علیحدہ یا ملا کر دینے سے بہت اچھے

نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ چھ ہفتوں تک روزانہ تین مرتبہ

6x طاقت میں دو گولی دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

## وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہو جانا

### Premature Greying of Hair

عموماً چالیس سال کی عمر سے سب لوگوں کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات عمر سے پہلے ہی بلکہ نو عمری میں ہی بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض خاندانوں میں بھی بال جلدی سفید ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ وقت سے پہلے بال سفید ہونے کی کوئی خاص طبی وجوہات تو دریافت نہیں ہو سکیں البتہ وٹامن کی کمی، ورزش نہ کرنا۔ خوشبودار اور معدنی تیلوں کا استعمال، دائمی نزلہ زکام، دماغی تناؤ، ذہنی پریشانیاں، کثرت مباشرت، جلق غیر متوازن غذا، روحانی یا جسمانی صدمہ، لمبی بیماریاں اور بال کی سکری وغیرہ بال سفید ہونے کے عام اسباب سمجھے جاتے ہیں۔ ان وجوہات کو رفع کر کے بال سفید ہونے سے کسی حد تک بچا جاسکتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ بالوں کو تیزی سے بڑھانے کے ساتھ کالے بھی کرنا۔

ویز بیڈن (Wies beaden) 30 چار

گھنٹے بعد

☆ بہت زیادہ تیزابیت۔ وقت سے پہلے بال سفید ہونے لگیں۔

ایسڈ سلف 30 چار گھنٹے بعد

☆ وقت سے پہلے بال سفید ہونے سے روکنے کے لئے۔

تھائراڈینیم 200 یا 1M چار گھنٹے بعد  
☆ ایسی بیماریاں جن سے شدید کمزوری ہو جائے۔ مثلاً "ٹائی فائڈ وغیرہ کے بعد بال سفید  
ہونے لگیں۔ مریض اندھیرے اور شور سے خوف کھائے ٹھنڈی بخ چیزیں پینا پسند کرے۔  
فاسفورس 200 یا 1M ہفتہ وار تین  
مرتبہ

☆ جب تمام جسم پر غیر معمولی پسینہ آتا ہو اور وقت سے پہلے بال سفید ہونا شروع ہو  
جائیں۔

پانکو کارپس Pilocarpus  
(Jaborandi 1H) ہفتہ وار تین

مرتبہ

☆ کمزوری کی وجہ سے۔ مادہ تولید ضائع ہو جانے کی وجہ سے۔ بچوں کے بال سفید ہونے  
لگیں۔

ایسڈ فاس 3x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ سورا کے مریضوں کے بال کچھوں میں سفید ہونے لگیں۔

سورینم 200 یا 1M ہفتہ وار تین

مرتبہ

☆ ایسے مریضوں کے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں۔ جو مسلسل ذہنی دباؤ کے شکار رہتے  
ہوں۔

لائکو پوڈیم 30 یا 200 ہفتہ وار تین

مرتبہ

☆ ایک بہترین موثر اور آزمودہ دوا۔

سینونہس (Cenothus Q) 5 یا 7

قطرے چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی ٹکیریا فاس 6x اور نیزم میو 6x چار گھنٹے بعد

دینا بھی مفید ہے۔ بیرونی استعمال کے لئے آرٹیکا۔ کیسترس Q

اور جیپوراندی Q دس فیصد تناسب سے ٹاربل یا زھون کے

تیل میں بہت فائدہ مند ہے۔



# سرکی خشکی / سکری

## Dandruff

سرکی خشکی / سکری خون کی کمی یا جسم کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سر میں زیادہ خشکی کی وجہ سے بال کمزور ہو کر جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور تنج پن کا سبب بنتے ہیں۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ کثرت سے خشکی۔ چھلکے دار خشکی کی تہہ جی ہو۔ پشت سر پر بہت زیادہ ہینہ۔  
سنی کولا 30، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ سردرد اور کھوپڑی پر چھین کے ساتھ خشکی۔ گرم پانی سے دھونے سے اور بڑھ جائے۔  
لائکو پوڈیم 30 یا 200، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ سفید خشکی۔ چھلکے دار اور پرت والی۔ بال خشک۔ بال گریں۔ مرطوب موسم اور ماحول پر تکلیف بڑھ جائے۔  
تھو جا 200 یا 1M، ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ زردی مائل بڑی مقدار میں خشکی۔ کھوپڑی پر داد یا ایگزیمہ۔ گرمی سے تکلیف بڑھ جائے۔  
کالی سلف 6x یا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ جب تمام کھوپڑی خشکی سے بھری ہو اور بال پتھوں میں گر رہے ہوں۔  
فاسفورس 30 یا 200، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ سفید خشکی وافر مقدار میں۔  
کالی میور 6x یا 200، چار گھنٹے بعد
- ☆ سر میں خارش یا چھین کے ساتھ خشکی۔ بال خشک کھردرے۔  
میڈورنیم 200 یا 1M، پندرہویں روز، تین مرتبہ



☆ گول پٹھوں میں خشکی۔ کھوپڑی کے داد کی طرح۔ کھانے سے بھی جلن اور خارش کو آرام یا فائدہ نہ ہو۔

سپیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ ناقابل برداشت کھاج کے ساتھ سکری۔ کھوپڑی کی جلد حساس ہو۔ خشک چٹکے دار خشکی۔

آرسنک البم 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ کھوپڑی کے کناروں پر زیادہ خشکی۔ جلد اور کھوپڑی چمچی تیل کی طرح۔

نیرم میور 12x یا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ معاون دوا۔ بال خشک، کھردرے۔ کھوپڑی سے بو آئے۔ ناقابل برداشت کھاج اور جلن۔

بالوں میں ملائمت نہ ہو۔

سورینم 200 یا 1M 'پندرہویں دن'

تین مرتبہ

ان ادویات کے علاوہ کلکیریا کارب، کینکٹرس، گریفائٹس

مینزیریم۔ شیئی میگنیا اور سلفر وغیرہ بھی بہترین دوائیں ہیں۔



# جوئیں

## Lice

بالوں یا سر میں باریک باریک کیڑے ہو جاتے ہیں جنہیں جوئیں کہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا عرصہ قریباً ایک ماہ ہوتا ہے۔ مادہ جو انڈے دیتی ہے انہیں لیکھ کہا جاتا ہے جو ایک ہفتے کے اندر جوئیں بن جاتی ہیں اور ریٹکنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان جوؤں کی چھ ٹانگیں ہوتی ہیں اور ہر ٹانگ میں ایک پنچہ ہوتا ہے جس سے وہ بالوں میں چمٹی رہتی ہیں۔ یہ کھوپڑی کے پچھلے حصے یعنی گردن میں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ جوئیں خون چوستی ہیں جس کی وجہ سے سر میں خارش ہوتی ہے۔ عام طور پر جوئیں ایک سے دوسرے شخص تک پہنچتی ہیں۔ سکولوں کے بچوں میں اکثر جوئیں ہو جاتی ہیں کیونکہ وہاں اگر ایک بچے کے بھی جوئیں ہو جائیں تو اڑ کر دوسرے بچوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ ان جوؤں کو مارنے اور علاج کرنے کے علاوہ سر کی صفائی رکھنا بہت ضروری ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ سر کی جوؤں کے لئے۔ خصوصی علامت بدبو۔
- ☆ کاربوولک ایسڈ 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ سر اور پرائیویٹ یا مخصوص حصوں کی جوؤں کے لئے۔
- ☆ شینی سیکریا Q یا 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ سر کی جوؤں کے لئے۔ سر میں سے بدبو آئے۔ سر میں نمی اور دانے ہوں۔
- ☆ ونکا مالنر 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ جلد میں جوئیں ہوں۔ جو جلدی جلدی بڑھیں۔ علاج مشکل ہو۔
- ☆ لائیو پوڈیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ سر کی جوئیں۔ بال گندے اور بے چمک۔ معاون دوا۔
- ☆ سورنیم 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ
- ☆ معاون دوا کے طور پر۔
- ☆ بیس لینم 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

بیرونی استعمال کے لئے : شینی سیکریا Q تیل میں ملا کر  
1-9 کے تناسب سے۔ (ناریل، سرسوں یا زیتون وغیرہ کا تیل  
استعمال کیا جاسکتا ہے)

# دماغی خلل

## Mental Derangement

(See insanity & Mania also)

اس مرض کی علامات بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی دماغی سکون کی وجہ سے مرض میں کمی اور کبھی غصے اور جوش کی وجہ سے شدید ہو جاتی ہیں۔ مریض چیختا چلاتا ہے۔ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ بکواس کرتا اور ایک بات کو بار بار دہراتا ہے۔ مسلسل بولے چلا جاتا ہے۔ اس کا جی متلاتا اور ابکائیاں آتی ہیں۔ قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ سر چکرانے لگتا ہے۔ مریض تھکا ہوا اور پست ہمت ہوتا ہے۔ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دماغ میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں۔ بعض دفعہ کپڑے پھاڑنے لگتا ہے۔ خودکشی کی طرف مائل ہوتا ہے۔

یہ مرض کسی دماغی چوٹ، کاروباری یا گھریلو الجھنوں، غم، خوف، اعصابی کمزوری، فاقہ کشی، غربت، مذہبی جنون یا کمزور عورت کے زیادہ عرصے تک دودھ پلانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ ہمیشہ کاروبار کے متعلق باتیں کرے۔ چڑچڑا اور غصیہ شخص۔

برائی اونیا 200 یا 1M 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ اپنے آپ کو ناکام خیال کرے۔ زندگی سے کوئی دلچسپی نہ ہو اور خودکشی کے خیالات آئیں۔

اورم مشلبیکم 200 یا 1M 10 منٹ

بعد، تین مرتبہ

☆ غلط الفاظ لکھے اور بچے غلط کرے۔ اکیلا ہونے سے ڈرے۔ طبیعت میں پریشانی اور احساس کمتری کا شکار۔

لائیکو پوڈیم 200 یا 1M 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ مزاج میں تبدیلی آتی رہے۔ خون یا چاقو دیکھنے کے بعد خودکشی کا رجحان۔ کبھی مسکرائے اور نہ ہنسے۔

الیومنا 200 یا 1M '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ چہرے سے ایسا لگے جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ جنسی معاملات پر انحصار کرے۔ جذبات پھٹ پڑیں۔ بچہ بغیر آنسوؤں کے روئے۔

سٹیفنی سیکریا 200 یا 1M '10 منٹ بعد،

تین مرتبہ

☆ ہر چیز کو ٹھیک حالت میں چاہے۔ کسی بے قاعدگی پر غیر معمولی حساس۔ دوسروں کی بد نصیبی پر خوشی محسوس کرے۔ بہت زیادہ نازک مزاج۔

آرسنک الہم 200 یا 1M '10 منٹ

بعد، تین مرتبہ

☆ ناامیدی اور مایوسی کے بعد شکایتیں کرے۔ آپہں بھرے اور روہانسی ہو جائے۔ مزاج بدلتا رہے۔

اگنیشیا 1M یا 10M '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ اپنے پیاروں حتیٰ کہ شوہر اور بچوں تک کو پسند نہ کرے۔ فطری محبت کی کمی۔

سپیا 200 یا 1M '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ سرکی چوٹ کی وجہ سے شکایات۔ زندگی سے پر موسیقی مریض کو افسردہ کر دے۔

نیزم سلف 200 یا 1M '10 منٹ بعد،

تین مرتبہ

☆ نرم مزاج، شریف النفس، منکسر المزاج، رونے والی طبیعت کا مریض، جلدی ہمت ہار دے۔ مذہبی یاسیت، پیاس ندارد، کھلی اور ٹھنڈی ہوا پسند کرے۔

ہلسائیل 200 یا 1M '10 منٹ بعد،

تین مرتبہ

☆ روح اور جسم کو الگ الگ محسوس کرے۔ موسیقی کی وجہ سے رونے اور کانپنے لگے۔

تھوجا 200 یا 1M '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ



☆ ہسٹرککل تقہہ یا ہسی کے دورے۔ خوش مزاجی کا پاگل پن۔ دماغی کیفیات بڑی تیزی سے بدلتی رہیں۔

کروکس سٹیوا 200 یا 1M 10 منٹ  
بعد، تین مرتبہ

☆ معاون دوا۔

☆ سلفر 200 یا 1M پندرہویں روز، تین  
مرتبہ

بائیو کیمک کی کالی فاس 6x بھی مفید دوا ہے۔

## مجنوب الحواسی/پاگل پن

Insanity/Madness

(See mania also)

☆ دماغ میں فوری آجانے کو دیوانگی کہا جاتا ہے۔ جب ذہنی توازن بگڑ جائے تو مریض بے ہوش  
باتیں کرنے لگتا ہے۔ وہی اور بدحواس ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں وسوسے اور الٹے سیدھے  
خیالات آنے لگتے ہیں۔ دیوانگی سے پہلے کچھ علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں مثلاً "مریض بد مزاج اور  
پست ہمت ہو جاتا ہے۔ سرگھومنے لگتا ہے۔ کاروبار سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ طبیعت میں بے  
چینی اور سرورد کرنے لگتا ہے۔ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بے خوابی اور بے چینی بڑھ جاتی ہے۔  
مرض شدت اختیار کرنے پر اس کا رویہ غیر مہذبانہ ہو جاتا ہے۔ بات بات پر لڑتا اور تکرار کرنا  
ہے۔ گھر سے نکل بھاگتا ہے۔ غیر اخلاقی اور عامیانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ دیوانگی اس  
حد تک بڑھتی ہے کہ مریض کپڑے اتار پھینکتا ہے اور برہنہ ہو جاتا ہے۔ غرضیکہ وہ پاگل پن کی  
حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ ایسا خیال کرے کہ وہ کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے۔ ایسے جنون میں مبتلا ہو جس میں ایک  
ہی بات یا مضمون پر سوچتا رہے۔ پٹھے پرانے کپڑے اور چیتھڑے پنے اور ان سے کھیلا  
رہے۔

سلفر 200 یا 1M 10 منٹ بعد

☆ اپنے آباؤ اجداد اور خود کو بڑا رئیس سمجھے اور اسی طرح ظاہر کرنے کی کوشش کرے۔  
اپنی اہمیت بتانے کے لئے مبالغہ آمیز قسم کی باتیں کرے۔ جنسی بے اعتدالی کی وجہ سے  
مجبور الحواس ہو گیا ہو۔

فاسفورس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ جلدی طیش میں آکر تشدد پر اتر آئے۔ حسد اور جلن کرے۔ دوسروں پر حکمرانی کرنا  
چاہے

لائیکو پوڈیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ مریض کو اندھیرے سے ڈر لگے۔ پاگل پن میں جنگلی ہو گیا ہو۔

سٹرامونیم 1M 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ ذرا سی بات پر شدید قسم کا طیش آجائے۔ تشدد پر اتر آئے۔ دوسری انا کا احساس ہو۔  
انا کارڈیم 200 یا 1M 10 منٹ بعد،

تین مرتبہ

☆ بغیر شرم و حیا کے تمام کپڑے اتار دے۔ ننگ دھڑنگ ہو جائے۔ بستر میں گھنٹوں جاگتا  
پڑا رہے۔ نیند نہ آئے نبض اور دل کی غیر معمولی دھڑکن۔

ہائیو سائنس 200 یا 1M 10 منٹ

بعد، تین مرتبہ

☆ موسیقی سننے سے افسردہ اور غمگین ہو جائے۔ کچھ الٹا سیدھا سوچتا اور خود کو گولی مارنے  
کی کوشش کرتا ہے۔ سر کی چوٹ کی وجہ سے پاگل پن۔

نیٹرم سلف 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ موسیقی سے بہت حساس۔ جھگڑالو اور شرارتی۔ تباہی اور بربادی کی طرف مائل۔

ٹرنٹولا ہسپانیہ 200 یا 1M ہفتہ وار،

تین مرتبہ

☆ ایسا محسوس کرے کہ کسی مافوق الفطرت طاقت کے سائے میں ہے۔ زہر دیے جانے کا  
خوف۔ اس وہم میں مبتلا رہے کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔

لیکے سس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ ذرا سی بات پر بھی اشتعال میں آ جائے اور چیخنے چلانے لگے۔ کسی غم صدے یا خوف کی وجہ سے حواس باختہ ہو۔

نیرم سلف 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ بیوقوفوں کی سی باتیں کرے۔ ہنسنے اور ناچنے سے جذباتی ہو جائے۔ تصور کرے کہ وہ موسیقی سن رہا ہے۔ آنکھیں بند کرے اور خوبصورت خیالات و تصورات میں گم ہو جائے۔  
کنابس انڈیکا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ جھگڑالو۔ بدحواس، ہڈیاں بکنے والا۔ وہی ناقابل برداشت شدید درد کی وجہ سے بدحواسی۔  
ورائزم الیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ شور کو برداشت نہ کر سکے۔ حسد کی وجہ سے دوسروں کو برا بھلا کہے۔ گالیاں دے۔ تشدد پر اتر آئے۔ الٹی سیدھی بکواس کرے۔ فالج یا ریشہ پڑ جائے۔  
نکس وامیکا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ معاون دوا۔

ریسلیم 1M یا 10M پندرہویں روز، تین مرتبہ

بائیو کیمک کی کالی فاس 6x چار گھنٹے بعد دینا بھی مفید ہے۔





## جنون

### Mania

(See Insanity also)

بد مزاجی، پست ہمتی، سر درد، کمزور حافظہ، کام سے نفرت، منتشر خیالی، بے چینی، نیند نہ آنا، دماغی ضعف، سرگھومنا، چڑچڑاپن، کاروبار سے لاپرواہی وغیرہ اس مرض کی علامات ہیں۔ ہڈیاں اور ہکواس، غیر ضروری اور بے موقع بولتے رہتا، ایک بات پر بار بار تکرار کرتا، قیاس آرائی کرتا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہوتا بھی جنون کی علامات ہیں۔ بگڑی ہوئی جنونی کیفیت میں شرم و حیا، غلط صحیح کی تمیز، ضروریات زندگی کا شعور وغیرہ بھی نہیں رہتا ہے۔

بعض اوقات مریض مرنے اور مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

بہت زیادہ دماغی محنت، ذہنی صدمہ، کثرت مباشرت، خانگی و کاروباری مسائل، سوچ و فکر، معاشی بد حالی، آتشک کا مرض، مذہبی جنون و تعصب، جلق کی بد عادت، نفسانی خواہشات کا بڑھے ہونا، مستورات میں رحم کے امراض، دماغی امراض، معدے و جگر کے امراض وغیرہ کے سبب یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کسی چوٹ کے لگ جانے کے بعد۔ مریض کسی کے قریب آنے اور چھونے تک سے ڈرے۔

آرنیکا مونٹینا 200 '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ نہ رکنے والی ہنسی اور تھمہ۔ کسی ایک جگہ نہ بیٹھ سکے۔ مسلسل حرکت کرتا رہے۔ چین سے نہ بیٹھے۔

کنائس امڈیکا 200 یا 1M '10 منٹ

بعد، تین مرتبہ

☆ بہت زیادہ جنسی تعلقات کے بعد۔ اپنی شخصیت کی مبالغہ کی حد تک اہمیت سمجھنا اور سوچنا۔

فاسفورس 200 '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ کپڑے پھاڑ ڈالے۔ گانے گائے اور موسیقی کو بہت پسند کرے۔ چیزیں توڑے پھوڑے۔  
ہر کسی کو برا بھلا کہے۔ لڑے جھگڑے۔

ٹرنڈولا ہسپانیہ 1M یا 200 '10 منٹ

بعد، تین مرتبہ

☆ لو لگ جانے کے بعد بہت زیادہ بکواس کرے۔ اول فول بکنے لگے سونے کے بعد تکلیف  
بڑھ جائے۔

لکے سس 200 یا 1M '10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ معاون دوا۔ مریض ایک ہی مسئلے پر سوچتا رہے۔ ایسا جنون جس میں بار بار ایک ہی بات  
کو سوچے اور دہرائے۔ صبح کے وقت تکلیف بڑھے۔

سلفر 200 یا 1M ہفتہ وار

بائیو کیمک کی کالی فاس 6x بھی چار گھنٹے بعد دینا مفید ہے۔

## استسقاء الدماغ / دماغ کے پردوں میں پانی آجانا

### Hydrocephalus

یہ بیماری اکثر پیدائشی یا موروثی ہوتی ہے لیکن سوزش اور رسولی کی وجہ سے بھی ہو سکتی  
ہے۔ اس مرض میں کھوپڑی کے اندر سیرم یعنی آب خون جمع ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے  
مریض کا سر بڑا ہوتا ہے۔ جب یہ تکلیف پیدائشی ہو تو شروع میں اس کی علامات واضح نہیں ہوتی  
ہیں۔ سوائے اس کے کہ بچے کی آنکھ کے ڈھیلے ادھر ادھر گھومتے ہوں یا بھیجکا پن ہو۔ البتہ بعد  
میں سر بڑا ہونے لگتا ہے اور تشخّص ہونے لگتا ہے۔ شکل عجیب و غریب سی لگتی ہے۔ بعض اوقات  
یہ مرض خود بخود رک جاتا ہے۔ بصورت دیگر آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ جن بچوں کی نشوونما رک  
جاتی ہے اور یہ مرض بڑھتا جاتا ہے، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ پھوڑے پھنسیاں دبائے جانے کی ہسٹری کے ساتھ۔ مریض خیند میں چلائے۔ ٹھنڈے پینے  
آئیں۔ غفلت یا مدہوشی طاری ہو۔

سلفر 200 یا 1M دس منٹ بعد، تین  
مرتبہ

☆ مریض یا اس کی فیملی میں دق کے مرض کی ہسٹری پائی جائے۔  
ٹوبر کولینم IM پندرہویں روز تین

مرتبہ

☆ شدید سردرد۔ چہرہ سرخ۔ بخار۔ خون کا دوران چہرے اور سر کی طرف۔  
بیلٹا ڈونا 30 چار گھنٹے بعد

☆ مریض سر میں گھڑ گھڑاہٹ محسوس کرے خود بخود روئے۔ سر پر شدید پسینے کے باوجود آرام نہ آئے۔ لال بخار یا چچک کے بعد دماغ کے پردوں میں پانی آ جائے۔  
مرکبوس سال 30 یا 200 چھ گھنٹے

بعد

☆ بچہ موٹا ہونے کے باوجود کمزور ہو۔ سر بڑا ہو۔ انڈے کھانے کی خواہش کرے۔ سوئے ہوئے کھوپڑی پر خاصا پسینہ آجائے۔  
فلکیریا کارب 200 یا IM پندرہویں

روز تین مرتبہ

☆ شدید سردرد۔ خاندان میں دق یا سفلس کی ہسٹری پائی جائے۔ کھلی ہوا میں بہتر ہو۔  
کالی آیوڈیم 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد  
☆ پیاس نہارد۔ شدید درد کی وجہ سے مریض چلائے۔ بڑی تیزی سے رطوبات جمع ہو جائیں۔  
ایس ملنیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ سوتے ہوئے پٹھوں میں جھٹکے لگیں پیر میں چلبلاہٹ۔ مریض تکیے میں سر گھسائے اور زور زور سے چیخیں مارے۔ سر کو گھمائے۔  
زکم میٹلیکم 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ خیند میں چونک پڑے۔ حواس باختہ ہو جائے۔ پیروں پر بہت زیادہ پسینہ آئے۔ چہرہ اور ہاتھ ٹھنڈے۔ تمام سر پر پسینہ۔ ٹھنڈ محسوس کرنے والا مریض۔  
سلیسیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ فالج کا ابتدائی مرحلہ۔ جسم کا آدھا حصہ غیر ارادی طور پر حرکت کرے۔ آنکھیں روشنی پر کوئی رد عمل نہ کریں۔ پیشاب رک جائے۔ احساسات معطل ہو جائیں۔ چیخوں کے ساتھ مدہوشی اور بے حسی۔  
ہیلی بورس 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ مزمن کیسوں کے لئے۔ مریض خفہ کے دوران اور بعد میں زیادہ تکلیف محسوس کرے۔  
 لیکے سس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین  
 مرتبہ

☆ ایک ٹانگ مسلسل ہلتی رہے۔ پیشاب رک جائے تالو یا چندیا کا ابھار۔  
 ایبوسائٹم کینابینم 30 یا Q چار گھنٹے  
 بعد

بائیو کیمک کی کلکیریا فاس 6x چار گھنٹے بعد دینے سے بہت  
 فائدہ ہوتا ہے۔





# دماغ کی جھلیوں/پردوں کا ورم

## Encephalitis

(Inflammation of the brain)

اس مرض میں دماغ کی جھلیوں پر ورم آجاتا ہے۔ عام طور سے مرض کا حملہ اچانک ہوتا ہے۔ دیے مرض کے شروع میں بے خوابی اور سردرد کی شکایت ہوتی ہے۔ اچانک حملے کی صورت میں تیز بخار کے ساتھ قہس آتی ہیں اور شدید سردرد ہوتا ہے۔ حواسِ خمسہ بہت حساس ہو جاتے ہیں اور ہڈیان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ مریض کی آنکھ کی پتلیاں پھیلتی اور سکڑتی ہیں اور روشنی محسوس کرنے کی حس تک باقی نہیں رہتی۔ مریض دانت رگڑتا ہے سر کو ادھر ادھر مارتا ہے۔ بیہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں نفخ اور قبض ہو جاتا ہے۔ پیشاب رک جاتا ہے۔ آنکھیں ادھ کھلی اور چہرہ وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ جلد جسم سرد اور پکنی ہو جاتی ہے۔ مریض خزانے لینے لگتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس مرض کا فوری طور پر طبی اور علامات کے مطابق علاج کرنا ضروری ہے۔ مملک اور شدید قسم کے کیس کے صحیح علاج کے لئے مریض کو فوری طور پر ہسپتال داخل کرا دینا چاہئے۔ مریض کو پر سکون ہوا دار اور اندھیرے کمرے میں رکھنا چاہئے۔

مادہ سل کا دماغ میں موجود ہونا، سر پر چوٹ آنا، سخت گرمی، چیچک یا جلدی امراض، آتھک، سورج کی تمازت، ناک یا کان کے ورم کا دماغ تک پہنچ جانا، زیادہ دماغی محنت، زیادہ شراب خوری وغیرہ اس مرض کے اسباب سمجھے جاتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ جسم گرم، چہرہ چمکیلا، نبض تیز، ہڈیان، سر میں شدید درد۔ نیند سے چونک کر اٹھ بیٹھے۔ دانت پیسے۔

تیل ڈونا 2x ہر ایک گھنٹہ بعد

☆ جھلیوں میں شدید ورم۔ پتلیاں پھیلی ہوئی۔ بے ہوشی۔ بہت زیادہ نقابت نبض تیز اور بے قاعدہ۔ تشنج کا ڈر ہو۔

ورنٹرم ورائڈ 1x ہر ایک گھنٹہ بعد

☆ یہ دوا چھوٹے بچوں کے لئے زیادہ موزوں ہے جبکہ وہ تجلیں چلائیں۔ اپنے ہاتھوں کو سر

پر رکھ کر چلائے۔ پیاس نہ لگے اور پیشاب مقدار میں کم آئے۔ چہرہ پھولا ہوا۔ مادہ سل کی وجہ سے ہونے والے پردوں کے ورم کے لئے بھی یہ دوا زیادہ مفید ہے۔

ایس ملفیکا 3x ہر ایک گھنٹہ بعد

☆ جب مرض چوٹ لگنے یا دماغی صدمے سے ہوا ہو۔

آرنیکا 1x ہر ایک گھنٹہ بعد

☆ سخت سردرد، یکایک چلا اٹھے، سر کو تکیے پر مارے، ماتھے پر شکن، پتلیاں پھیلی ہوئی۔ ایک طرف کا بازو اور دوسری طرف کی ٹانگ ملتے رہنا۔

ہیلی بورس 3x ہر آدھا گھنٹہ بعد

☆ پیٹ تنا ہوا اور زبان سفید۔ پسینہ کثرت سے آئے۔ بخار تیز ہو۔ ہلانے جلانے سے مریض چلانا شروع کر دے۔ مریض منہ کو مسلسل اس طرح ہلاتا رہے کہ جیسے کچھ چبا یا کھا رہا ہے۔ چہنچہنے والی اور تیز دردیں۔ چھانٹ کے دب جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مرض کے لئے۔

برائی اونیا 3x ہر ایک گھنٹہ بعد

☆ بخار بہت خفیف یا بالکل نہ ہو۔ مرض کا زیادہ شدید حملہ نہ ہوا ہو۔ مادہ سل یا چھانٹ کے دب جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والا مرض۔

زکم میٹلیکم 6x سفوف ہر دو گھنٹے بعد

☆ بے چینی، ڈر، شدید پیاس۔ دھوپ یا گرمی میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے پیدا ہونے والا مرض۔ غصے اور غیظ و غضب کی وجہ سے دماغ کے پردوں پر ورم آگئی ہو۔ ابتدائی مرحلے کے لئے۔

اکو نائٹ 3x ہر ایک گھنٹہ بعد



# دماغ کی سوزش

## Affection of brain

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے دماغی تھکن۔  
کالی فاس 6x یا 30
- ☆ دماغ کی قلت خون۔  
ٹباکم 30 یا 200
- ☆ کالہر کے حملے کے دوران بچوں میں دماغی بیماری۔  
ٹکس موسکاٹا 30 یا 200
- ☆ دماغی سوزش۔  
ارم نرائفلیم 30 یا 200
- ☆ اعصابی تناؤ یا خوف کے بعد دماغی لاغری اور کمزوری۔  
فاسفورس 30 یا 200
- ☆ دماغ میں گوڑیا رسولی۔  
ہلمبم میٹلیکم 30 یا 200
- ☆ دماغ کی چوٹ یا چوٹ کے بعد دماغ پر اثرات۔  
نیٹرم سلف 200 یا زیادہ طاقت
- ☆ دماغی کام کرنے سے خوفزدہ۔ ایسے مریض جو سردی زیادہ محسوس کریں۔  
سیسیا 12x یا 30
- ☆ دماغی فالج یا دماغی تھکن۔  
زنگم میٹلیکم 30 یا 200
- ☆ کسی چوٹ یا زخم کی وجہ سے دماغی سوزش۔  
روٹا 30 یا 200

# دل

## Heart

(See other heart ailments also)

قلب یا دل انسانی جسم کا ایک اہم عضو ہوتا ہے۔ یہ پٹھوں سے بنا ہوا ایک پمپ ہے جو جسامت میں بند مٹھی کے برابر ہوتا ہے۔ دل ہر منٹ میں قریباً "ستر مرتبہ" دھڑکتا ہے اور ہر منٹ میں 5 لیٹر خون سارے جسم میں پمپ کرتا ہے۔ یعنی اوسط عمر کی پوری زندگی میں 180 ملین میلن خون کی پمپنگ کرتا ہے۔ دل کے غلاف کی سوجن، اندرونی جھلی کی سوجن، دل کی سوجن، درد دل، اختلاج قلب (دھڑکن) دل کا غوطہ کھا جانا اور غش وغیرہ دل کے عام امراض ہیں۔ جس کی تفصیل دل کے مختلف امراض میں بیان کی گئی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ موٹا دل۔ ایسا محسوس ہو کہ دل گلے میں اچھل آیا ہو۔  
فائٹولا کا 30' چار گھنٹے بعد
- ☆ ماہواری کے دوران اور پیشاب کرنے سے پہلے، بعد اور دوران دل میں درد ہو۔  
یتیم کارب 30' چار گھنٹے بعد
- ☆ دل کی کمزوری اور اس میں جلن کا سا احساس۔  
پروٹس 30' چھ گھنٹے بعد
- ☆ دائیں جانب لیٹنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو۔  
ایومن 30' چار گھنٹے بعد
- ☆ بے چینی اور جلن کا احساس۔ خون کی کمی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو۔  
آرسک الیم 30' چار گھنٹے بعد
- ☆ ماہواری اور خونی بوائیر کو دبانے کی وجہ سے دل کے امراض لاحق ہوں۔  
کولن سونیا 30 یا 200' چار گھنٹے بعد
- ☆ دل کے متعلق بہت حساس ہو۔ دل کا عمل تیز ہو۔  
پائو جینم 200' ایک خوراک



☆ جتنی نفس اور دھڑکن۔ دل کی طبعی بیماریوں میں۔ جب اس کے بارے میں سوچے تو تکلیف بڑھ جائے۔

او کیلک ایسڈ 30' چار گھنٹے بعد

☆ نبض ضعیف اور تیز۔ دل کا عمل ست ہو۔

لیکرو ڈیکٹس 30' آدھا گھنٹہ بعد، تین مرتبہ

☆ دل کی دھڑکن چلنے سے بہتر ہو۔

کارڈس مریانس 6 یا Q' چار گھنٹے بعد

☆ دل سکڑنے لگے۔ مریض بخ ٹھنڈی چیزیں کھانا پینا پسند کرے۔

فاسفورس 30 یا 200' چھ گھنٹے بعد

☆ دل کی سوزش یا زخم۔ درد اور تکلیف معمولی سی بھی حرکت سے بڑھ جائے۔

برائی اونیا 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ جذباتی ہو جانے سے دل دھڑکے۔

کلیریا آرسنک 30' چار گھنٹے بعد

☆ مریض ایسا محسوس کرے کہ دل دائیں جانب ہے۔

بوریکس 30' چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی کالی فاس 6x چار گھنٹے بعد دینا بھی مفید ہے

## دل کا دھڑکنا

### Palpitation

(See heart ailment also)

اس مرض میں دل زور زور سے دھڑکتا ہے۔ دھڑکن سینے کے اوپر بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔ ذرا سے خوف غصے، جوش اور دہشت سے بھی دل تیز دھڑکنے لگتا ہے مریض بے چین ہو جاتا ہے۔ اسے دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا اور گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بعض اوقات دل کی دھڑکن کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ قریب کھڑا ہوا دوسرا آدمی بھی سن سکتا ہے۔ کبھی کبھار بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ نبض نہایت تیز حتیٰ کہ 150 فی منٹ یا اس سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ نفرس اور بد ہضمی کے مریضوں کو اپنا دل لرزتا ہوا معلوم

ہوتا ہے۔ بعض مریضوں کو دل کی دھڑکن کے ساتھ درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ نفع شکم، بد ہضمی، فکرات، چائے کا بکثرت استعمال، کثرت جماع، زیادہ جسمانی یا دماغی محنت اور شراب یا تمباکو نوشی اس مرض کے عام اسباب ہیں۔ بعض امراض عصبی اور امراض دل بھی دل کے تیز دھڑکنے کا سبب بنتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ ایسے مریض جن کو بوا سیر ہو۔ ضعف معدہ، بد ہضمی اور رتج کی شکایت ہو۔  
کالن سونیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ
- ☆ دل کے مقام پر شدید دھڑکن۔  
ایتھوزا 30 'چار گھنٹے بعد'
- ☆ تھکن اور جذبات سے دھڑکن تیز ہو جائے۔  
☆ کرینگس 30 یا Q 'تین گھنٹے بعد'
- ☆ متلی کے ساتھ دھڑکن۔ سردرد اور اعصابی جذباتیت۔  
برومیم 30 'چار گھنٹے بعد'
- ☆ دل اور سینے کی ٹھن کی سکڑن کے ساتھ دھڑکن۔  
☆ کیکنس 30 یا Q 'تین گھنٹے بعد'
- (☆) اوپر کی دو ادویات دل کی طاقت کے لئے بہت مفید ہیں اور  
یکے بعد دیگر دی جاسکتی ہیں۔)
- ☆ دیگر اہم ادویات : اکونائٹ، آرسنک البم، کاربوئیج،  
فاسفورس، سلفر، جیلی میم اور ارجنٹیم نائٹرکیم وغیرہ۔

دل کے ارد گرد کی شرائن اور وریدیں، رگیں، نالیاں، خون کے پھچھڑے

### Coronary Thrombosis

خون کی نالی یا دل کی شریانیں اور وریدیں خون سے بننے والے کسی پھچھڑے کی وجہ سے کوئی کھوکھلا عضو یا نالی بند ہو جائے تو دل کی دیواریں اور نیوب کے سوراخ بند ہو جانے کی وجہ سے دل کا عمل رک سکتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں فوری طور پر طبی امداد کے لئے کوشش کرنی چاہئے۔ تاہم عارضی طور پر درج ذیل ادویات میں سے علامات کے مطابق کوئی دوا دینا بہت فائدہ

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ پایاں بازو سن ہو جائے اور بائیں جانب فالج کی کیفیت ہو جائے۔ کمر اور گردن کے گرد پست کپڑا تک برداشت نہ کر سکے۔

لیکے سس 200 'آدھا گھنٹہ بعد' تین

مرتبہ

☆ پینے میں شدید قسم کا اکڑاؤ اور سکڑاؤ، کچھاؤ اور گھٹن۔ خراش دار درد۔

آرنیکا 200 'آدھا گھنٹہ بعد' تین مرتبہ

☆ غصے کے اثرات بد کی وجہ سے خون یا دل کی شریانوں میں خون کا پتھریلا جم جائے۔

کالوسنتھ 200 'آدھا گھنٹہ بعد' تین

مرتبہ

☆ دل کے مقام پر کچھاؤ۔ جیسے دل کو کسی بند سے جکڑ دیا گیا ہو، اور دل سکڑنے لگا ہو۔

کیکٹس 30 یا Q 'آدھا گھنٹہ بعد' تین

مرتبہ

ہائیو کیمک کی گلیسیا فاس 6x فیرم فاس 6x اور کالی میور 6x

آدھا آدھا گھنٹے بعد دینا بھی بہت مفید ہے۔

مذکورہ ادویات کے علاوہ امونیا کارب، ایس ملیکا، برٹیا کارب،

بیلاڈونا، بوتھ روپس لین، کلیریا آرسنک، کالی میور، لیم tig

لائکویوڈیم، ہائیوسیانمس Hyoscyamus میڈورنیم،

مرکیورس سال، اوپیم، فاسفورس، سکیلے کار سلفر، وغیرہ بھی

مفید ہیں۔





# بلند فشار خون

## Hypertension

(High Blood Pressure)

دل پٹھوں سے بنا ہوا پمپ ہے جو جسامت میں بند مٹھی کے برابر ہوتا ہے۔ دل ہر منٹ میں قریباً ستر مرتبہ دھڑکتا ہے۔ یہ ہر منٹ میں 5 لیٹر خون سارے جسم میں پمپ کرتا ہے۔ یعنی پوری زندگی میں 180 ملین گیلن فشار خون ہر فرد میں ہوتا ہے۔ خون جب رگوں سے گذرتا ہے تو اس میں دباؤ پیدا ہوتا ہے یہی فشار خون ہے۔ ایک صحت مند جوان فرد میں فشار خون 120/80 ہوتا ہے۔ (120 فشار خون دل کی ہر دھڑکن کے وقت اور 80 دو دھڑکنوں کے درمیانی وقفے میں) آج کل بلند فشار خون کی شکایت عام ہو گئی ہے۔ یہ بیماری موروثی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً "مٹاپا۔ شراب نوشی۔ ناقص غذا۔ ذہنی دباؤ اور ورزش نہ کرنا۔ ان کے علاوہ فشار خون چند بیماریوں اور دواؤں کے ضمنی اثرات سے بھی بڑھ جاتا ہے عام خیال یہ ہے کہ سر کا درد اور تھکن اس کی علامتیں ہیں۔ مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلند فشار خون سرخ رگوں کے تنگ ہونے کے سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے دوران خون کے نظام پر دباؤ بڑھتا ہے۔ اگر اس غیر معمولی دباؤ کی بروقت تشخیص اور علاج نہ ہو تو دل کی بیماریاں یا فالج ہو سکتا ہے۔

احتیاطی تدابیر کے طور پر وزن کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ نمک کم استعمال کیا جائے۔ باقاعدگی سے ورزش کی جائے۔ پیدل چلا جائے۔ خالی پیٹ تیز چلا جائے۔ تیز قدموں سے سیر اور تیراکی کی جائے۔ لفٹ کے بجائے سیڑھیاں چڑھی جائیں۔ ایسی صورت حال سے بچنے کی کوشش کی جائے جس سے اعصابی دباؤ، فکر یا پریشانی پیدا ہو۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ دم کشی یا دل گھٹنے کا درد۔ دل کے مقام پر کھچاؤ۔

کیکٹس Q یا 30، تین گھنٹے بعد

☆ آنکھ کے سفید پردے کی تنزی خاص طور پر ریڑھ کے مغز کے ساتھ فشار خون۔

ہلسم آیوڈیم 30 یا 200، چھ گھنٹے بعد



- ☆ گیس اور بے خوابی کی شکایت۔ ٹنگی و نفس۔ ذرا سی بھی تھکن یا محنت سے دھڑکن۔  
 کرینکس 30 یا Q چار گھنٹے بعد  
 ☆ اعصابی کمزوری کے ساتھ فشار خون کی بہترین دوا (دوران حمل) احتیاط سے استعمال کی جائے

روول فاس (Rauwolfias) 5-10

قطرے، چار گھنٹے بعد

- ☆ بوڑھے کنواریوں اور کنواریوں کے لئے۔ بوڑھے لوگوں کے لئے۔  
 کوئیم 200 یا 100 ہفتہ وار، تین مرتبہ

- ☆ زیابیطس، گردے کی بیماری۔ مگنی یا گومٹر۔ تھائراڈ غدود کے بڑھنے کے ساتھ۔ کسی قسم کے صدمے کے جھٹکے کی وجہ سے۔ نمکین چیزوں کے کھانے کی خواہش۔

نیزم میور 30 یا 200 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

- ☆ موقوفی و حیض کے مرحلے کے دوران۔ سونے کے بعد تکلیف بڑھے۔ بہت زیادہ ہڈیاں جکے۔

لیکے سس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

- ☆ دل کی علامات کے ساتھ۔ خودکشی کی طرف میلان۔ بہت زیادہ مایوسی۔

اورم سیلیکم 200 یا 1M 10 منٹ

بعد، تین مرتبہ

- ☆ سر اور ہڈیوں میں تیز درد۔ سفلس کی وجہ سے۔

کالی آئی اوڈیم 30 یا 200 چار گھنٹے

بعد، تین مرتبہ

- ☆ طوفان اور اندھیرے سے خوف۔ لمبے ذہین اور بہت زیادہ دباؤ میں رہنے والے یا حساس لوگوں کا فشار خون۔ ٹھنڈی بخ چیزیں پسند کریں۔

فاسفورس 30 یا 200 دس منٹ بعد

تین مرتبہ

- ☆ سر چکرائے۔ سر میں جلن دار درد۔ سر میں بھاری پن کے ساتھ نیند ندارد۔ استغنا۔ چہرہ اور ٹانگوں پر درم۔ دھڑکن۔ جب اکیلا ہو تو تکلیف میں اضافہ ہو۔ دباؤ محسوس کرے۔ ٹھنڈی چیز لگانے سے بہتر ہو۔

بورہیویا ڈیفوزا

(Boerhaavia diffusa) 6 یا Q

چار گھنٹے بعد

☆ بڑھاپے کا جزوی ادھرنگ۔ (وہ فالج جس میں اعصابی حرکت ماؤف ہوتی ہے مگر حس باقی رہتی ہے) شریانوں کی دیوار کی سختی کے ساتھ فشار خون۔

☆ اورم آیوڈیم 30 'چھ گھنٹے بعد  
☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والے مریض۔ انڈے کھانے کی خواہش۔ سر، ہتھیلیوں اور ٹکوں  
☆ میں پین۔ موٹے اور پلپے مریض۔

کلیریا کارب 200 یا 1M 'ہفتہ وار'

تین مرتبہ

☆ پیاس ندارد۔ سستی۔ غم اور بلاوجہ کے وہم اور خیالات کی وجہ سے خون کا دباؤ۔  
☆ جیلی میم 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد  
☆ جذباتی گڑبڑ۔ محبت میں ناکامی، اور مایوسی۔ کسی رنج یا صدمے کی وجہ سے۔  
☆ اکنیسیا 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ سفل کے کیوں میں۔ دل کے غلاف کی سوزش۔ سرچکرائے۔ تنگی تنفس۔ درد دل۔  
☆ نیٹرم آیوڈیم 30 یا 200 'دس منٹ  
☆ بعد' تین مرتبہ

☆ بڑھاپے کی کمزوری اور بے شعوری کے ساتھ۔ بڑھاپے میں طور طریق کی تبدیلی۔  
☆ برٹا کارب 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد  
☆ گیس کی شروعات کی وجہ سے۔ ریاحی۔ مٹھائیوں اور گرم کھانوں کی خواہش۔ شام 4 تا  
☆ 8 تکلیف بڑھے۔

لائیکو پوڈیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ قلب یا شریانوں کے سکڑنے کا دباؤ زیادہ۔ اور دل کی شریانوں کے پھیلنے کا عمل کم۔  
☆ برٹا میور 3x یا 6x 'چار گھنٹے بعد

☆ سستی سرچکرائے۔ شدید درد۔ دماغ میں اجتماع خون۔

گلوٹائن (Glonoine) 3 یا 6 'آدھا

گھنٹہ بعد

بائیو کیمک کی کلیریا فلور 12x سلیسیا 12x اور کالی فاس 6x

چار گھنٹے بعد دینا بہت مفید ہے۔

## ضروری خون کا دباؤ

- ضروری خون کا دباؤ (بغیر اہم علامات کے خون کا دباؤ) کریٹینکس Q، گلوٹاٹن Q اور پیسی فلورا کے پانچ پانچ قطرے چار گھنٹے بعد
- قلب یا شریانوں کے زیادہ سکڑنے یا دل یا شریانوں کے کم پھیلنے کے دباؤ کے لئے۔  
Viscum alb Q 5-7 drops چار گھنٹے بعد۔ ضروری خون کے دباؤ کے لئے طبعی علاج وغیرہ کیا جانا چاہئے۔

## خون کا کم دباؤ

### Hypotension

(Low Blood Pressure)

جیسا کہ بلند فشار خون کے ضمن میں بیان کیا گیا کہ ایک صحتمند جوان آدمی کا فشار خون 120/80 ہوتا ہے اور خون جب رگوں سے گزرتا ہے تو اس میں دباؤ پیدا ہوتا ہے اور اسی کو فشار خون کہتے ہیں۔ اگر فشار خون اس سے کم ہو تو وہ بھی غیر صحتمندی کی علامت ہے یعنی خون کا دباؤ کم ہوتا بھی دل کے پمپنگ کرنے کے عمل میں نقص کی علامت ہے۔ ایسی صورت میں نمک انڈے اور قدرے گرم اشیاء کا استعمال کرنا چاہئے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ شدید پیاس اور قبض۔ تیز دھوپ میں بے ہوش ہو جائے۔ نمک کے لئے خواہش کرے۔

☆ ایسا محسوس کرے کہ اگر چلے پھرے گا نہیں تو حرکت قلب بند ہو جائے گی۔ حرکت قلب میں بے قاعدگی۔

☆ جیلی میم 30، چار گھنٹے بعد

☆ رطوبات زندگی مثلاً "خون اور منی وغیرہ اور پانی تھے اور دستوں سے ضائع ہو جائے۔

☆ چائنا 30، چار گھنٹے بعد

☆ جنسی افعال میں بہت زیادہ ملوث ہونے کی وجہ سے۔

☆ ایسڈ فاس 30، چار گھنٹے بعد



☆ قوت حیات کی کمزوری۔ معدے کے اوپری حصے میں ریاح۔ تازہ ہوا کی خواہش کرے۔  
کاربوئیج 6 یا 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ معدے کے نچلے حصے میں ریاح۔ بار بار یورک ایسڈ کی سوء المزاجی۔ مٹھائیوں کی خواہش کرے۔

لائیکو پوڈیم 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

تیزی سے بڑھنے والے جوان لوگوں کے لئے بائو کیمک کی  
گلکیریا فاس 6x تین گھنٹے بعد مفید دوا ہے۔

## دل بیٹھنایا دم گھٹنا سینے کا درد

### Angina Pectori

اس مرض میں دل بیٹھنے یا گھٹنے لگتا ہے۔ دل میں تشنج کے سخت دورے شروع ہو جاتے ہیں۔ دل کے مقام پر یکایک درد ہونے لگتا ہے اور اس کی ٹیسس کندھے اور بازو اور سینے تک جاتی ہیں۔ دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور سانس پورا نہیں آتا ہے۔ مریض پیلا پڑ جاتا ہے۔ اور پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے اس مرض کے چند منٹوں اور بعض اوقات کئی گھنٹوں تک دورے ہوتے ہیں۔ مریض کو غشی ہو جاتی ہے اور موت واقع ہونیکا دھڑکا رہتا ہے۔ دل ڈوبنے کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوتی ہے کہ سینے کے اوپر تک محسوس کی جاسکتی ہے۔

یہ مرض عموماً "چالیس سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے اور عورتوں کی نسبت مردوں کو زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ عام طور پر نفرس مزاج لوگوں کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ بد ہضمی، رنج و غم، فکرات، زیادہ ورزش کر لینا، گرم سرد ہو جانا، شراب خوری اور لہج و غیرہ اس مرض کے عام اسباب ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ دل کی طاقت کے لئے بہترین مشروب یا دوا۔

کینکس Q کرینگس Q 10-15  
قطرے، ہر چار گھنٹے بعد



☆ دل بیٹھنے یا دم گھٹنے (Angina) کا احساس جس میں شدید بے چینی ہو۔ جلن کا احساس ہو۔ شدید پیاس ہو اور موت کا خوف ہو

آرسنک الیم 30 یا 200 '10 منٹ  
بعد 'تین مرتبہ

☆ انجانا جس میں بے ہوشی کی کیفیت ہو ' بے چینی ہو اور نبض کمزور ہو۔  
ہائڈرو ایسڈ 30 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ

☆ سینے اور بائیں بازو میں درد دل کی حرکت اچانک بند ہوتی محسوس ہو۔ گھٹن ہونے کا احساس

سیسی فوگا 30 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ  
☆ جب مریض شدید درد اور بائیں بازو کے سن ہونے کی وجہ سے بے حس یا بے ہوش ہونے لگے۔

ناجا ٹی (Naja t) 30 یا 200 '15 منٹ بعد 'تین مرتبہ  
☆ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے دل کا درد۔ مریض پگھلا گیا جانا یا ہوا لینا پسند کرے۔ جسم لٹھلا اور نیلا پڑنے لگے۔

کاربووٹیج 30 یا 200 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ  
☆ جب مریض شدید درد کی وجہ سے بائیں جانب نہ لیٹ سکے۔

سپائی جیلیا 200 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ  
☆ احساس جیسے دل کام کرتا بند کر دے گا۔ نبض ست۔ حرکت سے مرض بڑھے۔

ڈی جی ٹیلز (Digitalis) Q یا 30 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ  
☆ دل ڈوبنے کا احساس سینے میں درد کے ساتھ جس میں درد بائیں بازو اور انگلیوں کی جانب منتقل ہو رہا ہو اور بازو سن ہوتا محسوس ہو جو کہ حاد مرحلے کی علامت ہے۔

لیٹروڈکٹس (Latrodectus m) 30 '3x to 10 منٹ بعد 'تین مرتبہ

☆ طویل بیماری کی وجہ سے حرکت قلب بند (ہارٹ فیل) ہونے کا خدشہ۔

امونیم کارب 30 ' آدھے گھنٹے بعد ' تین مرتبہ

☆ دل کی اکڑن کے ساتھ انجمائے۔

واہبرئم اوپوس (Viburum op)

10-5 قطرے ' آدھا گھنٹہ بعد

☆ دھڑکن دل میں درد کے ساتھ۔ سینے میں کاٹنے والا درد جو کندھے اور بائیں بازو کی طرف بڑھے۔ چلنے اور کھانے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ شدید قسم کی Tension ہو۔ سرچکرائے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے۔

ٹرمی ٹالیا ارجنا

Q (Terminalla Arjuna) یا 6

آدھا گھنٹے کے بعد یا ضرورت کے مطابق

☆ دل اور بائیں جانب سینے کی شریانوں میں پھاڑنے والا درد جو بائیں بازو کی جانب بڑھے۔

لیکے سس 10 '30 منٹ بعد ' تین مرتبہ

☆ جب دل کے اطراف سے درد دائیں کندھے کی جانب بڑھے یا دائیں ہنسی کی ہڈی یا دائیں گھٹنے کی جانب پھیلے۔

لیک کنینم (Lac-can) 30 یا 200

10 منٹ بعد ' تین مرتبہ

☆ دل کے کمزور ہونے کی وجہ سے انجمائے۔

سٹرو فینٹس Q (Strophanthus)

10-8 قطرے ' ہر چار گھنٹے بعد یا حسب

ضرورت

☆ جوف سینہ اور دل کے مقام پر شدید قسم کی ٹھن اور کھنچاؤ۔

کیکٹس Q 'g 15-10 قطرے ' 15 یا

20 منٹ بعد ' تین مرتبہ

☆ شدید قسم کی ٹھنڈک کے ساتھ بہت زیادہ نقاہت، نیلاہٹ اور تمام جسم کی کمزوری۔  
کمزور دل۔ دل کو تقویت دینے والی بہترین دوا۔

دراثرم البم 30 یا 200 '10 منٹ بعد،  
تین مرتبہ

☆ دل کی شدید دھڑکن، مایوسی اور خودکشی کے خیالات۔  
اورم میٹلیکم 200 یا 1M '10 منٹ  
بعد، تین مرتبہ

بائیو کیمک کی گنیسیا فاس 6x بھی مفید دوا ہے۔



# آنکھ

## Eye (affections)

(See other related chapters also)

آنکھ دکھنا، آشوب چشم، آنکھ پر چوٹ، آنکھ میں کوئی چیز پڑ جانا، وہابی آنکھ آنا، آنکھوں کے روہے۔ گھرے، ناخونہ، پتلی والے پردے کی سوزش، موتیا بند رتونا یا شبکوری، دور و نزدیک کی کمزور نظری، پپٹوں کے کناروں کی سوزش وغیرہ آنکھ کے عام امراض ہیں۔ جس میں سے بیشتر امراض کا علاج ادویات سے ہو جاتا ہے۔ تاہم ضرورت پڑنے پر آپریشن بھی کیا جاسکتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ آنکھ میں درد۔

کیسیپکم 30 چار گھنٹے بعد

☆ آنکھوں کے پیچھے ٹھنڈک کا احساس۔

ٹکیریا فاس 12x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ چھینکتے ہوئے آنکھیں چپک جائیں۔

گمبوجیا (Gambogia) 30 چار گھنٹے بعد

☆ نصف نظر۔ چیزوں کے اوپری حصے نظر نہ آئیں۔

اورم سیلیکم 200 یا 1M ہفتہ وار،  
تمن مرتبہ

☆ پکوں کا فالج۔

کاشی کم 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد، تمن  
مرتبہ

☆ آنکھوں کے سامنے رنگ اور روشن دھبے۔

کالی ہائی کروم 30 چار گھنٹے بعد

☆ گوبانچی (انجن باری) آنکھ کے بیرونی کونے (کونے) کی سوزش۔ پکوں کا ایگز۔

گریٹائٹس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد،  
تمن مرتبہ



☆ آنکھوں میں ٹھنڈا پن۔ کوئی چیز ریختی ہوئی محسوس ہو۔ چیزیں اپنے سائز سے چھوٹی نظر آئیں۔

پلاٹینم 200 یا IM ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ آنکھوں سے خون جاری ہو اور خراش دار درد ہو۔

آرنیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ آنکھیں چمکی ہوئی۔ آبلہ دار سوزش یا زخم۔ روشنی سے خوف۔ چند حیا پن۔

رہس ٹاکس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ آنکھوں کے سامنے چمک پڑے۔ بھیگا پن۔ آنکھیں گرم اور تھکی ماندہ۔

میکنیشیا فاس 12x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ آنکھوں میں اچانک درد کی شدید لہر۔ تیز چھین والا درد۔ سفلی جلن۔ جب ٹاک صاف کرے یا نکلے تو آنکھوں سے خون آجائے۔

ٹائٹریک ایسڈ 30 یا 200 چار گھنٹے

بعد، تین مرتبہ

☆ آنکھیں سرخ گرم۔ پردہ شبکی (آنکھ کا پردہ) کی مرگی۔

گلوٹائن 30 چار گھنٹے بعد

☆ آنکھوں کے گرد نیلا پن۔ ایک کے دو دکھائی دیں۔ روشنی سے بہت زیادہ حساس۔

کروٹیل ہرائڈس (Crotalus h)

30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ آنکھوں کے سامنے دھواں سا نظر آئے۔ پلکیں بھاری بھر کم سی۔ دھندلا نظر آئے۔

جیلی میم 30 چار گھنٹے بعد

☆ تشنج اور اینٹھن کے بعد آنکھیں ادھ کھلی یا نیم وا۔

ہائیو سامس (Hyoscyamus)

200 چھ گھنٹے بعد

☆ پلکوں کا تشنج۔ آنکھیں بہت زیادہ پڑھنے یا کوئی باریک بینی کا کام کرنے کے بعد بہت زیادہ

تھکی ہوئی یا دھندلی۔

روٹا 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ برقان کی وجہ سے آنکھیں پھلی۔ بائیں آنکھ میں درد۔

چیلی ڈونیم 6 یا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ آنکھیں ایسی لگیں کہ پیچھے کو دھکیل دی گئی ہوں۔ پلکوں کا سرطان۔ آنکھوں میں کمزوری۔

کوئیم 200 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ دائیں جانب کے آنسو بہانے والے غدود کی سوجن۔

سلیسیا 12x یا 30 'چھ گھنٹے بعد

☆ آنکھ کا درم۔ خراش دار پانی بننے کے ساتھ جلن۔

آرسنک الیم 30 'چار گھنٹے بعد

☆ آنکھ کے کونے کی سوجن۔ آنکھوں میں جلن روشنی کی ناپسندیدگی کے ساتھ۔

امونیم کارب 30 'چار گھنٹے بعد

☆ آنکھ کے پردے کی لاغری۔

کاربو سلف 30 'چار گھنٹے بعد

☆ زیادہ خون بہہ جانے کے سبب مینائی جاتے رہنا۔

چائنا 6 یا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ آنکھ کے بیرونی کونے کا درم۔ پلکوں اور قرنیہ پر آبلے۔

انٹم کروڈم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ آنکھوں کے سامنے بھلی کی سی چمک کے شعلے سے کوند جائیں۔ ایسا محسوس ہو کہ پتھدار

ستارے آنکھوں کے سامنے ناچ رہے ہوں۔

کروکس سٹوا 30 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ آنکھیں بڑی بڑی محسوس ہوں۔ عصب مینائی کا درم۔ سبز موتیا یا دھند۔

ہیلمیم 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ اندرونی کونے میں درد۔ بار بار گوبانچی یا انجن تاری نکل آئے۔

شیفی سیکریا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ آنکھوں کے سامنے کالے دھبے نظر آئیں۔ پلکیں بھاری محسوس ہوں کہ ان کو کھولتے

سیپیا 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'

ہوئے بھی دقت ہو۔

☆ روشنی کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے۔ نرم بے ضرر پانی آنکھوں سے جاری رہے۔

ایلم سپا 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ آنکھ کی پتلی پھیل جانے کا پرانا مرض۔ دھندلا پن۔ آنکھ کے آگے جالا سا آجائے۔ قریب کے اوپر زخم یا دھبے۔

ٹکلیریا کارب 200 ' ہفتہ وار ' تین

مرتبہ

☆ پلکیں سوزش زدہ۔ آنکھوں سے گاڑھی پیلے رنگ کی بے ضرر رطوبت بڑی مقدار میں نکلے۔ آنکھوں میں درد ہو۔ گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

ہلایٹا 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ پلکوں کا آگزیما۔ آنکھیں پیچھے کو دھنسی ہوئی۔ پلکوں میں کھپاؤ اور تشنج۔

میزیریم 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ سوتے میں آنکھیں نیم وا یا ادھ کھلی۔ رات دن کا اندھا پن۔ آنکھ کے کونے کے اندرونی حصے کے قریب گوبانچی۔

لائیکو پوڈیم 30 یا 200 ' چھ گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ آنکھوں میں جلن۔ شعلے کی سی چمک پڑے۔ آنکھوں سے پتلی خون ملی رطوبت نکلے۔ آنکھیں کھلی کھلی سی۔ پتلی خون ملی رطوبت نکلے۔ آنکھیں کھلی کھلی جیسے گھور کر دیکھ رہا ہو۔ ٹمٹکی لگا کر دیکھنا۔

کیسٹروس 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ پردہ بیکہ کی علیحدگی۔

نیفٹھائن 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ دائیں آنکھ میں اعصابی درد۔

سٹونیریا c 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد

☆ پردہ بیکہ کا احتساق دم یعنی اجتماع خون۔

ایبلنٹھس (Ailanthus g) 30 ' چار

گھنٹے بعد

☆ مریض ایسا محسوس کرے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ یا جالی سی آگئی ہے۔

☆ آنکھوں کے سامنے کالے دھبے۔ سلفر 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد ' تین

مرتبہ

☆ اندھیرے سے خوف۔ وحشیانہ نظر۔ گھور کر دیکھنا۔ وحشیانہ طور پر آنکھیں کھلی کھلی۔  
سٹرامونیم 200 یا 1M 'چھ گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ سر درد کے ساتھ بیٹائی میں بے قاعدگی۔

نیزم فاس 30 یا 12x 'چار گھنٹے بعد'

☆ بھنووؤں اور پلکوں کا درمیانہ حصہ سو جایا پھولا ہوا۔

کالی کارب 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ پلکیں سو جی ہوئی۔ سرخ، استسقا، پانی نکلے، گرم آنسو، نگرے۔

ایس ملنیکا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ بنے والا ناسور۔ آشوب چشم۔ آنکھ کے سفید پردے کی جھلی کی سوجن۔ پیپ والا آشوب چشم

ار چشم ٹائٹریکیم 30 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ پردہ شبکیہ کی سوزش۔ آنکھوں کا تشنج۔ آنکھیں بیمار اور گول۔

سانا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ آنکھ کے گھیرے کے اعصاب کا درد۔ ویکسی نیشن کی وجہ سے۔

تھوجا 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

مرتبہ

☆ آنکھوں میں چھن۔ حرکت سے تکلیف بڑھ جائے۔

برائی ادویا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ قلب کی بیماری کی وجہ سے پردہ شبکیہ میں اجتماع خون۔

کیکٹس 30 g 'چار گھنٹے بعد'





## آنکھوں میں جلن

### Eyes Burning

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ تپکن۔ پلکیں سوچی ہوئی۔ سرخی اور جلن۔ لینے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔  
بیلا ڈونا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے جلن۔ تیز درد۔ نرم اور بے ضرر رطوبت یا پانی خارج ہو۔  
ایلم سپا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ چبھنے والا خراشدار پانی ہے۔ بے چینی۔ اور نہ مٹنے والی پیاس۔ گھونٹ گھونٹ پانی وقفے وقفے سے پینا پسند کرے۔  
آرسنک الیم 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ خراشدار رطوبت خارج ہو۔ پلکیں سوچی ہوئی اور جلن ہو۔  
یوفرزیا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ خاموشی سے لینے رہنے کی خواہش۔ سستی اور کالی کمر میں کپکپی کبھی زیادہ کبھی کم۔ جسم میں درد۔ سر بند۔ پیاس ندارد۔ پیشاب کے بعد بہتر محسوس کرے۔  
جیلی میم 30، چار گھنٹے بعد

## آنکھ کی چوٹ

### Eye Injury

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ کسی بیرونی شے کی وجہ سے کوئی چوٹ۔  
آرنیکا 200، 10 منٹ بعد، تین مرتبہ
- ☆ اعصابی چوٹ کے لئے۔  
ہائپرکیم 30 یا 200، 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

بائیو کیمک کی فیرم فاس 3x یا 6x آدھا آدھا گھنٹہ بعد دینا  
بھی مفید ہے۔

## بامنی/سلاق (پلکوں کی سوجن/سوزش)

### Blepharitis Inflammation of Eye lids

اس مرض میں آنکھ کے پپوٹوں کے کناروں پر ورم آ جاتی ہے اور وہ سرخ ہو جاتے ہیں۔ ان میں درد اور جلن ہوتی ہے۔ پلکوں کی جڑ میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہو جاتی ہیں جن سے زخم بن جاتے ہیں اور ان پر کھرنڈ آ جاتا ہے۔ آنکھوں سے بیدار رطوبت نکلتی ہے۔ جس سے پلکیں چپک جاتی ہیں۔ صبح کو سو کر اٹھنے پر آنکھیں چپکی ہوتی ہیں۔ پپوٹوں کے کنارے سرخ موٹے اور گول ہو کر پلٹ جاتے ہیں۔ آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے۔ سرد ہوا اور روشنی سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مرض عام طور سے بچوں کو ہو جاتا ہے۔ اگر مرض کا بروقت اور صحیح علاج نہ کیا جائے تو شفا یابی مشکل ہو جاتی ہے۔ گردوغبار، دھوئیں کی خراش، آنکھوں کو صاف نہ رکھنا، سرخ بخار اور خسرہ وغیرہ قسم کے امراض کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ پلکوں پر گوبانجی (انجن ناری) وغیرہ کی وجہ سے اکڑا ہٹ اور سوجن۔  
شیفنی سیکریا 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ سنفل کے کیسوں میں۔ گرم اور ٹھنڈی ہر چیز سے حساس کہ چھونے سے بھی شدید تکلیف ہو۔

مرکبوس کار 200 '10 منٹ بعد' تین

مرتبہ

☆ پلکوں کے کناروں کی سوجن۔ پلکوں کے بال اڑ جائیں۔

پیٹرولیم 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ آنکھوں سے غیر ارادی طور پر آنسو یا پانی بننے کی وجہ سے پلکوں میں جلن اور سرخی۔  
ٹھنڈ محسوس کرنے والے مریض۔

سلیسیا 12x یا 30 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ پلکوں اور بھنوں خصوصاً "اوپری پلکوں میں سوزش۔

کالی کارب 200 '10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ رسولی، پھوڑے، زخم وغیرہ کی وجہ سے پلکوں کی سوجن۔

کوئیم 200 یا 1M '10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ شدید اور کائے والے درد کے ساتھ پلکوں کی سوزش۔ پلکوں میں پیپ پڑنی شروع ہو جائے۔ چھونے سے شدید حساس۔ ٹھنڈے سے تکلیف بڑھے اور گرم چیز سے آرام آئے۔

ہیپر سلف 3x پس نکالنے کے لئے اور 1M پیپ کو دبانے یا ختم کرنے کے لئے۔ اس دوا کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنا چاہئے۔

☆ پانی والا (استقا والا) سوجن۔ پلکوں کے نیچے پانی یا آنسو بھرے رہیں۔ ٹھنڈے پانی اور دیگر ٹھنڈے مشروبات کی خواہش۔

فاسورس 30 یا 200 '10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ آنکھوں سے آنسو بہیں۔ سوجن ہو۔ ٹھلی پلکوں کی سوجن۔ گرمی سے تکلیف بڑھے۔ پیاس ختم ہو جائے۔

ایس ملنیکا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ پلکیں سوجی ہوئی آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بے۔ شدید قسم کی بے چینی ہو۔ ٹھنڈے سے تکلیف بڑھے اور گرمی سے آرام آئے۔

رہس ٹاکس 30 'چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x اور کالی میور 6x ہر چار گھنٹے بعد

ریتا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔



# آشوب چشم

## Conjunctivitis

(See Trachoma also)

آنکھ کے سفید پردہ کی سوزش (رطوبتی جھلی جو کہ آنکھ کے گولے کی اندرونی سطح کو ڈھکے رکھتی ہے) کو آشوب چشم کہتے ہیں۔ جھلی سرخ ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا درم آجاتا ہے اور آنکھ سے پانی بہتا ہے۔ آنکھوں میں ذرات سے محسوس ہوتے ہیں اور چھین ہوتی ہے۔ آنکھوں میں چہر پڑ جاتی ہے۔ اس سے آنکھیں چپکنے لگتی ہیں اور آنکھ کھولنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ مرض ہر موسم اور ہر عمر کے لوگوں کو ہو سکتا ہے لیکن موسم بہار اور خزاں میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ اس مرض سے احتیاط کے لئے اچھی غذا اور صفائی بہت ضروری ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ آنکھوں سے خراش دار پانی بے شدید جلن ہو۔ آنکھیں سوج جائیں۔ ایسا محسوس ہو کہ آنکھ میں کوئی بیرونی چیز یا ذرات پڑ گئے ہیں۔ پلکیں چپکنے لگیں۔

مرکیورس کار، چار گھنٹے بعد

☆ سردی لگ جانے کے فوراً بعد اچانک آنکھوں سے پانی جاری ہو جائے اور آنکھیں سوج جائیں۔

اکونائٹ 30 یا 200، تین گھنٹے بعد

☆ آنکھوں میں چھین درد اور جلن۔ دھونے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

سلفر 30 یا 200، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ آنکھ شعلے کی طرح سرخ، سوزش اور درد۔ چہرہ سرخ۔

یلاڈونا 30، چار گھنٹے بعد

☆ آنکھوں کی سرخی اور سوزش۔ زور لگانے سے ہی آنکھیں کھولی جاسکیں۔

رہس ٹاکس 30، چار گھنٹے بعد

☆ پلکیں سوجی ہوئی سرخ۔ گرمی سے تکلیف بڑھے۔

ایس ملنیکا 30، چار گھنٹے بعد



☆ خراش دار پانی جیسی رطوبات خارج ہوں۔ مریض چمکدار روشنی برداشت نہ کر سکے۔  
یوفریزیا 30' تین گھنٹے بعد

☆ یسدار سفیدی مائل رطوبت خارج ہو۔

☆ کالی بالی کروم 30' چار گھنٹے بعد  
☆ سر درد۔ کثرت سے پیپ دار رطوبت خارج ہو جس سے دھندلا نظر آئے۔ دانہ دار  
سوجن۔

☆ ار جنٹم نائٹرکیم 30' چار گھنٹے بعد  
☆ آنکھوں سے سبزی مائل زرد رطوبت خارج ہو۔ گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ کھلی  
اور ٹھنڈی ہوا میں بہتر محسوس ہو۔

☆ ہلساٹیل 30' چار گھنٹے بعد  
☆ بائو کیمک کی کالی میور 6x اور فیرم فاس 6x یکے بعد دو دو  
گھنٹے بعد استعمال کرانا بہت فائدہ مند ہے۔  
☆ آنکھوں میں ڈالنے کے لئے یوفریزیا آئی ڈراپس۔

## انگوری پردہ کا ورم

### Iritis

(Inflammation of the Iris)

اس مرض میں پتلی والے پردے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا  
ہے۔ پتلی سکڑ جانے کی وجہ سے اس کی اصل ساخت بگڑ جاتی ہے۔ قرنیہ کی چمک ختم ہو جاتی  
ہے۔ مریض روشنی برداشت نہیں کر پاتا اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ رضیہ رطوبت غلیظ اور دھندلی  
ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سوزشی مواد پیدا ہونے سے پتلی بیٹھ جاتی ہے۔ آنکھ میں سوزش اور  
درد ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ شدید درد کے ساتھ انگوری پردے کا ورم۔ جو آنکھ کے ارد گرد کی ہڈیوں کے اندر تک  
محسوس ہو۔

☆ اورم میٹلیکم 200' چار گھنٹے بعد

☆ انگوری پردہ پر سے جیسے ابھار۔ سلفس کی وجہ سے انگوری پردہ کے ورم کی شکایات۔  
تھو جا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ سرد خشک ہوا لگ جانے کی وجہ سے انگوری پردے کا ورم۔

اکونائٹ 30 یا 200 'دو گھنٹے بعد

☆ ٹھنڈ لگ جانے کے بعد آنکھوں میں تیز پھاڑنے والا درد جو سر اور چہرے تک جائے۔  
حرکت سے تکلیف بڑھے۔

برائی اوینا الہم 30 'تین گھنٹے بعد

☆ مشینی چوٹ لگنے سے انگوری پردے کا ورم۔

آرنیکا مونینا 200 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ جلن دار درد۔ رات کے وقت بڑھ جائے۔ گرمائش سے بہتر ہو۔

آرسنک الہم 30 'تین گھنٹے بعد

☆ آنکھیں کھولنے سے پانی ہے۔ بھیگ جانے یا موتیا بند کے آپریشن کے بعد 'پلکیں سوج  
جائیں۔

روہس ٹاکس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ آنکھ کے کونے کے اندرونی حصے میں درد واقع ہو اور آنکھ کی بھنوں اور آنکھ کے آس  
پاس کے حصوں تک درد پھیل جائے۔

سینائیرس 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ آنکھ کی پتلی سڑ جائے۔ انگوری پردہ بے رنگ ہو جائے۔ روشنی سے بہت زیادہ حساس۔  
آنکھ کے اندر اور ارد گرد شدید درد۔ رات کے وقت اور مرطوب موسم میں تکلیف بڑھ  
جائے۔

مرکیورس سال 30 'چار گھنٹے بعد

☆ جب انگوری پردہ کا ورم قریبی بانٹوں اور قرنیہ تک پھیل جائے اور اندرونی حصے میں پیپ  
پڑ جائے۔ گرمائش سے بہتر ہو۔

ہیبر سلف 200 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ مرکزی وغیرہ کے استعمال کے بعد انگوری پردہ کا ورم۔ سلفس وغیرہ کی وجہ سے انگوری  
پردے کا ورم غیر معمولی سوزش اور سوجن۔  
کالی آیوڈیم 6 یا 30 'چھ گھنٹے بعد

دیگر فائدہ مند دوائیں : آر جینٹامائسٹرکیم، اسفونڈا، پیلاڈونا،  
سڈرون، چائنا، کروٹن tig، ٹکس و امیکا، ہلساٹیل، سلیسیا، شیفی  
یگریا، ٹیرنٹہ اور زکیم، میٹیکم وغیرہ

## پردہ قرنیہ کا ورم

### Keratitis

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ آنکھوں سے پیلا اور گاڑھا مادہ خارج ہو۔ دھندلا پن یا جالا سا محسوس ہو۔ روشنی اور  
چھونے سے آنکھیں حساس ہوں۔

ہیبیر سلف 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ ٹھنڈے آنکھوں کے پردہ قرنیہ کی ورم بڑھے۔ مریض موٹے پلپے سے ہوں۔ ٹھنڈ زیادہ  
محسوس کریں۔

کلیریا کارب 200 یا 1M، ہفتہ وار،

تین مرتبہ

☆ آنکھوں سے گندہ چپکنے والا سفید سا مادہ کثرت سے خارج ہو۔

کالی بائی کروم 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ قرنیہ کا دھندلا پن اور جالا۔ جلن کا غیر معمولی رجحان پایا جائے۔ تیزابی آنسو یا پانی  
جاری رہے۔ شدید درد محسوس کرے۔ رات کے وقت تکلیف بڑھ جائے۔

ٹائٹرک ایسڈ 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ پلکوں کا درد اعصاب۔ روشنی سے بہت زیادہ حساس آنکھیں۔

لیک ڈی فلورنیم (Lac-fel) 30 یا

200، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ رات کے وقت درد زیادہ ہو اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد آفاقہ ہو۔

سفینیم 200 یا 1M، ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ قرنیہ میں شدید اور ناقابل برداشت درد تیزابی آنسوؤں کے ساتھ۔

مرک سال 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

سلفر 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

بائیو کیمک کی کالی میور 6x اور 12x بھی بہت مفید دوا ہے۔

## آنسو / آنکھوں سے پانی بہنا

### Lachrymation/Tears

آنکھ میں سوزش ہو جاتی ہے اور سرخ ہو جاتی ہے۔ آنکھ سے پانی آنے لگتا ہے۔ ٹھنڈے لگنے سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آنسوؤں کی وجہ سے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ خراشدار آنسو۔ آنکھوں میں جلن پیدا کریں۔

یوفرزیا 30، چار گھنٹے بعد

☆ بے ضرر آنسو۔ گھر کے اندر زیادہ نہیں۔ کھلی ہوا میں بہتر ہو۔

۱۔ سلیم سیپا 30، چار گھنٹے بعد

☆ آنسو جلن پیدا کریں۔ پانی بنانے اور نکالنے والی نالی کے بند ہو جانے کی وجہ سے ٹھنڈے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

روہس ٹاکس 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ ٹھنڈے محسوس کرنے والے مریضوں کے لئے جبکہ رہس ٹاکس اپنا اثر نہ کرے۔

سلیسیا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی نیٹرم میور 6x اور 12x بھی مفید ادویات ہیں۔

مندرجہ بالا کے علاوہ درج ذیل ادویات بھی آنکھوں

سے پانی جاری ہونے یا آنسو نکلنے کے لئے فائدہ مند ہیں۔

مرک کار، پیرولیم، فلورک ایسڈ، سلفر، نیٹرم میور، آرسینک الیم،

اور ہائیڈرائٹک کین وغیرہ۔





# بصارت کی تکلیفات

## Affections of vision

آشوب چشم، روہے، مکرے، آنکھ میں خونی نقطہ، ناخونہ، جالا آجانا۔ پتلی والے پردے کی سوزش، موتیا بند۔ دھندلا نظر آنا۔ رتوند، قریب نظری، نظر کی کمزوری بعید نظری، پوٹوں کے کناروں کی سوزش، پڑبال، کالا موتیا، بھینگا پن، آنکھ کے تر مرے اور انجن ناری یا گوبانجی وغیرہ آنکھ کے عام امراض ہیں۔ مختلف طریقہ کے علاج کی طرح ہو میوٹھتی طریقہء علاج میں بھی ان امراض کا شافی علاج دریافت کر لیا گیا ہے۔ علامات کے مطابق متعلقہ دوا دینے سے بہتر نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ رطوبت کی وجہ بینائی یا بصارت میں رکاوٹ ہو۔ سانپ سے نظر آئیں۔  
ار جشم نائٹرکیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد تین مرتبہ
- ☆ بصارت/بینائی جاتی رہے۔ وقتی طور پر۔ آنکھوں کے سامنے کالے دھبے سے پھریں۔  
مرک سال 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ چندھیانا۔ چیزیں بہت زیادہ پیلے رنگ کی نظر آئیں۔  
کالی بائی کروم 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ بغیر کسی سبب کے بصارت/بینائی ختم ہو جائے۔ یا سفید چیزوں کو مسلسل دیکھنے سے ایسا ہو۔  
ٹاکم 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ اچانک بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے بینائی جاتی رہے۔  
پلمیم میٹلیکم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ چندھیانہ پن۔ بے شمار ستارے آنکھوں کے سامنے گھومیں۔ دھندلا نظر آئے۔ چیزیں صاف نظر نہ آئیں۔ جھللاہٹ ہو۔  
تین مرتبہ
- ☆ سائیکلے من 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ خنق کے بعد چندھیانہ پن۔ قلبی تکلیفات۔ مریض نیند کے بعد زیادہ تکلیف محسوس کرے۔  
لیکے سس 30 چار گھنٹے بعد تین مرتبہ

☆ نشہ آور مشروبات پینے سے بینائی جاتی رہے۔

نیریبنتھ Q یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ ایسے مریضوں کی بینائی جاتی رہے جن کے دماغ کے پردوں میں پانی آ جائے۔

ایبو سالنہ Q یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ متلی کے ساتھ بینائی جاتی رہے۔ بہت زیادہ مشت زنی کرنے اور زیادہ جنسی اختلاط کی وجہ سے بینائی پر برا اثر پڑے۔ ایک کے دو نظر آنے لگیں۔

سپیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد تین

مرتبہ

☆ آنکھوں کے سامنے دھند محسوس ہو۔ دن کا اندھا پن۔ آنکھوں کے ڈھیلوں پر دباؤ اور

درد۔

ر-نیشن کولس بلب 30 یا 200 چار

گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ آنکھوں میں کمزوری کا احساس کمزور بینائی اور چندھیا پن۔

فالٹی سو سگما (Physostigma) 6 یا

30 چار گھنٹے بعد

☆ آنکھ کی سوزش کی وجہ سے بینائی جاتی رہے۔

مینسی نیلا (Mancinella) 30 چار

گھنٹے بعد

☆ آتش دجے نظر آئیں۔ معاون دوا۔

سورنیم 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ چیزیں سرخ پٹی والی نظر آئیں۔ دھوپ یا سورج میں لیٹے رہنے کی وجہ سے بینائی ختم ہو جائے۔ مصنوعی روشنی میں آنکھوں کی تکلیف بڑھ جائے۔

کونیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد تین

مرتبہ

☆ مریض کو قوس و قزح کے رنگ نظر آئیں۔ دھندلاہٹ۔ آنکھیں ملنے سے بینائی صاف

ہو۔ مشت زنی کی وجہ سے بینائی کمزور ہو جائے یا ختم ہو جائے۔

ایسٹاس 30 چار گھنٹے بعد

☆ اسٹریکل۔ پڑھتے ہوئے بینائی چلی جائے۔ زیادہ روشنی، تمباکو نوشی سے بینائی کمزور پڑ جائے۔ روشنی کے گرد ہالہ نظر آئے۔ دھندلا نظر آئے۔

فاسفورس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ چکر کے ساتھ اچانک بینائی متاثر ہو۔ رنگ نظر آئیں۔  
بیلادونا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ تکسیر کے ساتھ بینائی جاتی رہے۔

اوکسے لیکم ایسڈ  
(Oxalicum acidum) 30 'چار  
گھنٹے بعد'

☆ میریا بخار کے بعد بینائی ختم ہو جائے۔

☆ چائنا سلف 30 'چار گھنٹے بعد'  
☆ پلکیں جھڑ جائیں۔ حمل کے دوران ایک کے دو نظر آئیں۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی۔ دھندلا پن۔ نگاہ ایک جگہ نہ ٹھہر سکے۔  
جیلی میم 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ چھوٹی چیزیں بڑی نظر آئیں۔ چیزیں کالی نظر آئیں۔ روشنی چاہے۔  
سٹرامونیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد تین

مرتبہ  
☆ سر درد کے ساتھ بینائی جاتی رہے ناک سے ہوا خارج کرتے ہوئے ایک کے دو نظر آنے لگیں۔  
کاشی کم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ  
☆ متلی کے ساتھ ایک کے دو نظر آئیں۔ پردہ شبکی سے خون جاری ہونے کی وجہ سے 'صدے اور آنکھوں کا بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بینائی ختم ہو جائے۔  
کروٹون گم لیم 30 یا 200 'چار گھنٹے

بعد  
☆ تمام چیزوں کے گرد گرد میٹھی میٹھی آتش چیزیں اور شعلے نظر آئیں۔  
نیٹرم میور 12x یا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ روشنی سے حساس، غیر واضح اور چکراتی ہوئی نظر۔

تھریڈ یا 30' چار گھنٹے بعد

☆ آلہء بصر کی کمزوری کی وجہ سے بینائی ختم ہو جائے۔ ایک کے دو نظر آئیں۔ دیکھے کی طرف اور نظر کوئی دوسرا آئے۔

سفیلیم 200 یا 1M ہفتہ وار تین مرتبہ

☆ کثرت مطالعہ سے بینائی کی کمزوری۔ خراب یا کم روشنی میں پڑھائی۔ سلائی یا گہری سازی کی وجہ سے بینائی جاتی رہے۔

روٹا 30' چار گھنٹے بعد

☆ چیزوں کا صرف اوپر والا حصہ نظر آئے۔

آرم میٹلیکم 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ پڑھتے ہوئے الفاظ اور حروف گھومتے ہوئے محسوس ہوں۔ اوپر نیچے جاتے ہوئے محسوس ہوں۔ یا بالکل غائب ہو جائیں۔

سانیکیونا 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ چیزوں کا نچلا آدھا حصہ نظر آئے۔

ڈیجی ٹلس 30 یا 200' چار گھنٹے بعد





# مکرے

## Trachoma

(Granular conjunctivitis)

(See conjunctivitis also)

آنکھ کے مکرے دائرے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ایک شخص سے دوسرے کو یہ بیماری لگتی اور پھیلتی ہے۔ اس بیماری میں آنکھ کے پونے کے اندر باریک باریک سرخ دانے پیدا ہوتے ہیں آنکھ میں خارش ہوتی ہے۔ آنکھ میں پانی بھرا رہتا ہے۔ پونٹا بوجھل ہو جاتا ہے اور روشنی بری لگتی ہے۔ پلکیں رطوبت سے چپکی ہوتی ہیں، خاص طور پر صبح کو سو کر اٹھنے کے بعد۔ آنکھوں کو دھوئیں، گردوغبار اور گندی ہوا سے بچانا چاہئے اور صاف رکھنی چاہئیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ بے ضرر گاڑھا پیلے رنگ کا مادہ خارج ہو۔ کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں بہتر ہو۔ گرمائش سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

پلساٹیل 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ آنکھوں کے کوؤوں یا کونوں میں پھن۔ کثرت سے پانی نہ۔ پاخانہ قبض سے ہو۔ گریفائٹس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ آشوب چشم۔ پلوں پر دانے نکلے ہوں۔ آنکھوں سے پانی نکلے۔

کوہریم سلف 30 چار گھنٹے بعد

☆ رات کے وقت پلکیں آپس میں چپک جائیں۔ آنکھوں سے تیزابی پانی نہ۔ کھلی ہوا میں تکلیف میں اضافہ ہو۔

گلکیریا کارب 200 10 منٹ بعد تین

مرتبہ

☆ پلوں پر دانے۔ چپکاہٹ۔ پیلے رنگ کی رطوبت خارج ہو۔ شام اور رات کے وقت تکلیفات بڑھیں۔

کالی بائی کروم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

- ☆ پانی بنے والا آشوب۔ اندرونی کوئے میں زیادہ تکلیف ہو۔  
 زخم میٹلیکم 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ قرضیہ اور پٹکوں پر زخم بن گئے ہوں۔ مریض ٹھنڈ اور کھلی ہوا سے بہت زیادہ حساس ہو۔  
 آنکھ کے سفید پردہ کا مزمن آشوب۔
- ہیبر سلف 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد
- ہایو کیمک کی فیرم فاس 6x اور کالی میور 6x بھی مفید ادویات
- ہیں۔

## ناخونہ (آنکھ کے پردے کا موٹا ہو جانا)

### Pterygium

آنکھوں میں گکروں کی وجہ سے آنکھ کے سفید حصے میں سرخ گوشت پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کے بڑھ کر سیاہ حصے پر پھیلنے کا امکان ہوتا ہے۔ اس سے آنکھوں میں خراش ہوتی ہے۔ گردوغبار اور دھوئیں میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی ناخونہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات آنکھوں میں ٹھنڈی ہوا لگتے رہنے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ ناخونہ زیادہ ہو جانے کی صورت میں آپریشن کر کے سرخ گوشت کو صاف کیا جاسکتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ آنکھ کے پردے کے موٹا پڑ جانے کی اعلیٰ دوا۔
- زخم سلف 1M یا اوپر کی طاقتیں
- پندرہویں روز چھ مرتبہ
- ☆ آنکھ کے کوئے پر ڈنک مارنے کے سے تیز درد۔ آنکھ سے کثرت سے پانی بنے اور چند مہینے پن ہو۔ ٹھنڈی ہوا سے اور رات کے وقت تکلیف بڑھے۔ گرم کمرے میں بہتر ہو۔
- زخم میٹلیکم 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والا موٹا پلپلا سا مریض۔ ٹھنڈ اور بھیگنے کی وجہ سے آنکھ کا پردہ موٹا ہونے کے لئے۔
- کلکیریا کارب 200 یا 1M 'ہفتہ وار'
- چھ مرتبہ

☆ خنازیر یا کنڈالا کے ساتھ اور نندوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے۔

ہمافیا 30 یا 30 چار گھنٹے بعد

دیگر اہم ادویات : امونیم برومائیڈ، آرٹھرم ٹائٹریکیم،  
آرسنک الیم، لیکے سس، کلس موسکاتا، سورنیم، رٹین، سپائی  
بیلیا، شیفنی سیکریا، سلفر اور نیلیوریم وغیرہ۔

## آنکھ کے پردے کی تکلیفات

### Ailments of Retina

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

- ☆ پردے کی سوزش اور زخم، شدید اور تیز آنکھ کا درد۔ حرکت کرنے سے درد بڑھے۔  
برائی اونیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ اچانک نظر میں کمی آجائے۔ کسی چوٹ یا چند ہیا پن کی وجہ سے پردے کا علیحدہ ہو جانا۔  
دوران حمل پردے کی سوزش۔  
بیلی میم 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ پردہ روشنی سے بہت زیادہ حساس ہو۔ درد آنکھ کی گہرائی تک ہو۔  
کوئیم میک 200 دس منٹ بعد تین مرتبہ
- ☆ پردے سے پانی یا رطوبت بننے لگے۔ پردہ علیحدہ ہو جائے۔ پردے میں سوزش یا زخم ہو۔  
اور آنکھ کے گرد درد اور سوجن۔ افسردگی۔  
نپتھیلین 30 یا 200 دس منٹ بعد
- ☆ پردے کے نیچے رطوبت۔ سر اور چہرے کی تہمتاہٹ کے ساتھ آنکھ کے ڈھیلے کے نچلے  
حصے میں ہلکا درد۔ آنکھ کے اندر چبھنے والا درد۔ پلکوں میں شخی ورم۔  
ایس ملنیکا 200 ہفتہ وار تین مرتبہ
- ☆ کسی چوٹ کی وجہ سے پردہ علیحدہ ہو جائے۔ پردے سے خون نکلنے لگے۔  
آرنیکا 200 یا 1M 10 منٹ بعد تین مرتبہ

☆ سوزش اور زخم کے ساتھ پردے سے خون بنے۔

لیکے سس 30 یا 200 '10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ پردے کی سوزش۔ سخت بے چینی۔ خاص طور پر آدمی رات کے بعد پیاس لگے اور تھوڑی مقدار میں پانی پئے پیشاب قلیل اور لیسومن ملا ہوا۔

آرسنک الیم 30 'چار گھنٹے بعد

☆ جب آنکھیں روشنی سے بہت زیادہ حساس ہوں۔ مریض کو روشنی کے ارد گرد ہالہ سا نظر آئے۔ پردے کی سوزش اور زخم۔ ٹھنڈے مشروبات کی خواہش کرے۔

فاسفورس 200 یا 1M 'ہفتہ وار تین

مرتبہ

☆ پردے کے اوپر تہ نشین مادہ۔ اوپر کی نصف نظر ایسی لگے کہ کسی کالی چیز سے ڈھکی ہے۔  
نچلا نصف نظر آئے۔ پردہ کی تغطیر۔

اورم میٹلیکم 200 یا 1M 'ہفتہ وار'

تین مرتبہ

☆ روشنی سے اچانک یا ایک دم حساسیت آنکھ اور پردہ میں شدید درد۔


پلاڈونا 30 'تین گھنٹے بعد

☆ پردے کی سوزش۔ سانپ کے زہر کی وجہ سے پردے میں خون آجائے۔

کروٹیل ہورٹس 200 '10 منٹ

بعد 'تین مرتبہ

دیگر اہم ادویات : ڈی جی ٹیل، رہس ٹاکس، سفلیئم،  
روٹا اور ہائپرکیم وغیرہ۔





# گوبانجی / انجن ناری

Stye (Eyes)

\*(See cysts also)

آنکھوں کے پوٹے کے کونے پر ایک موٹا سادانہ نکل آتا ہے۔ پوٹے کے کنارے متورم اور سخت ہو جاتے ہیں اور ان میں درد ہوتا ہے۔ اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ پھنسی پک کر پھوٹ جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ پھنسیاں یکے بعد دیگر نکلتی ہیں اور یہ سلسلہ مدتوں جاری رہتا ہے۔ ہانسنے کی خرابی، خراب غذا، خون کی خرابی اور آنکھوں سے زیادہ کام کرنا اس مرض کے عام اسباب ہیں۔

## علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ گوبانجی کے لئے اعلیٰ دوا۔

کلکیریا کارب 3x یا 6 روزانہ، تین مرتبہ

☆ گوبانجی۔ پلکیں سوچی ہوئی۔

ایومنا Silic 30، چار گھنٹے بعد

☆ گوبانجی۔ دائیں جانب کی اوپری پلک پر ہو۔

امونیم کارب 30، چار گھنٹے بعد

☆ گوبانجی۔ مے کی قسم کی اور سخت۔

تھوجا 200 یا 1M 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ گوبانجی۔ جلن کا احساس۔ گرم سیکائی سے سکون ملے۔

آرسنک البم 30، چار گھنٹے بعد

☆ گوبانجی۔ وقتاً فوقتاً ہو جائے۔ زخم بن جائے۔ مندمل نہ ہو یا دبے نہیں۔ گانٹھ کی طرح

سخت۔ اگر صحیح طور سے علاج نہ کیا جائے تو فاسد مادے کی تھیلی یا بیضہ دان بن جائے۔

شیفنی یگریا 30، چار گھنٹے بعد

☆ فاسد مادے کی تحلیل بننے سے روکنے کے لئے یا تحلیل کرنے کے لئے۔

تھایوسینا مائن (Thiosinamine)

3x تین گھنٹے بعد

☆ آنکھوں میں پانی کے ساتھ اندرونی کوئے پر گوبانچی ہو۔

نیرم میور 30 تین گھنٹے بعد

☆ بار بار گوبانچی ہو۔ پکنے لگے۔ درد ہو۔ ٹھنڈ سے تکلیف بڑھے۔ خاص طور پر گرمائش سے بہتر ہو۔

ہیبر سلف 30 تین گھنٹے بعد

☆ خاص طور پر اوپری پلک پر گوبانچی کے لئے۔ بار بار ہو جائے۔ گرمائش سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ ٹھنڈ سے بہتر ہو۔

ہلماٹلا 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ آبلہ دار گوبانچی۔ پکنے لگے۔ آنکھوں میں سرخی اور جلن۔

سلیسیا 30 تین گھنٹے بعد

☆ آنکھ کے بیرونی کوئے کے قریب گوبانچی۔

اورم سلف 30 تین گھنٹے بعد

گوبانچی اور فاسد مادے دونوں کے لئے بائو کیمک کی فکیریا

فلور 12x یا 30x بھی بہترین دوا ہے۔



## اندھاپن

### Blindness

اس مرض میں بینائی آہستہ آہستہ کمزور ہو کر یکدم زائل ہو جاتی ہے۔ کبھی نظر دھندلی ہو جاتی ہے اور چیزیں صاف اور واضح طور پر نظر نہیں آتی۔ کبھی ایک کی دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ گاہے پوری چیز کا نصف حصہ نظر آتا ہے۔ نظر کے نقص کی وجہ سے مریض فاصلے کا بھی صحیح اندازہ نہیں کر پاتا ہے۔ آنکھ کی پتلیاں ساکت اور پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ بظاہر آنکھوں میں کوئی نقص نظر نہیں آتا ہے۔ اور آنکھیں نارمل دکھائی دیتی ہیں۔ اندھیرے میں مریض کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے اس لئے وہ بالکل اندھوں کی طرح چلتا ہے۔

اعصابی کمزوری، دماغ کی رسولی یا پھوڑا، سر میں شدید چوٹ آنا۔ اتشکی زہر کا موجود ہونا، دبائی سوزش، سر پکھلانا، سر میں مستقل درد رہنا، کرم امعاء، کثرت سے تمباکو نوشی اور شراب نوشی اس مرض کے عام اسباب ہیں۔ جسم میں بعض سمیات کا زہر موجود ہونا، گرم سرد ہو جانا اور مستورات میں جس حیض بھی اندھے پن کے اسباب ہو سکتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ دن کے وقت نظر نہ آنے کے لئے۔

بو تھروپس (Bothrops) 30 ' چار گھنٹے

بعد

☆ اچانک بینائی جاتی رہے۔ وجہ بھی معلوم نہ ہو۔

ایکونائٹ 200 یا 1M ' 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ کوڑھ کے مریض کی بینائی جاتی رہے۔

ہرا برازیل (Hura Brazil) 30 ' چھ

گھنٹے بعد

☆ اعصابی کمزوری کی وجہ سے اندھاپن۔ رنگ نظر نہ آئیں۔

سینٹونینم (Santoninum) 6 ' چار

گھنٹے بعد

☆ رات کے وقت نظر آنا بند ہو جائے۔

ر-تن کولس بلب

چار '30 (Ranunculus bulb)

گھٹنے بعد

☆ اعصابی 'خوف یا روشنی کی وجہ سے بینائی خراب ہو۔

فاسٹورس 30 یا 200 'چار گھٹنے بعد'

تین مرتبہ

☆ کمزور 'خون کی کمی اور ہسٹریکل مریضوں کی بینائی کمزور یا خراب ہو جائے۔

فیرم بیٹلیکم 30 'چار گھٹنے بعد'

☆ رات کے وقت نظر کم آئے۔ آنکھیں چند حیا نے لگیں۔

فالٹی سو سگما (Physostigma) 30

چار گھٹنے بعد

☆ رات کے وقت کا اندھا پن۔ تمام چیزیں آدمی نظر آئیں یا ان کا آدھا حصہ نظر آئے۔

لائکو پوڈیم 30 یا 200 'چھ گھٹنے بعد'

تین مرتبہ

بالو کہک کی کلکیر یا فاس 6x اور کالی فاس 6x ہر چار گھٹنے بعد

دینا بھی بہت فائدہ مند ہے۔





## بھینگا پن

### Squint/Strabismus

بھینگے پن میں دونوں آنکھیں ایک سیدھ میں نہیں دیکھتی ہیں کیونکہ دونوں آنکھوں کی دھری متوازی نہیں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ صرف ایک آنکھ میں نقص ہوتا ہے۔ صرف وہی اندر یا باہر کو مڑتی ہے۔ عام طور پر بھینگا پن بچپن سے ہوتا ہے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے جوانی میں بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر یہ نظر کی کمزوری سے ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ پولیو اور ٹائی فائڈ وغیرہ کی وجہ سے بھی بھینگا پن ہو سکتا ہے۔ جس میں ایک آنکھ کے عضلات میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ اس تکلیف کے لاحق ہوتے ہی آنکھوں کا ٹیسٹ کرا کے صحیح علاج کرانے سے بھینگا پن دور ہو سکتا ہے۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ بچوں میں پائے جانے والے ہم مرکز بھینگے پن کے لئے۔ خصوصاً ایسے بچوں کے لئے جن کو تشخ ہوتا ہو یا اینٹھن کی وجہ سے بھینگا پن ہو گیا ہو۔

سکوٹا Vir 30، چار گھنٹے بعد

☆ ہم مرکزی بھینگا پن جو کسی خاص وقت یا عرصے میں ہو۔ اندرونی پردہ بصارت میں تشخ کی وجہ سے پیدا شدہ بھینگا پن۔

جیپوراندی 30، چار گھنٹے بعد

☆ کیڑوں کی وجہ سے بھینگا پن۔


سائٹا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

بایو کیمک کی میگنیا فاس 6x بھی مفید دوا ہے۔

دیگر اہم ادویات : جیلی میم، سپائی جیلیا، نکس وامیکا

سائیکل مین، ہلاڈونا، سورنیم۔ Hyoscyamus سٹرا مونیم اور

ایگری کس m بھی مفید ادویات ہیں۔



# ناک

## Affections of Nose

نزله زکام، نکسیر یا ناک سے خون آنا، ناک کی بوا سیر، ناک سے بدبو آنا اور قوت شامہ زائل ہو جانا ناک کے عام امراض ہیں۔ نزله زکام میں ناک میں سے پانی بہتا ہے۔ چھینکیں آتی ہیں۔ سر میں درد ہوتا ہے۔ طلق اندر سے متورم اور سرخ ہو جاتا ہے۔ کھانسی اور بخار بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ناک کے ایک نتھنے اور بعض دفعہ دونوں سے قطرے قطرے خون بہتا ہے اور کبھی کبھار دھار بندھ کر خون بہتا ہے۔ نکسیر آنے سے پہلے پیشانی پر بوجھ اور دباؤ ہوتا ہے۔ ناک کی بوا سیر میں ناک کے نتھنوں میں مے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مریض کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اس لئے وہ منہ کھلا رکھتا ہے۔ مسوں کی وجہ سے زکام کی شکایت رہتی ہے۔ کبھی ناک سے خون بھی بہتا ہے۔ پرانے زکام کی وجہ سے ناک کے نتھنوں میں پٹریاں جم جاتی ہیں۔ مزمن زکام کی وجہ سے مریض کی قوت شامہ یعنی سو گھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے لیکن با اوقات ہی ایسا ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ نتھنوں کے اندر زخم۔ ناک میں کھرغڈ یا چھلکے سے۔ ناک کے اوپر دھبے یا پھنسیاں۔  
کاشی کم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ  
☆ ناک سخت اور سرخ۔ نتھنے سو جے ہوئے یا سکڑی ہوئی ناک جس میں سے روئیں جھڑیں  
اور السر ہو۔  
کالی کارب 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ  
☆ گومٹر جو ناک کے اندر باریک جھلیوں میں پیدا ہو اور سطح پر ظاہر ہو۔ لمبی ناک ڈالی کی  
طرح جوڑ والی۔  
کلیریا فاس 2x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ نتھنوں کی ہڈیوں میں درم اور سوجن۔ السر ہو اور ناک کا ناسور۔ ناک سے بدبو آئے۔  
ہیز زرد بدبو دار پیپ کی طرح کی رطوبت ناک سے جاری ہو۔  
مرکیورس سال 30 چار گھنٹے بعد

- ☆ ناک کی خارش۔ مریض ہر وقت ناک کو نوچتا یا رگڑتا رہے۔  
سانا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ ناک کی نوک چمک دار، سرخ اور سوجی ہوئی۔ ناک پر نیچے کی جانب دباؤ والا درد۔  
بوریکس 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ ناک کا درد اور ناک سے خون جاری ہوتا۔ جلد کا سرطان یا ناک کے اندر گومڑ جو سطح پر ظاہر ہو۔  
کونیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ ناک بہت زیادہ خشک، پیلی رطوبت خارج ہو۔ ناک بھری ہوئی اور بند یا رکی ہوئی۔  
نخنوں میں کھرٹڈ بھرے ہوں اتنے کہ ناک پھٹتی سی محسوس ہو۔ ناک کے پردہ پر السر۔ ناک بہت وزنی اور بھاری محسوس ہو۔
- کالی بائی کروم 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ نخنوں سے پانی بے۔ نخنے سرخ ہوں۔ ناک کے اوپر پھنسیاں ہوں۔  
میزیریم 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ ناک میں خارش یا کھلبلی۔ ناک کی نوک چمک دار سرخ۔  
کیسی کم 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ شدید قسم کی چھٹکیں جبکہ تمام منتخب ادویات ناکام ہو گئی ہوں۔  
اوپیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ ناک کا بیرونی حصہ ٹھنڈ سے مزمن طور پر متاثرہ۔ ناک سے سوں سوں کی آوازیں نکلیں۔ ناک میں جلن ہو۔
- سنس کین 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ ناک کا کونا گانٹھ دار یا ابھار والا ہو۔ ناک میں ناسور ہو۔ بدبو دار رطوبت خارج ہو۔  
السر ہو۔ ناک سوجی ہوئی اور درد بھری۔
- اورم میٹلیکم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ ناک کے سوراخ کا اگلا حصہ سرخ۔ ناک پر پٹری یا کھرٹڈ سے جے ہوں۔ نخنوں میں السر ہو۔ ناک سوجی ہوئی اور سوزش والی۔
- سلفر 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ ناک کی ہڈیاں سوچی ہوئی۔ ناک کی جڑ میں دہانے والا درد۔ ناک سے سبز رنگ کی رطوبت خارج ہو۔

پلسٹیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ ناک سن ہو جائے۔ نٹھنوں کی ہڈیوں میں زخم ہو۔ سفلس کا پرانا نزلہ۔  
آسفونڈا 30 'چار گھنٹے بعد





# نکسیر

## Epistaxis

ناک سے خون آنے کو نکسیر پھوٹنا کہا جاتا ہے۔ اس مرض میں عموماً ایک نٹھنے سے اور بعض اوقات دونوں سے دھار سے یا قطرہ قطرہ خون بہتا ہے۔ اکثر نکسیر آنے سے پہلے پیشانی پر دباؤ اور بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ چھینکنے، سر یا ناک پر چوٹ لگنے، زیادہ مشقت کرنے، شدید گرمی اور سر میں اجتماع خون کی وجہ سے نکسیر آ سکتی ہے۔ بواسیر اور حیض کے خون بند ہو جانے کی وجہ سے بھی نکسیر آ جاتی ہے۔ جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی نکسیر پھوٹ جاتی ہے۔

عام طور پر نکسیر آنا معمولی مرض سمجھا جاتا ہے اور اکثر بغیر علاج کے ہی آرام آ جاتا ہے البتہ مرض کے شدید ہونے کی صورت میں اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ نکسیر کی بہترین دوا۔ بلا درد ناک سے خون بنے۔  
ملی فولیم Q 10-15 قطرے، آدھا گھنٹہ بعد
- ☆ نکسیر کی اعلیٰ ترین دوا۔ ذرا سی حرکت سے بھی نکسیر بڑھ جائے۔ نوجوانوں کی نکسیر کے لئے خاص طور پر بہت مفید دوا۔  
برائی اونیا Q 6-5 قطرے، تین گھنٹے بعد
- ☆ موقوفی ء حیض پر نکسیر۔  
لیکے سس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ خون سرخ چمکیلا، متلی، زبان صاف۔  
اپی کاک 6 یا 30، آدھا گھنٹہ بعد، تین مرتبہ
- ☆ چمکدار سرخ خون۔ سورج کی گرمی سے بڑھ جائے یا ابھر جائے۔ کھانسی کے بعد نکسیر بنے۔

سائٹاؤن ذیکنائی لون  
(Cynadonrrrrdactylon) Q یا  
6، تین گھنٹے بعد

☆ خون کی رنگت کالی سی۔ آسانی سے نہ جے۔ ہاتھ یا منہ دھوتے ہوئے نکسیر زیادہ ہو جائے۔

امونیم کارب 30 'چار گھنٹے بعد

☆ خاموشی اور آسانی سے نکسیر بنے۔ ناک سے پھونک مارتے ہوئے زیادہ ہو جائے۔ خون آسانی سے نہ جے۔ برف کی طرح ٹھنڈے پانی اور مشروبات کی خواہش۔

فاسفورس 200 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ چہرہ سرخ ہو جائے اور خون کا بہاؤ سر کی طرف ہو۔

بیلاڈونا 30 یا 200 'آدھا گھنٹہ بعد

☆ باریک ناڑوں کا ڈھیلا پن، پھولا ہوا جسم، رات اور صبح کے وقت تکلیف بڑھے۔

بودشا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ مسلسل یا بار بار نکسیر بنے۔ جلن والے درد اور چڑچڑاہٹ۔

آرسنک الیم 30 'چھ گھنٹے بعد

☆ خون سیاہی مائل اور لوتھڑے والا۔ اتنی شدید نکسیر کہ مریض بے ہوش ہونے لگے اور اس کے کان میں گھیناں سی بجنے لگیں۔ مریض چٹکے یا ہوا کی خواہش کرے۔

چائنا 30 'آدھا گھنٹہ بعد

بائیو کیمک کی فیرم فاس 3x 'چار گھنٹے بعد۔

بیرونی استعمال کے لئے : فیکس ریلیک

'Trillium PQ (Ficus relig Q)

Hamamelis Q ہیمامیلس یا ملی فولیم Q کے 5 تا

10 قطرے ناک میں ڈال کر روئی برف میں بھگو اور نچوڑ کر

نتھنوں میں ٹھونس دی جائے۔



## ٹھنڈ / نزلہ زکام

### Cold, catarrh and Coryza

حقیقتاً "نزلہ زکام" ایک ہی مرض کے دو نام ہیں۔ دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ جب ناک کے اندر کی لعاب دار جھلی متورم ہو جاتی ہے۔ چھینکیں آتی ہیں اور ناک بہتی ہے تو اسے زکام کہتے ہیں۔ جب حلق میں سوزش ہوتی ہے اور کھانسی آتی ہے تو اسے نزلہ کہا جاتا ہے۔ اس مرض کے شروع میں طبیعت ست رہتی ہے۔ سر میں ہلکا سا درد ہوتا ہے۔ پیشانی پر بوجھ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ پانی کی خراش سے ناک کے کنارے ورم آلود ہو جاتے ہیں۔ ناک کے نتھنے سرخ ہو جاتے ہیں۔ حلق اندر سے متورم اور سرخ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے بھی پانی بننے لگتا ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ ہلکا بخار بھی ہو جاتا ہے۔ کھانسی ہوتی ہے اور حلق خشک ہو جاتا ہے بھوک نہیں لگتی اور پیاس بڑھ جاتی ہے۔

پیشاب قلیل مقدار میں اور سرخی مائل آتا ہے۔ ایک دو روز بعد ناک کی رطوبت گاڑھی ہو جاتی ہے۔

نزلہ زکام ایک متعدی مرض ہے اور ایک خوردبینی کیڑے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک مریض سے دوسرے کو لگتا ہے۔

ٹھنڈی ہوا لگنا، پانی سے بھگنا، کھٹی ٹھنڈی اور زیادہ گرم اشیاء کھانا، گردوغبار اور دھوئیں کا ناک میں پہنچنا۔ گرم سرد ہو جانا، نمدار زمین پر بیٹھنا وغیرہ اس مرض کے عام اسباب ہیں معدے کی خرابی اور قبض کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ جسم میں قوت مدافعت کی کمی کے باعث بھی کمزور لوگوں کو یہ مرض جلدی جلدی ہوتا ہے۔

پہلی حالت / مرحلہ

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ چھینکوں کے ساتھ زکام۔ آنکھوں اور ناک سے کثرت سے پانی بہنا۔ گھر کے اندر اور گرمائش سے تکلیف میں اضافہ ہو کھلی ہوا میں بہتر محسوس کرے۔

۱۔ لیم سیپا 30، تین گھنٹے بعد

☆ تمام جسم برف کی طرح سرد۔ جسم اندرونی اور بیرونی طور پر ٹھنڈا۔ جسمانی نظام کو گرمی پہنچانے کے لئے۔

کمفر 6 یا 30، آدھا گھنٹہ بعد



☆ چھینکیں۔ آنکھ اور ناک سے پانی بہے۔ حلق میں سوزش۔ بار بار تھوک نکلنے کی خواہش۔  
منہ سے بری بو آئے۔ بخاری کیفیت پسینہ کے ساتھ۔ جس سے کوئی آفاقہ نہ ہو۔ رات کے  
وقت تکلیف بڑھ جائے۔

مرکیورس سال 30، تین گھنٹے بعد

☆ آنکھوں میں جلن اور پانی بہے۔ ناک سے خراش دار رطوبت نکلے۔

یوفریزیا 30، تین گھنٹے بعد

☆ زکام۔ حلق میں درد۔ چہرہ سرخ۔ سر کی طرف خون کا اجتماع۔

بیلادونا 30، چار گھنٹے بعد

☆ جب سونے لگے تو ناک سے پانی بہنا شروع ہو جائے۔

تھوجا 30 یا 200، چھ گھنٹے بعد

☆ چھینکیں کے ساتھ نزلہ اور اعضاء کی ہڈیوں میں درد۔ گوشت میں دکھن۔

یوپتوریم پروفلیم، تین گھنٹے بعد

☆ خشک سرخ ہوا لگ جانے سے اچانک زکام ہو جائے۔ ٹھنڈ محسوس کرے۔ سر میں درد۔

آنکھوں سے پانی جاری ہو۔ چھینکیں آئیں۔ پریشانی اور خوف۔ بخار کی سی کیفیت۔

اکونائٹ 30 یا 200، دو گھنٹے بعد

☆ ناک خشک۔ سر میں درد۔ حرکت کرنے سے تکلیف بڑھے۔ پیاس زیادہ۔ ہونٹ خشک

اور جھلے ہوئے۔ پاخانہ سخت۔ قبض کے ساتھ۔

برائی اونیا 30 یا 200، تین گھنٹے بعد

☆ ٹھنڈ کا احساس اگرچہ چہرہ گرم ہو۔ بے چینی اور نہ مٹنے والی پیاس۔ اکثر پانی پئے لیکن کم

مقدار میں۔ گرم مشروبات پینے سے اچھا محسوس کرے۔

آرسنک البم 30، تین گھنٹے بعد

☆ کھانا کھاتے ہوئے ناک سے پانی بہے۔

ٹرومبیدیئم (Trombidium) 30 یا

200، چھ گھنٹے بعد

☆ ناک سے خراش دار پانی اور رطوبت بہے۔ جو اوپر والے ہونٹ کو چھیل دے۔ ناک بلغم

یا ریشے سے بھری ہوئی۔ منہ سے سانس لے۔

آرم نرافلم 30، تین گھنٹے بعد





☆ ناک سے سبزی مائل زرد رطوبت خارج ہو۔ ذائقہ اور پیاس ختم ہو جائے۔ کھلی ہوا میں اچھا محسوس کرے۔

ہلکا سیلا 30' چار گھنٹے بعد

☆ موٹے اور پلپے لوگوں کو نزلہ زکام۔ ٹھنڈا محسوس کریں۔ نہانے کے بعد تکلیف بڑھ جائے۔

گلیکیریا کارب 200' چھ گھنٹے بعد

☆ ناک سے گاڑھے زرد رنگ کی رطوبت خارج ہو۔ نزلے زکام کے بعد کی کیفیت۔ قبض ہو۔

ہائیڈرائسٹس 30' چار گھنٹے بعد

☆ زکام جو صبح کے وقت شدید ہو۔ مزمن/پرانا نزلہ زکام خشک ہو۔ ناک سے کوئی رطوبت خارج نہ ہو۔ نہانا پسند نہ کرے۔

سلفر 200' ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ پرانے مزمن اور ضدی کیس۔ جب علامات کے مطابق متعلقہ ادویات ناکام ہو جائیں۔  
نسیلیم (IM Bacillium) ہفتہ وار'

تین مرتبہ

☆ پرانا مزمن نزلہ زکام، خشک، ناک بند۔ سردی اور موسم کی تبدیلی پر تکلیف بڑھ جائے۔

سورینم 200' ہفتہ وار' تین مرتبہ

بائیو کیمک کی درج ذیل ادویات علامات کی مناسبت سے بہت مفید

ہیں۔

1- زردی مائل بلغم۔ گرمائش سے تکلیف بڑھے۔

کالی سلف 6x' چار گھنٹے بعد

2- سر ٹھنڈا۔ گاڑھے سبز زرد رنگ کی رطوبت خارج ہو۔

گلیکیریا فلور 6x یا 12x' چار گھنٹے بعد

3- حاد اور مزمن نزلے زکام کے لئے۔

گلیکیریا فاس 6x' اور نیٹرم میور 12x

چار گھنٹے بعد

# انفلوینزا

## Influenza

(see cold, catarrh also)

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ خشک کھانسی کے ساتھ نزلہ۔ بہت زیادہ پیاس۔ زبان پر سفیدی۔ ذرا سی حرکت سے بھی سرد درد زیادہ ہو جائے مریض خاموش اور تھالینا رہتا پسند کرے۔ دبانے سے بہتر محسوس کرے۔

برائی اونیا البم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ تمام جسم میں درد اور دکھن کا احساس۔ تیز نبض لیکن نمبریکر نبض کی مناسبت سے کم۔ مریض بہت ٹھنڈ محسوس کرے۔ حتیٰ کہ کسی طرح کی گرمائش بھی مریض کو گرم نہ کر سکے۔ کمر اور رانوں میں سخت شدید درد۔ دھڑکن والی تیز نبض۔ سخت بے چینی۔

پائیدو جینم 200 تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ بڑی اعلیٰ درجہ کی دوا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے شدید پیاس۔ سخت بے چینی۔ مریض سخت تھکا ماندہ اور بے سکت۔

آرسنک البم 30 چار گھنٹے بعد

☆ سخت اعصابی کمزوری۔ پھکی رنگت گیس کی علامات۔ تیز بخار۔ جلدی تھک جائے۔ بے سکت ہو جائے۔

کالی فاس 6x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ کپکپی اور کمر میں ٹھنڈے پن کا احساس۔ پسلیوں اور کمر میں شدید درد۔ پھاڑنے والا سر درد۔ ہڈیوں میں ایسا سخت درد جیسے وہ ٹوٹ جائیں گی۔ آنکھیں سوچی ہوئی سرخ۔

یوپٹوریم پرف 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ کمر اور پسلیوں میں درد۔ رات کے وقت ٹاک بند ہو جائے۔ مریض سخت ٹھنڈ محسوس کرے۔ حتیٰ کہ بستر میں بھی سردی لگے۔ ذرا سی بھی حرکت اور ہوا لگنے سے سردی کا



احساس اور زیادہ بڑھ جائے۔ پسینے کے بعد پھر سے ٹھنڈا لگنے لگے اور کپکپی شروع ہو جائے۔  
نکس و امیکا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ ٹھنڈ اور چھینکوں کے ساتھ نزلے کی ابتدائی حالت۔ پسلیوں اور جسم میں تھکن اور  
بھاری پن۔ پیاس ندرد۔ پھاڑنے والا سردرد۔ بڑی مقدار میں پیلا پیشاب آنے سے اتفاق

ہو۔  
جیلی میم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ معاون دوا۔

انفلوآنزیم 200 اور سلفر 200

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x کالی میور 6x اور نیڑم سلف 12x  
بھی مفید ادویات ہیں۔ جو تین تین گھنٹے بعد دی جانی چاہئیں۔

## نزلے زکام کے ساتھ بخار

### Hay fever

(See allergic Rhinitis, cold or catarrh also)

نزلے زکام میں سینہ جکڑ جاتا ہے۔ سر میں درد اور بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ناک سے پانی  
بہتا ہے۔ چھینکیں آتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ نبض تیز چلتی ہے۔ حلق میں خراش ہو  
جاتی ہے۔ انہی اسباب سے بخار ہو جاتا ہے۔ عام طور پر بخار 102 درجے سے زیادہ نہیں ہوتا  
ہے لیکن مریض ست اور کامل سا ہو جاتا ہے۔

### علامات 'دوا اور طاقت' دورانیہ

☆ مزمن نزلہ زکام۔ مریض جلدی ٹھنڈ سے متاثر ہو جائے۔

سورینم 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین  
مرتبہ

☆ گلے میں مقامی چھین۔ نزلہ اور بہت زیادہ چھینکیں۔

سہاڈیلا 30 'دو گھنٹے بعد

☆ ناک سے اتنا زیادہ پانی بہے کہ نتھنے چھل جائیں اور زخم بن جائیں۔ ناک بند۔ چھینکیں  
آئیں۔ ناک بھری ہوئی۔ ناک میں کھجائے یا نوچے۔ رات کے وقت تکلیف بڑھ جائے



☆ نلک ٹھنڈی ہوا لگ جانے سے اچانک بخار ہو جائے۔

☆ آٹکھوں سے جلن والا پانی رطوبت اور ناک سے بے ضرر رطوبت، پانی نکلے۔ شدید قسم کی چھینکیں۔ کھلی ہوا میں تکلیف بڑھ جائے۔

یوفرزیا 30، چار گھنٹے بعد

☆ جب گرم ہو تو ٹھنڈ محسوس کرے۔ لگاتار چھینکیں۔ ناک بھری ہوئی۔ آٹکھوں اور ناک سے پانی بے۔ مرطوب اور کھلی ہوا میں تکلیف بڑھ جائے۔

ڈکامارا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ بہت زیادہ چھینکیں آئیں۔ آٹکھوں اور ناک سے اس قدر پانی بے کہ ناک اور ہونٹ سوچ جائیں۔ گھر کے اندر اور صبح کے وقت تکلیف میں اضافہ ہو۔ کھلی ہوا میں بہتر ہو۔

۱۔ سلیم سیپا 30، دو گھنٹے بعد

☆ ناک، آٹکھوں اور چہرے پر جلن اور سوزش۔ اونچی آواز میں چھینکیں۔ رات کے وقت ناک بھری ہوئی اور بند۔ مریض ٹھنڈ محسوس کرے اور مزاج میں چڑچڑاہٹ ہو۔

نکس دامیکا 30، چار گھنٹے بعد

☆ نہ مٹنے والی پیاس۔ ناک سے پانی کی مانند رطوبت خارج ہو اور اس سے جلن ہو۔ چھینکتے ہوئے درد ہو۔ شدید قسم کی بے آرائی اور بے چینی ہو۔

آرسنک الہم 30، تین گھنٹے بعد

☆ آٹکھیں گرم اور بھاری محسوس ہوں۔ تمام جسم میں درد ہو۔ پیاس ندارد۔ صبح کے وقت ناک بے۔ تیزابی پانی جس سے ناک چھل جائے یا کھال پھٹ جائے۔ شدید قسم کی چھینکیں۔ پیشاب کرنے کے بعد بہتر ہو۔

جیلی میم 30، چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی نیزم میور 6x یا 12x کی تین گھنٹے بعد خوراک دینا بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔

# چھینکیں

## Sneezing

(See catarrh, cold, cough and allergies also)

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ جسم کے درد کے ساتھ چھینکیں آئیں۔ ریزہ کی ہڈی کے اوپر سردی کا احساس۔ سستی اور اونگھ ہو۔

جیلی میم 30، تین گھنٹے بعد

☆ سرد خشک ہوا لگ جانے کی وجہ سے چھینکیں آئیں۔

اکونائٹ 30 یا 200، دو گھنٹے بعد

☆ گرم کمرے میں داخل ہونے پر چھینکیں شروع ہو جائیں۔ کھلی ہوا میں بہتر ہو۔

۱۔ سلیم سیپا 30، تین گھنٹے بعد

☆ جلن کے ساتھ مھلنے والی رطوبت خارج ہو۔ بے چینی ہو اور تھوڑے وقفے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی پینے کی خواہش ہو۔

آرسنک اہم 30، تین گھنٹے بعد

☆ معاون دوا۔

مٹی لینم 1M، ایک خوراک

## الرجی سے ناک میں ورم

### Allergic Rhinitis

(نزلہ زکام، ناک کی نالی کی سوزش اور کھانسی بھی دیکھئے)

الرجی سے مراد ایک قسم کا رد عمل ہے جو کسی خاص چیز پر کسی فرد کی جانب سے ہوتا ہے جبکہ دوسرے بہت سے افراد پر اس چیز کا اس طرح کا رد عمل نہیں ہوتا ہے اور نہ ان پر اس قسم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں جیسی کہ کسی ایک شخص پر ہوں۔ مثلاً ذیل روئی کی خوشبو سے گھر کے کسی شخص پر زکام ہو جائے جبکہ اسی گھر کے دوسرے افراد پر اس کے کھانے تک سے کسی

قسم کے اثرات نہ ہوں۔ ہائمن اعظم نے خود اس صورت حال کو بیان کیا ہے کہ بعض چیزوں سے بعض لوگ الرجک ہوتے ہیں جبکہ دوسروں پر کسی قسم کے اثرات نہیں ہوتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ گردوغبار سے الرجک جس کے نتیجے میں نزلہ زکام ہو جائے۔ ناک سے کثیر پانی بہنے لگے۔ چھینکیں آنے لگیں۔ خصوصاً "شام کے وقت۔ سر کے اگلے حصے یا ماتھے میں ہلکا سا درد ہو اور آنکھوں سے ہلکا سا ارادہ آنسو نکلنے لگیں اور آنکھوں میں جلن ہو۔

بسیا 30، ہر چار گھنٹے بعد

☆ گردوغبار، دھوئیں، خوشبویات اور خوشبو کے چھڑکاؤ سے الرجک۔ جس سے ناک اور حلق کی نالی متاثر ہو اور ناک بند ہو جائے۔ چھینکیں آنے لگیں اور کھانسی ہو جائے۔

ہسٹائین 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ کثیر مقدار میں ناک سے پانی بہے۔ ناک کے اندرونی حصے میں جلن اور شدید جھین۔

سولانم لائیو پر سینم 30، چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی نیزم میور 12x اور نیزم سلف 12x ہر تین گھنٹے

بعد دینے سے بھی بہتر نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

## ناک کے مے

### Polypus

(Nasal)

ناک کے اندر پلپے ریشہ دار سفیدی مائل سرخ رنگ کے مے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جسکی وجہ سے مریض کو اکثر زکام کی شکایت رہتی ہے۔ ماؤف جانب کا نھنا بند رہتا ہے۔ کبھی ناک سے خون بھی آجاتا ہے۔ ناک کا نھنا بند ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ مہا بڑا ہو جائے تو ناک کی شکل بگڑ جاتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ ناک کے مے کی بہت اعلیٰ دوا۔ بو، قوت شامہ جاتی رہے۔ ناک سے کثیر مقدار میں

رطوبت نکلے۔ ناک میں رکاوٹ ہو یا ناک بند ہو جائے۔

لیمنا مائن Q یا 30، چار گھنٹے بعد



☆ بو سونگھنے کی صلاحیت کے خاتمے کے ساتھ ناک کا گومڑ۔ ناک کی جڑ میں درم ہو۔  
مریض جلدی ٹھنڈ پکڑے۔ موسم کی تبدیلی پر تکلیف میں اضافہ ہو۔ سر کے دائیں جانب

درد۔  
سنگونیا C 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ رطوبتی گومڑ جس سے آسانی سے خون خارج ہو۔ خشک یا تر نزلہ زکام۔ ٹھنڈ محسوس  
کرنے والا مریض۔  
کلیریا کارب 200 یا 1M 'ہفتہ وار'

تین مرتبہ

☆ مریض جس سے اس طرف کی ناک بند ہو جائے۔ مرطوب موسم میں تکلیف  
بڑھے۔  
یوکریم مارم 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ ناک کے نتھنوں میں سوزش۔ ٹھنڈ محسوس کرنے والا مریض۔ ناک بند ہو جائے۔ مریض  
ٹھنڈ لگنے کی رغبت رکھتا ہو۔ پردہ حاجب میں سوراخ ہو جائے۔  
سلیسیا 6x یا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ اکثر اوقات چھینکیں آئیں۔ ناک کے گومڑ سے آسانی کے ساتھ خون بننے لگے۔ بدبو کا  
دہم۔ ٹھنڈے مشروبات کی خواہش کرے۔  
فاسفورس 200 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

بایو کیمک کی کلیریا فاس 6x یا 12x بھی مفید دوا ہے۔



# کان کا بہنا

## Otorrhoea

(Discharge from the Ears)

شروع میں کان درد کے ساتھ ہلکا بخار ہو جاتا ہے۔ کان میں درد کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی۔ کان کی نالی متورم ہو کر سرخ ہو جاتی ہے۔ درم بڑھنے سے سماعت خراب ہو جاتی ہے۔ دو تین روز میں سوزش میں کمی آجاتی ہے البتہ زرد رنگ کی پتلی رطوبت خارج ہونے لگتی ہے۔ جو روز بروز گاڑھی ہوتی جاتی ہے اور پیپ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خسرہ اور خناق وغیرہ کے دوران بننے والے کان کا مواد متعدی ہوتا ہے۔ لہذا دوسرے مصمتند لوگوں کو اس سے پرہیز اور احتیاط کرنی چاہئے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ قوت سماعت کی کمی کے ساتھ کان کا اندرونی حصہ سوجا ہوا محسوس ہو۔ پانی کی مانند مادہ خارج ہو جس میں سڑے ہوئے گوشت کی سی بو آئے۔

تھو جا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ سخت بدبو دار کثیر پانی کے اخراج کے ساتھ کان کا قدرے سوزشی ہونا۔ دماغی انیسیا کی وجہ سے نیچے کی جانب حرکت کرنے سے خوف محسوس ہو۔

پوریکس 30، چار گھنٹے بعد

☆ کان کے سوراخ میں زخم جس سے کھال چھلے۔ ٹھنڈ سے بہت زیادہ حساس۔ کثیر مادہ خارج ہو۔ کان سے پیپ اور خون خارج ہو۔ گلے کے اور کان کے غدودوں کا پکنا۔ متاثرہ کان میں چکن، دھڑکن اور گڑگڑاہٹ سی ہو۔

مرکیورس سال 30 یا 200، چار گھنٹے

بعد

☆ سفلس کی وجہ سے کان سے عرصہ دراز تک مادہ خارج ہوتا رہے۔

اورم آر سکم 30 یا 200، 10 منٹ

بعد، تین مرتبہ

☆ جب کوئی چیز چبائے تو بائیں کان میں شدید درد ہو۔ دونوں کانوں میں سوجن اور سرخی

ہو۔ لال بخار کے بعد کی تکلیفات کے لئے۔

ایس ملفیکا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ قبض کے ساتھ پاخانہ ہو۔ کان کی اندرونی نالی میں سے گلے کے اندر رطوبت کے قطرے  
گریں۔ کان سے گاڑھی رطوبت خارج ہو۔

ہائیڈراسٹس کین 30 'چار گھنٹے بعد'  
☆ مریض ٹھنڈ 'درد اور چھوئے جانے سے بہت زیادہ حساس ہو۔ چیرنے والے درروں کے  
ساتھ بدبو دار مادہ خارج ہو۔

ہیبر سلف 30 'چار گھنٹے بعد'  
☆ ناقابل برداشت خارش 'بدبودار کثیر پیلا سا مادہ خارج ہو۔ رطوبت جم جائے اور کھرنڈ سے  
بن جائیں۔

سورینیم 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین  
مرتبہ  
☆ کان سے بدبودار رطوبت خارج ہو اور ہڈیوں کی تکلیفات بھی ہوں۔ ہڈیاں کھرنے لگیں یا  
ان میں زخم ہوں۔

اسفوڈا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ  
☆ کان میں درد ہو اور سبزی مائل پیپ خارج ہو۔ کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں تکلیف میں افاق  
ہو۔

ہلساٹلا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ  
☆ گاڑھی پیلی اور بدبودار پیپ خارج ہو۔ کان کے اندر گہرائی تک درد ہو۔ کانٹے اور چبھنے  
والے درد جو کہ کان سے گلے تک پھیلے۔

کالی بائی کروم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
☆ سردی۔ زکام کی وجہ سے بہرہ پن اور گلے سے درد کان کے درمیان تک جائے۔ کان  
کے اندر درم۔ سوجن کان سے شروع ہو کر گالوں تک پھیل جائے۔

جیلی میم 30 'چار گھنٹے بعد'  
☆ کثرت سے پتلا مواد جیسا زخموں سے رستا ہے خارج ہو۔ کانوں میں ریگنے کے سے

احساس کے ساتھ کان کی نالی میں جلن اور خارش اور درد۔  
آرسنک الیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ بدبودار پانی جیسا اور دہی کی طرح کا مادہ خارج ہو۔ ناک کے اندرونی حصے میں بھی ورم ہو اور اوپری حصے میں کھرنڈ ہو۔ کان اور حلق کی درمیانی نالی اور کان میں خارش اور درد۔  
سلیسیا 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'

☆ کان کی حاد بیماری جبکہ مزمن بیماری میں حاد علامات ظاہر ہوں۔  
بیلڈونا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ کثیر تیزابی رطوبت کا اخراج۔ قوت سماعت کمزور۔ کسی گاڑی میں بیٹھنے اور سفر کرتے ہوئے تکلیف میں اضافہ ہو۔  
ٹائٹریک ایسڈ 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'

☆ پانی کا سا گاڑھا بدبودار مادہ۔ بدبودار پیپ۔ کان کے اندرونی حصے کا ورم۔ مریض ٹھنڈ محسوس کرے۔ پیاس ندارد۔ پیشاب کے بعد بہتر ہو۔  
سنس کین 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ بدبودار پیپ کا اخراج اکثر ہو جائے۔ دائیں کان میں شدید جھجھن خاص طور پر کان کے ڈھول کے قریب۔  
زئکم میٹلیکم 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'

☆ کنپی کی ہڈی کے قریب گاڑنے والا درد اور جلن۔ کثرت سے بدبودار مادہ خارج ہو۔  
کالی آیوڈیم 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'

☆ کان کے پردے کی سوزش۔ کان کا ڈھول پھٹ جائے۔ پیپ ٹپکنے لگے جو ابتداء میں صاف ہو لیکن بعد میں گندی ہو جائے۔ مچھلی کی سی بدبو آنے لگے۔  
نیلیوریم 30 'چار گھنٹے بعد'

بائیو کیمک کی ٹکیریا فاس 6x کالی میور 6x اور سلیسیا 30

بھی مفید ادویات ہیں۔





# کان/کان کا درد/سوزش و دیگر تکالیف

Ear/Ear affections, Ear ach (otalgia)

کان کی سوزش اور ورم کی وجہ سے شدید درد اور ٹیس ہوتی ہیں جو چہرے اور پیشانی تک جاتی ہیں۔ مریض سخت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اکثر یہ درد عصبی ہوتا ہے اور اس وقت کان میں ورم اور سوزش نہیں ہوتی ہے۔ البتہ درد ناقابل برداشت اور شدید ہوتا ہے۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کان میں میل جمع ہو جانے کی وجہ سے اس کا دباؤ/درد۔

سپائی جیلیا 30 یا 200 '10 منٹ بعد'

تین مرتبہ

☆ اچانک ہوا لگ جانے سے کان درد۔

اکونائٹ 30 یا 200 'دو گھنٹے بعد'

☆ کان سے زردی مائل گاڑھی رطوبت خارج ہو۔ ٹھنڈی جگہ اور ٹھنڈی ہوا میں بہتر محسوس کرے۔

پلساٹیل 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد'

☆ سرخ چہرے کے ساتھ تپکن والا درد۔ گرمی کا احساس۔ سر کی جانب خون کا بہاؤ۔

بیلادونا 30 'دو گھنٹے بعد'

☆ نزلے زکام سے جلد متاثر ہونے والے مریض لیس دار بلغم کے ساتھ۔

کالی بائی کروم 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ ناقابل برداشت کان درد۔ گرمائش سے زیادہ بڑھے۔ رات کے وقت اور غصے کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو۔

کیومیلا 30 یا 200 'دو گھنٹے بعد'

☆ کان میں پھنسی کی وجہ سے درد۔ پردے میں چھید یا سوراخ۔ بدبودار پیپ خارج ہو۔ ٹھنڈے تکلیف بڑھے۔

ہیبرسلف 200 '10 منٹ بعد' تین

مرتبہ

☆ کان اور حلق کے درمیان کی نالی میں شدید درد۔ شدید ٹھنڈک محسوس کرے۔ کمرے



اندر اور کرائش سے تکلیف پڑھے۔

ایلم سپا 30 یا 200 دو گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی کالی میور 6x اور فیرم فاس 6x کے بعد دیگر دو گھنٹے بعد دی جائے۔ بیرونی استعمال یا کان میں ڈالنے کے لئے Mulleinoll ایئر ڈارپس۔

دیگر مفید ادویات : کالوسنتھ، سلفر، سفلیٹیم، پائیرو بنیم وغیرہ۔

## کن پیڑے / گل سوئے

### Mumps

(See fever also)

اس مرض میں کان کے نیچے کا غدود جسے پیروڈنڈ گلینڈ کہتے ہیں سوج جاتا ہے اور بخار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مرض وبا کے طور پر پھیلتا ہے اور عام طور پر زندگی میں ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ مرض کی ابتدا میں سردی کے ساتھ بخار چڑھ جاتا ہے۔ ایک کان کے ارد گرد درم ہو جاتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے۔ غدود متورم اور سخت ہو جاتے ہیں۔ چوتھے روز کے بعد آرام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آٹھ دس روز میں بالکل آرام آجاتا ہے۔ مرض کے شدید حملے کی صورت میں بخار تیز ہو جاتا ہے اور دوسری طرف کا غدود بھی درم آلود ہو جاتا ہے۔ منہ کھولنے اور جڑوں کو حرکت دینے سے درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ حفظ ماقدم یا علاج شروع کرنے کے لئے بہترین دوا۔  
☆ خشک لٹھنڈی ہوا لگ جانے کے بعد یا اچانک کن پیڑے نکل آتا۔ بے چینی، اضطراب اور خوف کے ساتھ بخار بھی ہو۔

اکونائٹ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ شدید درد اور سوجن ہو۔ جب سوجن اور سرخی اودے یا ارغوانی رنگ کی ہو جائے۔  
لیکے سس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ سوجن کے اوپر کانوں کے اندر پھاڑنے والے درد۔ جلد پیلی ہو۔ متاثرہ حصہ سخت اور درد بھرا ہو۔

فاسٹولا کا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' چھ

مرتبہ

☆ پیلی سوجن۔ زبان موٹی بھاری سی۔ بھیگی ہوئی زبان پر دانتوں کے نشان۔ پیاس کے ساتھ بڑی مقدار میں تھوک۔

مرک سال 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

چھ مرتبہ

☆ جب ورم سخت ہو جائے۔ مریض تازہ ہوا اور نچکے کی خواہش کرے۔

کاربووٹج 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ زبان کی نوک سرخ۔ سوجن اور سوزش بخار کے ساتھ سخت بے چینی۔

رہس ٹاکس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

چھ مرتبہ

☆ جبکہ کان متاثر ہوں اور ان میں درد ہو۔ گرمی سے تکلیف بڑھے۔ کھلی ہوا اور ٹھنڈ میں بہتر ہو۔ پیاس ندارد۔

ہلسٹیل 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' چھ

مرتبہ

☆ بخار، خسرہ یا چمچک کے ساتھ۔ ناقابل برداشت درد۔ نہ بچنے والی پیاس۔ ایک وقت میں تھوڑا پانی پئے لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد۔ سخت بے چینی اور پریشانی ہو۔

آرسنک الیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ پسینے کے ساتھ گردن اور چہرہ تھمٹایا ہوا سرخ۔

پلوکار میور 3x یا 6 'چار گھنٹے بعد'

☆ سوجن چمکدار اور سرخ اور گرم۔ چھپنے والے درد کانوں کی طرف بڑھیں۔ چہرہ سرخ تھمٹا ہٹ والا۔

بیلادونا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x اور کالی میور 6x بھی بہت مفید

ادویات ہیں۔

# زائدہ حلمیہ / کنپٹی کی ہڈی کا پچھلا ابھار

## Mastoid Process

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ تیر کی طرح کے درد۔ بیرونی دباؤ، چھونے اور ٹھنڈی ہوا سے بہت زیادہ حساس۔ درد بھری سوزش اور زخم۔

☆ گہرائی تک تکلیف دہ پیپ کا اجتماع۔ درد اور سوجن۔ کنپٹی کی ہڈی کے پچھلے ابھار کا کھڑنا یا ہڈی تحلیل ہونا۔

☆ کپسی کم 30، تین گھنٹے بعد، چھ مرتبہ  
حار کے کیسوں کے لئے اور مزمن  
کیسوں کے لئے اونچی طاقتیں  
☆ سوجی ہوئی اور چھونے سے درد اور تکلیف محسوس ہو۔ کھینچنے اور پھاڑنے والا درد۔  
کھانسنے اور نکلنے ہوئے چوٹ سی لگے۔

☆ سلیسیا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد  
☆ سوزشی مرحلے کے لئے۔ متاثرہ حصہ سرخ اور گرم ہو۔

☆ پلاؤ، 30 یا 200، چار گھنٹے بعد  
☆ بائیں جانب کی سوزش اور سوجن۔ یا بائیں جانب ابھی شروع ہوئی ہو۔ چیرنے اور  
کترنے والے درد۔ ایسا درد جیسا گھن کھا رہا ہو۔ رات کے وقت تکلیف میں اضافہ ہو۔  
مرکبوس بن آیوڈاڈا 3x تین  
گھنٹے بعد

☆ زیادہ بیٹس کے مریضوں کے لئے۔ زیادہ بیٹس کے نقصانات کو روکنے کے لئے۔

☆ فلورک ایسڈ 30 یا 200، چھ گھنٹے بعد

☆ معاون دوا۔

☆ سلفر 200 یا 1M، ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ بائیو کیمک کی ٹکڑ یا سلف 6x بھی مفید دوا ہے۔





# کان کا گومڑا / مسہ

## Ear Polypus

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ مزمن سوزش کان۔ کان کے درمیان میں مسہ۔  
تھوچا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ بائیں کان کے اندر گومڑا۔ ہوا سے بہت زیادہ حساس۔ گال کی ہڈی سے شروع ہو کر کان کے اندر جانے والا پھاڑنے والا درد۔  
لیکے سس 30 یا 200، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ کان کے بیرونی سوراخ یا چھید میں گومڑا ہو۔  
مرکبوس کار 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ مریض کو ہوا لگنے سے مس ہونے کی رغبت ہو۔ ناک کے سوراخ کے پیچھے سوزش اور پانی۔ مریض کو قبض ہو۔  
ہائیڈراسٹس 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ بائو کیمک کی کالی سلف 6x بھی مفید دوا ہے۔

## بہرہ پن

## Deafness

ضعف دماغ، وجع الفاصل، چیچک، شرح بخار، آتشک، سردی لگنے یا کان میں میل بھر جانے، یوسے کین ٹیوب میں نقص پیدا ہو جانے، عام کمزوری، رطوبت کا اخراج رک جانے اور نکلنے کے غدد بڑھ جانے کی وجہ سے اونچا سنائی دینے لگتا ہے۔ بعض دفعہ بجلی کی کڑک، توپ کی آواز یا کسی اونچی آواز یا دھماکے سے بھی قوت سماعت متاثر ہو جاتی ہے۔ مریض کم سننے لگتا ہے یا مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں یا سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ کسی صدے یا اعصابی تناؤ کھپاؤ یا گزبڑ کی وجہ سے بہرہ پن ہو جائے۔  
مینسیا کارب 30 یا 200، چار گھنٹے بعد



☆ اچانک یا سخت ٹھنڈی ہوا لگ جانے سے بہرہ پن۔

اکونائٹ 200 یا 1M چار گھنٹے بعد

☆ ایگزیم۔ یا کسی رطوبت خارج ہونے کو روکنے کے نتیجے میں

لو۔ بلیا انفلٹا 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ سردی محسوس کرنے والے مریض۔ جن کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں اور موسم کی تبدیلی سے بہت زیادہ حساس ہوں۔

کلکیریا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار  
تین مرتبہ

☆ صرف آواز سنائی نہ دیتی ہو۔

ہینوپوڈیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ کان سے متعلقہ اعصاب کے فالج کی وجہ سے بہرہ پن۔

کاشی کم 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ صرف انسانی آواز نہ سن سکتا ہو۔

فاسفورس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ ایسا محسوس کرے کہ کان بند ہو گئے ہیں یا ان میں کوئی بیرونی چیز پھنس گئی ہو۔ ٹھنڈ اور ہوا میں اچھا محسوس کرے۔

ہلساٹیا 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ شور شرابے والی جگہ کم سنائی دے۔ کار اور بس وغیرہ میں چڑھتے ہوئے زیادہ بہتر سن سکے۔

گریفائٹس 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ لال بخار کے بعد کا بہرہ پن۔ مریض ٹھنڈ اور چھوئے جانے سے غیر معمولی حساس۔

ہیبیر سلف 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ کان اور حلق کے درمیان کی ٹالی بند/ رکاوٹ ہونے کی وجہ سے بہرہ پن۔

مرکیورس ڈلس 30 یا 200 چھ گھنٹے

بعد

☆ معاون دوا۔

سلفر 200 یا 1M ہفتہ وار تین مرتبہ

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x کالی میور 6x اور سلیسیا 30x ہر

چار گھنٹے بعد دینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔

## کان کا میل

### Wax in Ears

جسم کے دوسرے اعضاء کی طرح کان کی صفائی بھی نہایت ضروری ہے۔ صفائی نہ کرنے کی وجہ سے کان میں میل جمع ہوتا رہتا ہے جس سے قوت سماعت متاثر ہوتی ہے اور اونچا سنائی دینے لگتا ہے۔ مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کان کا معائنہ کرنے سے میل واضح طور پر نظر آتا ہے۔ لہذا وقتاً فوقتاً کان صاف کرتے رہنا چاہئے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ قوت سماعت ناقص ہو۔ سرخ خون کی رنگت کی میل۔

کوئیم میک 200 یا 1M 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ سننے میں دقت ہو۔ پیاس نہ ارد۔ کانوں میں سخت اور پیلی میل ہو۔

پلساٹیل 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ کانوں میں الفاظ کی آوازیں گونجیں۔ بہرہ پن۔ بہت زیادہ میل ہو۔

کاشی کم 200، 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ کانوں میں شدید کاٹنے والا درد۔ کانوں میں پیلی، سفید سی اور سخت میل۔

لیکے کس 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ بدبو۔ کانوں کے پیچھے ورم اور درد۔ سرخی مائل میل۔

سورینم 200 یا 1M 10 منٹ بعد، تین

مرتبہ



# ورم زرخره / آلہء صوت کی سوزش

## Laryngitis

(See hoarseness also)

اس مرض میں خنجرہ / زرخره اور ہوا کی نالی کی جھلی پر ورم آجاتا ہے اور گاڑھی رطوبت پیدا ہو جاتی ہے۔ گلے میں سوزش ہوتی ہے۔ نکتے اور بولتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ گلے میں خشکی آ جاتی ہے۔ خشک کھانسی ہوتی ہے۔ تنگی نفس ہوتی ہے۔ اپلی گلاش سرخ اور پھولا ہوا ہوتا ہے۔ آنکھیں سرخ اور جسم گرم ہو جاتا ہے۔ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ زرخرے میں سوزش اور چھین ہوتی ہے۔ عموماً یہ مرض نزلے سے پیدا ہوتا ہے۔ بخار بھی ہو جاتا ہے۔ آواز بھدی ہو جاتی ہے۔ ترش اور زیادہ گرم اشیاء کے کھانے پینے، سردی لگنے، بارش میں بھیگنے زیادہ گرم غذا کھانے اور گلے میں گرد و غبار کی وجہ سے خراش ہونے سے یہ مرض اکثر لاحق ہو جاتا ہے۔ زیادہ چلانے، اونچا بولنے اور خنجرے پر چوٹ لگنے سے بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ گلے کا بیٹھنا اور آواز کا کھو جانا۔ گانے والوں کے گلے کی پرانی سوزش۔ آواز اونچی کرنے سے کھانسی شروع ہو جائے۔

ار بنٹم ٹائٹرکیم 30 یا 200 چار گھنٹے

بعد

☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والے موٹے اور پلپے مریض۔ ہوا کی نالیوں میں شدید جلن۔ خشکی اور چیرنے والی کھانسی۔ خاص طور پر رات کے وقت مزمن آلہء صوت کی سوزش۔

کلکیریا کارب 30 یا 200 چار گھنٹے

بعد، تین مرتبہ

☆ آواز اور گلا بیٹھا ہوا۔ آلہء صوت اتنا حساس کہ چھوٹے تک سے تکلیف ہو اور ہوا تک لینے میں دقت ہو۔ گلے کی سوزش کی وجہ سے بخار۔

اکونائٹ 30 چار گھنٹے بعد

☆ نزلہ وی سوزش گلا۔ گلا بیٹھی ہوئی کھانسی ایسا محسوس ہو کہ آلہء صوت پھل جائے گا۔

۱۔ لیم سیپا 30 چار گھنٹے بعد

☆ سفید لیس دار مادہ کے اخراج کے ساتھ گلا بیٹھا۔ آواز بیٹھنا یا کھو جانا۔ بدبو دار سانس۔

۲۔ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد



کھانسی کے ساتھ ٹھنڈے پن کا احساس۔ زرخہ میں چھین۔ خشک ششی کھانسی۔ جس سے گلے میں کھچاؤٹ ہو۔ بولتے ہوئے آلہء صوت میں بہت زیادہ ارتعاش۔

فاسفورس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ مزمن گلے بیٹھنے کی تکلیف بھاری پن کے ساتھ۔ بافتوں کی سوجن اور لیس دار مادے کا اخراج۔ صبح کے وقت تکلیف بڑھے۔ گیسوی یا پھلے دار آلہء صوت کی سوزش۔ لیس دار اور تاردار مواد یا تھوک نکلے۔

کالی بائی کروم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ زرخہ خشک اور کچا پکا سا۔ پانی والا یا استقامتی سوزش صوت۔ چھوٹے سے بھی تکلیف ہو۔ گلا بیٹھ جائے۔ گلے میں کسی چیز کے بھسنے کے احساس کے ساتھ گھٹن۔

لیکے سس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ آلہء صوت کا استقامت۔ گیسوی سوزش۔ خشک کھانسی اور زرخہ میں جلن اور چھین۔ گلے میں ارتعاش اور جلن۔

کالی آیوڈیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ شدید قسم کا گلا بیٹھنا جس میں کتے کے بھونکنے کی سی رف کھانسی ہو۔ تھوک نکالنا مشکل ہو۔ گلا بیٹھنے کے ساتھ معمولی سی گھٹن اور تشنج بھی ہو۔ صبح کے وقت تکلیف بڑھ جائے۔ درد اور چھین۔ کوئی چیز نکلنے ہوئے ایک کان سے دوسرے کان کی طرف بڑھتا ہوا درد محسوس ہو۔ قلیل مقدار میں پیپ بھی خارج ہو۔

بیبیر سلف 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ گانے والوں کا گلا بیٹھنا جس میں آواز بند ہو جائے۔ گرمائی پہنچانے یا سیکائی کرنے سے بہتر ہو۔ گرم کمرے میں بھی افاتہ ہو جبکہ آرام کرنے کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔

انٹم کروڈم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ سفلس کی وجہ سے گلا بیٹھنا۔ گلے کے اعضاء سوجے ہوئے جن کی رنگت کالی سی ہو جائے اور بہت زیادہ کھانسی اور خشکی ہو۔

مرک سال 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ زرخہ سے بلغم یا لعاب سا نکلے۔ آواز بیٹھی ہوئی۔ گلے میں چھین۔ زرخہ پر پریشر کی وجہ سے کھانسی بڑھ جائے۔ شام کے وقت تکلیف بڑھ جائے۔

رومیکس 30 چار گھنٹے بعد



☆ زخروں اور حلقوم کی سوزش۔ اندرونی ورم اور مسلسل درد۔ آواز ٹپٹپی ہوتی۔ آواز کمزور اور دہلی ہوئی اور گلا بیٹھا ہوا۔

اورم ڈرافٹلم 30 چار گھنٹے بعد

☆ شدید اشتقا۔ آلہء صوت کی سوزش۔ گلے میں خشکی اور بیٹھا ہوا۔ گلا ورم آلود اور سرخ۔ گاڑھی رطوبت یا لعاب والا تھوک۔

سینٹونیٹیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ آلہء صوت میں جلن دار درد۔ جلدی جلدی مختصر اور خشک بھاری کھانسی دوروں کی شکل میں۔ زیادہ تر دن کے اوقات میں۔ رات کے وقت نسبتاً کم اور گرم بستر میں افاتہ ہو۔

آرسنک الیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ حلقوم اور زرخہ کا لسر۔ آواز میں اونچا نیچا پن۔ خشک پن۔ جلن دار کھانسی۔ ناقص قوت گویائی۔ حلقوم اور زرخہ میں سختی اور کچھاؤ سوزش اور گلا بیٹھنے کے ساتھ۔

ایوڈیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ آلہء صوت کی سوزش اور لگاتار مختصر خشک کھانسی۔

ایٹینم میٹلیکم چار گھنٹے بعد

☆ آلہء صوت کی سوزش کی وجہ سے ہونے والی پرانی کھانسی جس میں تھوک یا لعاب نہ ہو۔ چھین اور بھلن کا احساس جیسے کوئی زخم یا لسر ہو۔ عام طور پر ایک طرف محسوس ہو۔ مزمن خشک کھانسی جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہو اور سارے دن ہوتی رہے۔

ٹائٹریک ایسڈ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ بات کرتے ہوئے زرخہ میں کھچاؤ ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ زرخہ میں کوئی پر پھنسا ہوا ہے۔

ڈرو سرا 30 یا 200 10 منٹ بعد تین

مرتبہ

☆ نچلے جڑے کے غدودوں کی سوزش اور ورم۔ زرخہ سوجا ہوا۔ سانس لینے میں بھی وقت ہو جیسے گلے میں کچ پھنسا ہوا ہو۔ زرخہ بہت زیادہ خشک ہو اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھونکنے کی سی کھانسی ہو۔ زرخہ میں جلن اور چھین کے ساتھ خشک کھانسی۔

سپا نیچیا 30 چار گھنٹے بعد

☆ گانے والوں کے زرخہ کا زلہ۔ آلہء صوت کے پٹھے کام کرنا چھوڑ دیں۔ اونچی آواز میں نہ بول سکے صبح اور شام کو تکلیف بڑھے۔

کاشی کم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ حاد سوزش آلہء صوت۔ حلقوم چمک دار سرخ۔ بات کرتے ہوئے زرخہ میں درد اور تکلیف ہوتی ہے۔

بیلادونا 30 چار گھنٹے بعد

## سوزش حلقوم

### Pharyngitis

(See other throat Troubles also)

اس مرض میں لوزتین کے ساتھ ساتھ ٹانسلز بھی سرخ اور متورم ہو جاتے ہیں۔ حلق میں سرسراہٹ اور کھرکراہٹ ہوتی ہے۔ ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے۔ گلے میں خشکی اور گرمی محسوس ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے۔ حلق کی جھلی متورم اور سرخ ہو جاتی ہے۔ گلے میں سوزش اور خراش ہوتی ہے۔ بار بار کھانسی آتی ہے۔ گلے میں کوئی چیز انکی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مریض کو تھوک نگلنے اور بات کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے۔ کوئی چیز نگلتے ہوئے درد محسوس ہوتا ہے۔ درم کان کی طرف بڑھتے جانے سے بہرہ ہونیکا خدشہ ہوتا ہے۔ بیماری پرانی ہو جائے تو گلیٹیوں میں پیپ پڑ کر زخم بننے کا خطرہ ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ حلقوم کے پٹھوں کے فالج کے لئے۔

لیکے کس 30 چار گھنٹے بعد

☆ پاخانہ قبض کے ساتھ ہو۔ شدید پیاس۔ گلہ خشک ہو۔

نیزم میور 30 چار گھنٹے بعد

☆ گلا سو جا ہوا۔ گلے کا مزمن نزلہ زکام۔

سلیسیا 12x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ سوزش حلقوم کھانسی اور لیس دار سفید مادہ کے اخراج کے ساتھ۔

کالی بائی کرم 30 چار گھنٹے بعد

☆ سوئی کے ٹاکے کی مانند باریک سے زخم کے ساتھ سوزش حلقوم جس میں سے آسانی سے خون رے۔

بیلادونا 30 تین گھنٹے بعد

☆ گلے کے زخموں پر سفید دھبوں کے ساتھ سوزش حلقوم۔  
 فاسٹولا کا 30' چار گھنٹے بعد  
 بائو کیمک کی کالی میور 6x اور فیرم فاس 6x بھی مفید ادویات  
 ہیں۔

## ورم آلود گلا (گلے کی ورم)

### Sore Throat

(See Hoarseness also)

گلے کی سوجن کی وجہ سے تیز بخار ہو جاتا ہے۔ گلے کے غدود بڑھ کر سرخ ہو جاتے ہیں۔ درد کی لہریں کانوں تک جاتی ہیں۔ کوئی چیز نگلنے اور کھانے میں دقت ہوتی ہے۔ سانس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور زبان گندی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ کوا بھی ورم آلود ہو جاتا ہے۔ نچلے جڑے کے نیچے ہاتھ لگانے سے بڑھے ہوئے غدود محسوس کئے جاسکتے ہیں۔ اگر بروقت صحیح طور پر علاج نہ کیا جائے تو گلے میں پیپ بھی بننا شروع ہو سکتی ہے۔ بعض بچوں کے گلے کے غدود وقفے وقفے سے متورم ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کے علاج پر خصوصی توجہ دینا چاہئے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ اجتماع خون کی وجہ سے گلا سرخ گرم اور سوجا ہوا ہو اور اس میں جلن ہو۔  
 بیلاڈونا 30' تین گھنٹے بعد  
 ☆ گلے میں جلن اور خشکی۔ نہ بچنے والی پیاس۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ذرا ذرا سا پانی پئے۔

آرسنک الیم 30' تین گھنٹے بعد  
 ☆ گلے میں ارغوانی رنگ کی سوزش۔ گلے کے گرد کپڑے کی تنگی یا کپڑا لگنا تک برداشت نہ کر سکے۔

لیکے سس 30' چار گھنٹے بعد  
 ☆ منہ میں بہت زیادہ تھوک کے ساتھ گلے کی سوجن۔ درد کے بغیر گلے میں پیپ بننا شروع ہو جائے۔

مرکیورس سال 30' تین گھنٹے بعد



☆ خشک سرد ہوا لگ جانے کی وجہ سے گلے میں سوزش ہو جائے۔ اچانک تکلیف کا آغاز ہو۔ ڈر اور فکر اور بے چینی بھی ہو۔

اکونائٹ 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ گلے میں پیپ بننا شروع ہو جائے۔ گولی لگنے کے سے اور چھین والے درد ہوں۔ مریض ٹھنڈ اور چھونے سے حساس ہو۔

ہیپر سلف 30 تین گھنٹے بعد

☆ تیز قسم کا درد۔ خالی منہ ویسے ہی نگتے ہوئے تکلیف بڑھے۔ صرف رقیق یا پتلی چیزیں نگل سکے۔ گلے کے غدود سوجے ہوئے ہوں۔

برائنا کارب 200 یا 1M 10 منٹ

بعد تین مرتبہ

غرارے کرنے کے لئے فاسٹولا کا Q کے آٹھ دس قطرے آدھا گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

## گلے کے غدود کا ورم

### Tonsillitis

گلے کے غدودوں کا ورم زیادہ تر بچوں کو ہوتا ہے۔ گلے میں ورم ہو جاتی ہے اور درد ہوتا ہے۔ سردی کے ساتھ تیز بخار ہوتا ہے۔ گلے کے غدود سرخ ہو جاتے ہیں۔ ان کا حجم بڑھ جاتا ہے۔ باہر کی جانب نچلے جڑے کے نیچے ہاتھ لگا کر دیکھنے سے بڑھے ہوئے غدود کا پتہ چل جاتا ہے۔ مریض کو کوئی چیز نگتے ہوئے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اعضاء اور کمر میں درد ہوتا ہے۔ عام طور پر چار پانچ دن تک شدید تکلیف کے بعد سوجن ختم ہونے لگتی ہے۔ آرام نہ آنے کی صورت میں پیپ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے بروقت مناسب علاج اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

معاون دوا۔

ہیپر سلف 1M پندرہویں روز، تین مرتبہ



☆ کسی چیز کا ٹکنا مشکل ہو۔ مریض اپنی عمر سے زیادہ کا لگے۔

زکم فاس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ گلے کے غدود کے درم کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف۔

لیک کینینم 200 '10 منٹ بعد 'تین

مرتبہ

☆ دائیں جانب سے شکایت شروع ہو۔ بہت زیادہ درد ہو۔

لائیکو پوڈیم 200 یا 1M '10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ تیز بخار ہو۔ غدود سرخ اور بڑھے ہوئے۔ ہوا لگ جانے کے بعد تپکن والا درد جو کانوں

کی طرف پھیلے۔

بیلادونا 30 'تین گھنٹے بعد

☆ ٹونسلز کا ورم جو گرمی سے بڑھے اور ٹھنڈ سے افاتہ ہو۔ پیاس ندارد غدودوں میں چبھنے

والا درد ہو۔

ایس ملفیکا 200 '10 منٹ بعد 'تین

مرتبہ

☆ گرمی سے اور گرم چیزیں پینے سے آرام ملے اور ٹھنڈی چیزوں سے تکلیف بڑھے۔ جلن

اور بے چینی ہو۔

آرسنک الیم 30 'چار گھنٹے بعد

☆ خالی گلے ٹکنا یا تھوک ٹکنا مشکل ہو۔ تمباکو نوشی سے تکلیف بڑھے۔

اگنسیا 200 یا 1M '10 منٹ بعد 'تین

مرتبہ

☆ غدود سوجے ہوئے اور سوزش ہو۔ ذرا سی بھی ہوا لگ جانے سے تکلیف بڑھ جائے۔

برائنکارب 200 یا 1M '10 منٹ

بعد 'تین مرتبہ

☆ مزمن مرض کے لئے۔ غدودوں میں زخم ہو گئے ہوں۔ مریض گرمی تک میں گرم کپڑے

پننے اور اوڑھے۔

سورینم 200 یا 1M '10 منٹ بعد 'تین

مرتبہ

☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والا مریض۔ غدد بڑھ جائیں۔ ان میں درد ہو اور پکٹنے کا رجحان رکھے ہوں یعنی اکثر اوقات پک جاتے ہوں۔

سلیسیا 200 یا 1M 10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ سانس کے ساتھ بدبو آتی ہو۔ غدد سرخ ہو جائیں۔ چھپنے والا درد ہو۔ رات کے وقت تکلیف زیادہ ہو جائے۔

مرکیورس سال 30 یا 200 چار گھنٹے

بعد

☆ کان کے پاس کے غدد کی اکڑاہٹ کی پرانی تکلیف ہو۔ کھانسی ہو۔ رات کے 3 سے 4 بجے کے دوران تکلیف زیادہ بڑھ جائے۔

کالی کارب 200 10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والے مریض۔ ہر قسم کی ٹھنڈ سے بہت زیادہ ذکی الحسی۔ غدد بڑھ جائیں۔ غدد کے پکٹنے کا مرحلہ۔ ٹپکن والا درد۔

ہیپر سلف 30 یا 200 چار گھنٹے بعد،

تین مرتبہ

☆ کوئی چیز نگھنا مشکل ہو۔ خشک کھانسی ہو۔

سپا نیچیا 30 چار گھنٹے بعد

☆ غدد سرخ ہوں اور ان پر سفید دھبے پڑے ہوں۔ درد ہو۔

فائولا کا 30 چار گھنٹے بعد

☆ غددوں کی تکلیف کی شکایت بائیں جانب سے شروع ہو۔ گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ سر کے اور کھٹے کھانوں سے بھی تکلیف بڑھے۔ ٹھنڈ اور ٹھنڈی چیزوں سے افادہ ہو۔

لیکے س 30 یا 200 چار گھنٹے بعد،

تین مرتبہ

☆ صرف رقیق یا پتلی چیزیں نگل سکے۔ ٹھوس یا سخت کھانے گلے میں پھنس جائیں۔

پٹسیا 30 چار گھنٹے بعد

☆ گیسوی یا چھالے دار ٹائسلز۔ سٹریپٹوکوکس جرثومے کی وجہ سے سوزش۔ نگلتے ہوئے درد ہو جو کہ کانوں کی طرف بڑھے۔

ایبلنٹھس 30 چار گھنٹے بعد

# آواز یا گلا بیٹھنا

## Hoarsness

(See laryngitis also)

منبرہ یعنی لیرنگ میں ہلکا درد ہوتا ہے۔ حلق خشک ہو جاتا ہے اور خشک کھانسی ہوتی ہے۔ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ حلق میں خراش کی وجہ سے مریض بار بار کھنکھارتا ہے۔ شروع میں تھوڑا تھوڑا بلغم نکلتا ہے۔ مرض بڑھ جانے کی صورت میں بلغم میں خون آنے لگتا ہے اور تعفن پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھنکی نفس محسوس ہوتی ہے۔ حلق کی جھلی محسوس ہو جاتی ہے۔ بخار بھی ہو جاتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ گویوں کا گلا یا آواز بیٹھنا۔ جیسے ہی وہ گانا شروع کرنے لگیں۔  
سینیم 30 یا 200 '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ اچانک ہوا لگ جانے سے آواز بیٹھ جائے۔  
پوریکس 1x یا 30 '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ خشک اور لٹھ لگ جانے سے گلا بیٹھ جائے۔  
اکوناٹ 30 یا 200 'دو گھنٹے بعد

☆ اچانک شدید طور پر آواز بیٹھ جائے اور گلے میں چھلین کا احساس ہو۔  
ہیلاڈونا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ گلے میں جلن اور درد کے ساتھ آواز بیٹھنا۔ کسی ایک مقام پر جلن محسوس ہو۔  
سہاڈلا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ فاقی اثرات کی وجہ سے آواز بیٹھنا۔ گلے کے گرد کپڑا تک چھونا برداشت نہ کر سکے۔  
لکے س 30 'چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ پیشہ ور گویوں کا گلا بیٹھنا۔ مزمن ورم زرخہ۔  
ار جشم نائٹرکیم 30 یا 200 'چار گھنٹے

بعد



☆ ہوا لگ جانے کی وجہ سے تے اور سخت بھوک کے ساتھ آواز بیٹھنا۔  
 سائنا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد  
 ☆ آلہء صوت کے فالج کی وجہ سے آواز بیٹھ جانا۔

اوکے لک ابسڈ 6 یا 30 'چار گھنٹے بعد  
 ☆ ٹھنڈے بخ مشروبات پینے کی خواہش۔ کثیر یسدار اور جیجھہ پینے کے ساتھ ہوا لگ جانے کی وجہ سے آواز بیٹھنا۔ شام کے وقت تکلیف بڑھ جائے۔

فاسفورس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد  
 تین مرتبہ  
 ☆ بہت زیادہ تھوک بنے۔ گلے میں جلن اور گرم بخارات سے۔ مکمل طور پر آواز کا جاتے رہنا۔

مرکیورس سال 30 'چار گھنٹے بعد  
 ☆ مسلسل بولتے رہنے سے جیسے مقرر، سیاستدان یا گاتے والے جو آواز کا لگا تار استعمال کریں۔

آرنیکا 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد  
 ☆ لگا تار دھسکا۔ کھانتے ہوئے غیر ارادی طور پر پیشاب نکل جائے۔ نزلے زکام کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے۔

کاشی کم 30 'چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ  
 ☆ گلا بیٹھے لیکن بولنے سے بہتر ہو۔

روہس ٹاکس 30 'چار گھنٹے بعد  
 ☆ اکثر اوقات گلا خراب اور آواز بیٹھ جائے۔

وانتھیا 6 یا 30 'چار گھنٹے بعد  
 ☆ بخار کی سی کیفیت۔ طبیعت ست۔ ماہواری کے ایام کے دوران گلا بیٹھنا۔

جیلی میم 30 'چار گھنٹے بعد  
 ☆ مسلسل گلا صاف کرے۔ گلے کی سوزش کے ساتھ آواز بیٹھ جائے۔ لمبائیاں کھانے سے تکلیف پڑے۔

سپانچیا 30 'چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ  
 ☆ گرمی لگ جانے کی وجہ سے آواز بیٹھ جاتا۔

انٹی مونیم کروڈم 30 'چار گھنٹے بعد



☆ سانس کے ساتھ دھواں اندر چلا جائے۔ سرٹیا کی وجہ سے۔ جذباتی بد نظمی یا ہیجان کی وجہ سے۔

اکنیسیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ سورا کے مریضوں کے لئے معاون دوا۔ غیر معمولی حساس اور ٹھنڈے لگنے کا میلان رکھنے والے مریض

سورینیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ لگاتار متلی۔ زبان صاف۔ آلاء صوت کی سوزش یا ٹھنڈ کی وجہ سے آواز بیٹھنا۔

الپی کاک 30 چار گھنٹے بعد

☆ مقررین کی آواز بیٹھنا۔ مسلسل دھکا۔ گانے یا بولنے یا ہوا لگنے سے تکلیف بڑھ جائے۔

آرم ٹرف 30 چار گھنٹے بعد

☆ مکمل طور پر آواز جاتی رہے۔ ڈھیلی کھانسی کے ساتھ گلا خشک اور پیاس نداشت۔ کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں بہتر ہو۔

ہلساٹیل 30 چار گھنٹے بعد

☆ جب ار جشم تا شریکیم غیر موثر ہو۔

مینگنم اسیکیم (Manganum Acet)

30 چار گھنٹے بعد

☆ جب منتخب ادویات غیر موثر ہو جائیں۔ مریض رات کے وقت بے آرام ہو۔

سفلینیم 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

بایو کیمک کی کلکیریا فاس 6x فیرم فاس 6x اور کالی میور 6x

چار گھنٹے بعد دینا بہت فائدہ مند ہے۔



# خراٹے بھرنا

## Snoring

تالو کی جھرجھراہٹ سے پیدا ہونے والی بھدی گڑگڑاہٹ والی سانس کے شور کو خراٹے کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات نیند کے دوران نرخرے یا جنبرے کی جھلی سے بھی خراٹے کی آوازیں نکلتی ہیں۔ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ موٹے لوگ جنہیں سانس لیتے ہوئے دقت ہوتی ہے وہ نیند کے دوران سانس لیتے ہوئے اونچی آوازیں نکالتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ مزمن درم گلے کے لئے۔ ناک سوچی ہوئی اور سرخ۔ تیزابی، پانی ناک سے جاری ہو۔ خون ملی بدبودار رطوبت نکلے۔ اور مریض خراٹے لے۔

ہیپوزینیم (Hippozaeninum) 30  
چار گھنٹے بعد

☆ درد نہ کے دوران درم گلا۔ اینٹھن اور تشنج کے بعد گلا سوج جائے۔ زودرنج مریض۔ کھلی ہوا میں بہتر محسوس کرے۔

ہلداٹیل 30، چار گھنٹے بعد

☆ ناک میں گومڑ کی وجہ سے۔ درم ناک کے مزمن کیسوں کے لئے مریض لاغر ہو اور خراٹے لے۔

لیمنامائن Q یا 6، چار گھنٹے بعد

☆ جب مریض نیم بے ہوش یا سکتے کے عالم میں ہو تو خراٹے بھرے۔ منہ کے ذریعے سانس لے۔ پاخانہ سخت اور قبض ہو۔

اوپیم 200، تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ معاون دوا۔

میس لینم 200 یا 1M پندرہویں روز،  
تین مرتبہ

# خرخراہٹ

## Wheezing

(See Asthma and Bronchitis • also)

علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ معاون دوا۔ مزمن کیسوں کے لئے۔

بیس لینم 200 یا 1M پندرہویں روز  
تین مرتبہ

☆ خرخراہٹ ہوتی رہے جب تک کہ کوئی رطوبت یا تھوک نہ نکل آئے۔

کاربوا لیمس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ خزانے۔ گلے میں خرخراہٹ۔

برومیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ خزانے۔ سینے میں خرخراہٹ کے ساتھ کھانسی۔ سینے میں سختی تناؤ کھپاؤ۔ کھانے پینے کے بعد تکلیف بڑھ جائے۔

☆ تنگی، تنفس۔ چھوٹے چھوٹے سانس لینے میں بلفم کی وجہ سے خرخراہٹ۔ زبان پر میل جمی ہو۔

انٹی مونیم ٹارٹ 30 یا 200 ایک  
خوراک

☆ خزانے، خرخراہٹ، سینے میں سخت اور جے ہوئے کثیر مادے کو اکھاڑنا مشکل ہو۔ خاص طور پر بوڑھے لوگوں کے لئے۔

سینگا Q یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ سبزی مائل، تیز بو والے، میٹھے تھوک کے ساتھ خرخراہٹ۔

سینیم منیلیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ نہ بچنے والی شدید پیاس اور بے چینی۔ پیپ کی مانند بکثیف تھوک کے ساتھ خرخراہٹ۔

آرسنک البم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ کثیر مقدار میں کثیف تھوک کے ساتھ خراہٹ۔ شام کے وقت کھانسی زیادہ ہو جائے۔  
سنے میں درد کے ساتھ تے کرنے کی کوشش کرے۔

کریازوٹ 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد  
☆ سنے میں شدید خراہٹ۔ ایسا معلوم ہو کہ بے بیہوشی بلغم سے بھر گئے ہیں۔ خاص طور پر  
بچوں کی بلغمی نالیوں کے نزلے زکام کے لئے۔

لائیکو پوڈیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ  
☆ حلق میں بلغم یا رطوبت جمع ہو جائے۔ سٹی سی بجے۔ متلی ہو۔ اور سنے میں خراہٹ  
ہو۔

کالی بائی کروم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد  
☆ اگرچہ بلغم گاڑھا نہ ہو اس کے باوجود باہر لکنا مشکل ہو۔ شام کے وقت اور لیٹنے کے بعد  
کھانسی زیادہ ہو جائے۔

سپیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ  
☆ سنے میں بلغم بھرا ہو۔ خراہٹ کے ساتھ کھانسی ہو۔ صاف زبان کے ساتھ متلی اور  
تے ہو۔

اپی کاک 30 'چار گھنٹے بعد  
☆ چھینکوں کے ساتھ سانس کی ٹھن۔ لگاتار تھکا دینے والی کھانسی۔ خراہٹ کے ساتھ۔  
ہیسیا (Justicea) Q یا 30 'چار  
گھنٹے بعد'

☆ پہلی نیند کے بعد خشنی کھانسی۔ لیٹنے کے بعد خراہٹ بڑھ جائے۔  
ارلیا (Aralla r) 30 'چار گھنٹے بعد  
☆ بہت کالی مقدار میں رطوبت۔ گرمی سے ٹھنڈ میں جانے پر تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔  
ڈکامارا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ  
☆ سانس لینے میں دقت ہو۔ خراہٹ والی اور ہوکنے والی کھانسی۔ سر کی جانب سے گلے  
کی طرف اور سانس کی نالیوں میں ٹھنڈ بڑھتی محسوس ہو۔

آیوڈیم 30 'چار گھنٹے بعد'



☆ خرراہٹ۔ کھانسی کے ساتھ فرج ڈھیلے پڑ جائیں۔ گرمائش سے بہتر ہو۔ ٹھنڈ سے تکلیف بڑھے اور صبح 3 تا 4 بجے کے دوران۔

کالی کارب 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ سینے کی نالیوں میں حاد تکلیف۔ سینے میں دباؤ۔ کثیر سفیدی مائل تھوک اور رطوبت۔

گرینڈ یلیا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ گلے میں ریشہ جمع ہو جائے۔ گلے میں سرسراہٹ سی ہو۔

کاشی کم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ ہلکی سی کھانسی۔ ریشہ جمع ہو جائے۔ سانس لینے میں دقت ہو۔ ٹھنڈ اور ٹھنڈی ہوا میں تکلیف بڑھ جائے۔

بیبیر سلف 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ مریض گرمی کے موسم میں بھی گرم کپڑے پہنے۔ ششی کھانسی خرراہٹ۔ معاون دوا۔

سورینم 200 یا 1M 10 منٹ بعد 'تین مرتبہ'

مرتبہ

☆ سینے میں دباؤ اور خراش۔ حلق میں نزلہ گرے۔ صبح کے وقت تکلیف بڑھ جائے۔

سلفر 30 یا 200 '4 گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ گلے میں سرسراہٹ۔ چمکدار سبزی مائل کثیر تھوک۔ مرطوب موسم میں تکلیف زیادہ ہو۔

نیرم سلف 30 یا 200 '4 گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x اور کالی میور 6x بھی مفید ادویات

ہیں۔



# گلے اور ناک کی گانٹھیں اور غدود

## Adenoids

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ مریض ٹھنڈ سے متاثر ہونے والا یا زود حس ہو۔ گلے میں گرمی اور خشکی کا احساس۔  
جلدی جلدی پانی پئے۔ کھانے کے بعد بہتر محسوس کرے۔

سٹس کین (Cistus can) 30 چار  
گھنٹے بعد

☆ ایسے بچے جو جلدی جلدی گلے کے غدودوں کے ورم (Tonsillitis) میں مبتلا ہو  
جائیں۔

برائنا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار، چھ  
مرتبہ

☆ مریض میں ٹھنڈ کا رجحان پایا جائے۔ یعنی سردی سے جلد متاثر ہو جائے۔ ناک بند ہو  
جائے۔ حلق کے غدود متورم ہو جاتے ہوں۔ نتھنے بند ہو جانے کی وجہ سے منہ سے سانس  
لینا پڑے۔

ایگرافس نٹ (Agraphis nut) 6 یا  
30 ہر 4 گھنٹے بعد

☆ ناک سے گاڑھی، یسدار، سبزی مائل زرد رطوبت خارج ہو اور بدبودار ہو۔ ناک بند ہو  
جائے اور پانی نہ سے۔

کال ہائی کروم 30 یا 200 ہر 4 گھنٹے  
بعد

☆ موٹے اور پلپے بچے جن کو موسم کی تبدیلی پر سردی لگ جائے۔ وہ نزلے زکام میں مبتلا  
ہو جائیں اور ٹھنڈ سے مرض میں شدت پیدا ہو۔

کلیریا کارب 200 یا 1M پندرہویں  
دن، تین مرتبہ

☆ سبزی مائل پیپ دار رطوبت خارج ہو۔ مریض ٹھنڈ سے ذکی الحس ہو۔  
کلیریا آیوڈیم 30 یا 200 ہر 4 گھنٹے  
بعد

☆ بے رنگ رطوبت کے ساتھ ساتھ ناک کی ہڈی قدرتی طور پر بڑھ جائے۔ رطوبت بے سدا  
اور پہلی سی رنگت کی۔ سردی اور زکام۔ ناک بند۔

ہائی ڈراس ٹس C (Hydrastis C)

30' ہر چار گھنٹے بعد

☆ علاج شروع کرنے کے ساتھ دوسری متعلقہ ادویات کے علاوہ بہتر نتائج حاصل کرنے کے  
لئے۔

بہسی لینم IM یا 10M 'پندرہویں روز'

تین مرتبہ

علامات کے مطابق متعلقہ دوا کے ساتھ ساتھ بائو کیمک کی

کلکیریا فلور 12x اور کلکیریا فاس 6x دینا بھی بہت مفید ہے۔



# زبان کی تکلیفات

## Affections of Tongue

زبان انسانی جسم کا ایک نہایت حساس عضو ہے۔ بہت سے امراض کی تشخیص زبان کی حالت، رنگت اور ذائقے وغیرہ سے بھی کی جاتی ہے۔ مختلف امراض میں زبان کی ہیئت بدل جاتی ہے۔ مثلاً "زبان پر سفیدی، میل، خشکی اور کانٹے سے جھے ہونا۔ زبان کا سفید، نیلا، پیلا اور سرخی مائل رنگ ہونا وغیرہ۔ زبان کی علامات سے مرض کی تشخیص میں بڑی مدد ملتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ ریاحی شکایات ہوں۔ زبان پر موٹی سفید تہہ جھی ہو۔  
انٹیم کروڈم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ زبان خشک، زرد اور چمبھی۔  
ایسٹاس 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ زبان پر بال کا احساس۔  
سلیسیا 200 یا 1M 10 منٹ بعد، تین مرتبہ
- ☆ زبان ٹھنڈی اور نیلگوں۔  
کیمفورا Q یا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ زبان سیاہی مائل۔ ٹائی فائڈ میں نیلی، پھٹی ہوئی۔ گھونٹ گھونٹ پانی پینے کی خواہش یا پیاس۔  
آرسنک الہم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ ہیکینی اور ہموار جیسے وارنش مل دی گئی ہو۔  
پائورو جینم 200 یا 1M 10 منٹ بعد، تین مرتبہ
- ☆ سفیدی جھی ہوئی۔ دانتوں کے نشان پڑے ہوں۔ دست آئیں۔  
پوڈو فائلم 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ زبان صاف ہو لیکن مٹی اور تے ہو۔  
الہی کاک 30 چار گھنٹے بعد



- ☆ زبان خشک۔ لمبے وقفے کے بعد زیادہ مقدار میں پانی پینے کی خواہش۔  
برائی اونیا 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد
- ☆ زبان خشک، سخت اور چمڑے کی طرح۔  
پیشیا Q یا 30 ' چار گھنٹے بعد
- ☆ زبان کی ناک سرخ ہو۔  
رہس ٹاکس 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد
- ☆ میلی زبان۔ گندی اور میلی۔ زرد۔ دانتوں کے نشان۔ قبض۔  
ہائیڈرائٹس کین Q یا 30 ' چار گھنٹے بعد
- ☆ خشک اور اوپر کے تالو سے گلی ہوئی زبان۔  
ٹکس مو۔ کاٹا 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد
- ☆ زبان خشک لیکن پیاس ندارد۔ کھلی ہوا میں اچھا محسوس کرے۔  
پلساٹیل 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد
- ☆ زبان منہ سے باہر نکلی پڑے۔  
سٹرامونیم 200 یا 1M ' 10 منٹ بعد  
تین مرتبہ
- ☆ نیلے پن کے ساتھ سیاہ زبان۔ بھٹی ہوئی۔  
بفوران 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد
- ☆ موٹی اور بھاری زبان۔ بھگی ہوئی اور پیاس۔ دانتوں کے نشان۔  
مرکیورس سال 30 یا 200 ' چار گھنٹے  
بعد
- ☆ سانپ کی طرح زبان باہر کو نکلی ہوئی۔  
کوپریم میٹلیکم 30 یا 200 ' 10 منٹ  
بعد، تین مرتبہ
- ☆ زبان خشک۔ سیاہی مائل۔ زبان باہر نکالنا مشکل ہو۔ مریض سونے کے بعد تکلیف زیادہ  
محسوس کرے۔  
لیکے سس 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد
- ☆ زبان کے درمیان سرخ دھاری ہو۔  
ورائزم ورائٹڈ 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد

سرخی، سفید، خشک اور پتلی زبان کے لئے بائو سیمک کی کالی  
میو 6x چار گھنٹے بعد اور خشک، سوچی ہوئی، کسری سرخ۔  
دانتوں کے نشان والی زبان کے لئے فیروم خاصہ 6x بھی مفید  
ہیں۔

## منہ کی خشکی

### Dryness of Mouth

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ بغیر پیاس کے منہ خشک۔ خشکی کی وجہ سے زبان تالو سے لگ جائے۔  
نکس موسکاٹا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ زبان ایسی خشک گویا جل گئی ہو۔  
میڈورنیم 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ بغیر پیاس کے منہ خشک۔  
ہلسائیلا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ منہ انتہائی درجہ خشک، منہ کی رطوبتی جھلیاں ٹاک اور گلا تک خشک ہو۔  
وانتھیا (Wyethia) 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ جٹے ہوئے چمڑے کی طرح منہ خشک۔  
بائو سیامس 30 یا 200  
(Hyoscyamus) چار گھنٹے بعد
- ☆ شدید پیاس وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا گھونٹ گھونٹ پانی پئے۔ طبیعت میں بے چینی۔  
آرسنک البم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ ذیابیطس کے مریض کا منہ خشک ہو۔  
ایسٹاس 6 یا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ لمبے وقفے کے بعد بہت زیادہ پانی پینے کی خواہش۔ پاخانہ قبض کے ساتھ۔  
برائی اونیا البم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ زبان اور منہ خشک۔  
کالی بالی کروم 30 چار گھنٹے بعد

# منہ کے چھالے

## Aphthae

(See mouth ulcers also)

بعض اوقات منہ کی بلغمی تھلیوں میں سفید آبلے اور چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ عام طور پر چھوٹے زہر یا ٹنکس کی وجہ سے ہوتے ہیں یا بعض دفعہ جراثیم کش ادویات Anti Biotics کے مسلسل استعمال کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ منہ کے چھالوں کے علاج کے لئے درج ذیل ادویات علامات کے مطابق بہت مفید و موثر ہیں۔

### علامات 'دوا اور طاقت' دورانیہ

☆ سوچی یا درم آلود زبان کے ساتھ منہ کے چھالے جس میں کثرت سے تھوک بنے۔  
سوڑھوں سے خون جاری ہو۔ پائو ریا ہو۔

سلفر ایسڈ 30: چار گھنٹے بعد

☆ منہ میں سفید آبلے جن میں درد ہو اور آسانی سے خون جاری ہو جائے۔

پوریکس 30: تین گھنٹے بعد

☆ منہ کے چھالے۔ سوزش دہن۔ زبان پر زردی مائل مادہ۔ دانٹوں پر چیچھاٹ والی  
رطوبت کافی مقدار میں جمی ہوئی۔ قبض بھی ہو۔

ہائیڈراستس کین (Hydrastis Can)

30: چار گھنٹے بعد

☆ آبلے جن میں درد ہو۔ منہ سے بدبو آئے۔ بہت زیادہ تھوک بنے۔ بہت زیادہ پیاس۔  
منہ میں رطوبت سی جمع رہے۔

مرکبوس سال 30: تین گھنٹے بعد

بہت زیادہ درد والے آبلے۔ تھوک اور منہ کی رطوبت بدبو والی اور خراش دار۔

ٹائٹریک ایسڈ 30: چار گھنٹے بعد

☆ بہت سے آبلے کچے کچے سے جن میں جلن ہو۔ سوڑھے سوچے ہوئے۔ پلپے سوڑھے۔  
آسانی سے خون جاری ہو جائے۔ زبان درم آلود۔ سونے کے بعد مریض زیادہ تکلیف  
محسوس کرے

لیکے س 30: چار گھنٹے بعد



# ذائقہ

(Taste)

اللہ تعالیٰ نے انسان کی راحت و سکون کے لئے جسم کے مختلف اعضاء میں کچھ حیات اور لذتوں کی فراہمی کا اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح انسان زبان سے بولنے کے علاوہ ذائقہ حاصل کر کے لذت پاتا ہے۔ صحت مند آدمی مختلف اشیاء خورد و نوش کھا پی کر راحت و سکون حاصل کرتا ہے لیکن کسی بیماری کے سبب بعض دفعہ منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ چیزیں کڑوی کسبلی اور بد ذائقہ لگنے لگتی ہیں۔ بعض دفعہ ذائقہ نمکین اور تانبے کی مانند ہو جاتا ہے۔ جس کے نتیجے میں کچھ کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا اور اگر کھانے پینے کی کوشش کرے تو مٹلی، تے اور ابکائی آجاتی ہے۔

## علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

- ☆ چینی تک کڑوی لگے۔
- سیکونیریا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ ہرچیز کڑوی لگے۔ خاص طور پر تپ دق کے مریضوں کو۔
- شینم میلکیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ پانی کڑوا لگے۔
- آرسک البم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ لمبائیاں تک بھی کڑوی لگیں۔
- ریو میکس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ پانی کے سوا ہرچیز کڑوی لگے۔
- اکوانٹ 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ اگرچہ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو لیکن کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ ٹھیک ہو۔
- نکس دامیکا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ آلو بخارے وغیرہ کا ذائقہ کڑوا لگے۔
- آیوڈیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد



# سانس کی بدبو

## Bad Breath

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ بدبودار اخراج اور بدبودار سانس۔
- ☆ کاربالک ایسڈ 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ تانبے کے سے ذائقے کے ساتھ اور بہت زیادہ تھوک کے ساتھ بدبو۔
- ☆ مرکبوس سال 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ متعلقہ دوا کے ساتھ ساتھ۔
- ☆ سورنیم 200، ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ بائیو کیمک دوا۔
- ☆ کالی فاس 6x، چار گھنٹے بعد

## تھوک

### (Salivation)

اس مرض میں بہت کثرت سے تھوک آتا ہے۔ بعض دفعہ اس قدر تھوک آتا ہے کہ مریض کے لئے کھانا پینا اور بولنا مشکل ہو جاتا ہے اور مریض کمزور ہوتا جاتا ہے۔ یہ مرض معدے کی خرابی، زبان کی سوزش، منہ کے زخم، گوشت خورہ، زبان یا منہ کے پھل جانے، آدمی سر کے درد اور حلق کے امراض کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ مرض ایام حمل میں بھی ہو جاتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ تاردار اور کثیر تھوک، بات کرتے ہوئے منہ سے رال نکک جائے۔
- ☆ آئرس ورسیکار 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ تیزابی یا خراشدار پھینکے والا تھوک بہت زیادہ مقدار میں۔
- ☆ آرام نرافلیم 30، چار گھنٹے بعد

☆ روئی کی طرح کا جھاگ دار پانی کی طرح پتلا میٹھا سا تھوک۔ خراب ذائقہ کا۔ صبح کے وقت زیادہ۔ پیاس ندارد۔

ہلکا سیلا 30، چار گھنٹے بعد

☆ صابن کی طرح کا جھاگ دار تھوک۔

برائی اونیا 30، چار گھنٹے بعد

☆ منہ میں تھوک جمع ہوتے رہنے کی وجہ سے مسلسل تھوکتا رہے۔

امونیا کارب 30، چار گھنٹے بعد

☆ کثیر بدبودار اور خون ملا تھوک۔

ٹائٹریک ایسڈ 30، چار گھنٹے بعد

☆ کثیر مقدار میں تھوک آئے۔ مسلسل نکلتا رہے۔ زبان صاف ہو۔

اپی کاک 30، چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی نیڑم میور 12x چار گھنٹے بعد دینا بھی فائدہ مند

ہے۔

دیگر اہم ادویات : سینیٹ منبلیکم، کیمومیل، ٹکس  
وامیکا، سلیسیا، برومیم، مرک سال، الیومنا، کریازوٹ، اگنیسیا،  
گریفائٹس، جبراندی، رٹس ٹاکس، ہیپرو سلف، سلفر، لیک کین،  
وغیرہ۔



# ہکھلانا/تتلاانا

## Stammering

تتلاانے میں لفظ کو زبان سے فوراً ادا کیا جا سکتا ہے البتہ اس کا تلفظ درست نہیں ہوتا جبکہ ہکھلانے میں لفظوں کی ادائیگی میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ ہکھلاہٹ میں عضلات پر پورا قابو نہیں ہوتا ہے تتلاہٹ میں عضلات تکلم پر اختیار تو ہوتا ہے لیکن تلفظ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لکنت کی اصل وجہ موروثی ہوتی ہے لیکن خوف بیماری، اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ دماغی کمزوری سے بھی بچہ ہکھلانے لگتا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنے اور خود اعتمادی سے اس تکلیف کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ بچے سے تتلا کر بات کرنے سے ان کی عادت بن جاتی ہے لہذا بچپن میں اس عمل سے گریز کرنا چاہئے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ ہکھلانے کی سب سے اعلیٰ دوا۔ اکثر اوقات الفاظ کا تلفظ غلط کرے اور حروف اور الفاظ ادا ہونے سے رہ جائیں ہم آہنگ الفاظ میں ہکھلاہٹ ہو تتلاہٹ۔ زبان اور ہونٹوں کی اعصابی حرکت ماؤف ہو۔

کاشی کم 30، چار گھنٹے بعد

☆ تیز اور ہکھلاتی ہوئی گفتگو۔

مرک سال 30، چار گھنٹے بعد

☆ بیماری پن والی، کانپتی ہوئی اور فالج زدہ سی گفتگو۔ زبان کی کمزوری۔ ہکھلاتی ہوئی یا تتلاہٹ والی گفتگو۔

بٹلا ڈوتا 30، چار گھنٹے بعد

☆ ہکھلاہٹ۔ مشکل سے گفتگو کرے۔ ناقابل فہم۔

سٹرامونیم 200، چھ گھنٹے بعد

☆ ہکھلاہٹ۔ مریض کی بات جب کوئی دوسرا نہ سمجھے تو غصے میں آ جائے۔

بنفورانہ 30، چھ گھنٹے بعد

☆ کسی لفظ کے پہلے حروف کو کئی مرتبہ ادا کرے اور اس کے بعد صاف طور سے بولے۔

سپائی جیلیا 30، چار گھنٹے بعد

☆ بعض الفاظ کا تلفظ کرنا مشکل ہو یا کچھ مخصوص الفاظ کا صحیح تلفظ نہ کر سکے۔ خاص طور پر دوسرے اور تیسرے حرف کا تلفظ کرنا مشکل ہو۔

لیکے س 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ لکنت۔ کمزور آواز۔

سیکالے کار 30 چار گھنٹے بعد





## دانت

### Affections of Teeth

(See Toothache and Pyorrhoea also)

دانتوں میں کھوڑیں، مسوڑھوں کی سوزش، مسوڑھوں سے پیپ آنا، مسوڑھوں کے ناسور، مسوڑھوں سے خون آنا، منہ سے بدبو آنا، دانتوں پر میل جھنا اور درد ہونا دانتوں کے عام امراض ہیں۔ بعض دفعہ ماؤف دانت کے ارد گرد کے مسوڑھے متورم ہو جاتے ہیں اور چہرے اور گالوں تک ورم آجاتی ہے۔ دانتوں پر میل جم جانے سے جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ یہ میل مسوڑھوں کو متاثر کرتی ہے اور پائیوریا کا مرض ہو جاتا ہے۔ دانتوں سے پیپ اور خون آنے لگتا ہے۔ غذا کھاتے ہوئے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ دانتوں کی روزانہ کسی معیاری پیسٹ یا منجن سے صفائی کرنا چاہئے۔ بہتر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دانت ضرور صاف کئے جائیں تاکہ دن بھر کے کھانے پینے سے پیدا ہونے والی کیوبینیز صاف ہو جائیں۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

- ☆ دانت چبائے یا رگڑے۔  
ہلیم میٹلیکم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ دانتوں پر زردی یا میل جما ہو۔  
کلیریا ریٹالس 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ دانت آہستہ آہستہ ٹپکیں۔  
کلیریا فاس 6x یا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ عقل ڈاڑھ میں کاٹنے والا درد ہو۔  
شیر فحس (Cheiranthus Ch) 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ چباتے ہوئے دانت ڈھیلے محسوس ہوں۔  
ٹائٹرک ایسٹن 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ دانتوں پر سیاہ دانے سے نکل آئیں یا کالا میل ہو۔  
شیفنی سیکریا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ دانتوں کو آپس میں رگڑنے کی نہ رکھنے والی خواہش۔

فاسٹولا کا 30 یا 200 چار کھٹے بعد

☆ دانتوں میں لٹھک سی محسوس ہو۔

انٹیم ٹار ٹیکم 30 یا 200 چار کھٹے بعد

## دانت نکلنا

### Teething

بچوں کے دانت نکلنے کے وقت مزاج میں چڑچڑاہٹ، بھوک مر جانا، دست آنا، بخار ہونا، نیند نہ آنا اور وزن کم ہونا عام شکایات ہیں۔ اس قسم کی شکایات کے لئے ہومیوپیتھی میں کئی ادویات ہیں جن کے استعمال سے بچوں کی یہ تکالیف دور ہو جاتی ہیں اور دانت نکالنے کا مرحلہ آسانی سے نہ ہو جاتا ہے۔ ذیل میں چند مخصوص اور اہم ادویات بیان کی گئی ہیں جن کو متعلقہ علامات کے مطابق استعمال کرانے سے بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ موٹے بچے جن میں دانت نکالنے کا عمل سست ہو۔ سر پر کثرت سے پسینہ آئے اور وہ لٹھک محسوس کریں۔

کلیریا کارب 200 ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ بے چینی اور نیند نہ آنے کے ساتھ بخار۔ دانتوں کے درد کی وجہ سے بچہ چپخیں مارے۔

اکونائٹ 6 یا 30 چار کھٹے بعد

☆ کثرت سے دست آئیں۔ بچہ مسوڑھوں کو رگڑے اور کوئی سخت چیز دانتوں میں رکھ کر دبائے۔

پوڈوفالیم 30 چار کھٹے بعد

☆ دانت نکالنے کے دوران بچہ بہت سی چیزیں ناپسند کرے۔ اور پھر سو جائے۔ بخار سے بچے کا چہرہ سرخ ہو جائے۔

یلاڈونا 30 تین کھٹے بعد

☆ پانی کی طرح پتلے سبزی مائل دست۔ بچہ چڑھا ہو جائے۔ بچہ چاہے کہ اسے ہر وقت گود میں لے کر پھرا جائے۔ رات کے وقت تکلیف بڑھے۔

کیومیلا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' چھ

مرتبہ  
بائو کیمک کی کلکیر یا فاس 6x یا باپو کبی نیشن نمبر 21 'چار گھنٹے بعد دینے سے بہتر نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ اگر دانت ٹکالنے کے دوران کسی عضو کا فالج ہو جائے تو کالی فاس 6x اور مکیسیا فاس 6x تین گھنٹے بعد دینا بہت مفید ہے۔

## دانتوں کا درد

### Toothache

دانتوں میں درد کی وجہ سے سخت بے چینی اور تکلیف ہوتی ہے۔ دانت میں درد ہونے پر ساتھ کے مسوڑھے میں ورم اور سوجن ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ سوجن چہرے اور گالوں تک بھی آجاتی ہے۔ اکثر دانتوں میں سوراخ ہو جانے یا بوسیدہ ہونے کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ بد ہضمی اور عام صحت اچھی نہ ہونے کے سبب بھی دانتوں میں درد ہو جاتا ہے۔ دانت کی جڑ میں سوجن ہو جانے، دانت صاف نہ رکھنے، کبھی ٹھنڈی اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے دانتوں میں درد ہوتا ہے۔ پارہ کا بیجا استعمال اور گنٹھیا وغیرہ کی وجہ سے بھی دانتوں کی تکلیفات ہوتی ہیں۔ حاملہ خواتین کو اکثر دانت درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ دانتوں کی تکلیفات سے بچنے کے لئے معیاری منجن اور پیسٹ کا روزانہ استعمال بہت ضروری ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ گلے سڑنے یا خراب دانتوں میں سوزش کی وجہ سے۔ ٹھنڈی یا گرم چیز گلنے کی وجہ سے درد۔ رات کے وقت تکلیف زیادہ ہو۔

مرکبوس سال 30 یا 200 'چار گھنٹے

بعد

☆ پائوریہ کی وجہ سے درد ہو۔

کاروویج 30 'چار گھنٹے بعد

☆ درد کو ٹھنڈی اور گرم رقیق یا پتی چیزوں سے آرام آئے۔

مکیسیا فاس 30 'چار گھنٹے بعد

☆ دودھ کے دانت گنے سڑنے لگیں اور خراب ہو جائیں۔ دانت بہت جلد خراب ہو جائیں۔ دانتوں کے گنے سڑنے کی خرابی کی وجہ سے درد ہو۔

کریا زوٹ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ کوئی میٹھی چیز کھانے اور پینے سے دانتوں میں درد ہو۔

نیرم کارب 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ سوڑھے کاورم ہو۔ منہ خشک ہونے کے ساتھ چکن والا درد۔

بیلاڈونا 30 چار گھنٹے بعد

☆ حیاتیاتی مادوں کے ضیاع کی وجہ سے درد جبکہ عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو۔

چائنا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ دانت کا درد کان گال کی ہڈی اور کہنی کی طرف پھیلے پینہ آنے سے بہتر ہو۔

۱۔ نس چنیوپوڈی

(Aphis Chenopodi) Q یا 30

چار گھنٹے بعد

☆ دانتوں میں کھوڑ ہو۔ کھانے اور ٹھنڈا پانی پینے سے اور رات کے وقت تکلیف زیادہ ہو۔

انٹم کروڈم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ دانت اور سوڑھے بہت زیادہ حساس ہوں۔ آسانی سے خون بنے لگے۔

ہیبر سلف 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ گنے سڑنے والے دانتوں کی جڑوں میں شدید درد۔ دبانے اور چبانے سے سخت تکلیف

اور درد ہو۔ درد آنکھوں کی طرف پھیلے۔ ٹھنڈ اور ٹھنڈی چیزوں اور دبانے سے شدید ذکی الحس۔

شیننی سیکریا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ شدید درد ہو۔ ٹھنڈ اور کھلی ہوا سے بہتر ہو۔ ایک کے اوپر دوسرا دانت نکل آیا ہو۔

۱۔ لیم سیپا 30 تین گھنٹے بعد

☆ دانت بہت لمبے محسوس ہوں۔ درد دانتوں کی جانب پھیلے۔ چھوٹے سے بہت زیادہ ذکی الحس۔

پلائنگو 30 تین گھنٹے بعد

☆ پیاس نہ ہو۔ منہ میں ٹھنڈا پانی رکھنے سے اچھا محسوس ہو۔ گرمائش سے تکلیف میں

اضافہ ہو۔

ہلٹائلا 30 یا 200 دو گھنٹے بعد



☆ پانی میں کام کرنے والوں کے دانتوں میں درد کے لئے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے تکلیف بڑھے۔

فاسفورس 30 یا 200 '10 منٹ بعد'


تین مرتبہ

☆ ناقابل برداشت درد۔ درد کانوں اور چہرے کی طرف جائے۔ گرمائش اور کافی پینے سے درد بڑھے۔

کیمومیل 200 '10 منٹ بعد' تین مرتبہ

☆ دانت نکلوانے کے بعد خون کا بہنا روکنے کے لئے۔ دانتوں کا گرنا۔ فلنگ کرانے کی وجہ سے ہونے والے درد کو کم کرنے کے لئے۔

آرنیکا مونٹینا، آدھا گھنٹہ بعد' تین مرتبہ



## مسوڑھوں کی بیماریاں

(Ailments of Gums)

انسان کے جسم کے نظام انہضام میں دانت خاص اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ غذا کو خوب اچھی طرح چبا کر باریک کرتے ہیں اور لعاب دہن شامل کرتے ہیں جس سے غذا کے ہضم ہونے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ چونکہ دانت مسوڑھوں میں پیوست ہوتے ہیں اس لئے ان کی بھی اسی قدر اہمیت ہے۔ بعض دفعہ مسوڑھوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور ان سے پیپ آنے لگتی ہے۔ مسوڑھوں میں ناسور بن جاتے ہیں۔ مسوڑھے متورم ہو جاتے ہیں۔ ان تکلیفات کے علاوہ ان سے معدے اور جسم کے دوسرے امراض جنم لیتے ہیں اس لئے مسوڑھوں اور دانتوں کی صحت پر خصوصی توجہ دینی چاہئے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ مسوڑھوں میں گرمائش کے احساس کے ساتھ سوزش اور تنکھن والا درد۔  
بہلا ڈونا 30 ' چار گھنٹے بعد
- ☆ دانت بٹھرنے اور مرنے لگیں۔ مسوڑھے پھول جائیں اور پلپے سے ہو جائیں۔ خون آسانی سے نکلنے لگے۔  
کریازوٹ 30 ' چار گھنٹے بعد
- ☆ مسلسل خون بے۔ خون آسانی سے جے نہ رکے۔ مسوڑھوں میں سوزش اور ناسور۔  
فاسفورس 30 ' چار گھنٹے بعد
- ☆ مسوڑھے پیلے اور ارغوانی سے۔ خون نکلے۔ صبح کے وقت اور دہانے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔  
لکے سس 30 ' چار گھنٹے بعد
- ☆ پاپوریا۔ مسوڑھوں میں کھپاؤ محسوس ہو۔ آسانی سے خون بے۔  
کاربودیج 3x یا 6 ' چار گھنٹے بعد
- ☆ مسوڑھوں پر آبلے۔ دانت گر جائیں۔  
بیکلا لاوا 3x یا 6x ' چار گھنٹے بعد

☆ مسوڑھوں کی تکلیفات میں طوفان سے پہلے اضافہ۔ مسوڑھوں میں شدید درد۔  
روہو ڈو ڈینڈرون

(Rhododendron) 30 'چار گھنٹے

بعد

☆ مسوڑھوں میں ٹھنڈی گرم اشیاء لگیں۔ بہت زیادہ حساسیت۔ سانس کے ساتھ بدبو  
آئے۔ غیر صحت مند مسوڑھے۔ مسوڑھوں میں زخم ناسور اور سوزش۔

مرکیورس سال 30 'چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x اور کالی میور 6x کے بعد دیگر چار  
گھنٹے بعد دینا بہت مفید ہے۔

Gum paint : Glycerine 70% + Arlnca Q

+ Calendula Q + Echinacea Q 30%

## مسوڑھوں سے خون جاری ہونا

(Bleeding Gums)

اس مرض میں مسوڑھے متورم ہو جاتے ہیں۔ زبان پر میل جم جاتی ہے اور منہ سے بدبو  
آنے لگتی ہے۔ مسوڑھے سکڑ جاتے ہیں۔ دانت ہلنے لگتے ہیں۔ دانتوں سے خون آنے لگتا ہے۔  
ٹھنڈی اور گرم چیزیں لگنے لگتی ہیں۔ دانت بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات شدید  
درد ہوتا ہے۔ پیپ پڑ جاتی ہے جو کھانے کے ساتھ معدے میں پہنچ کر کئی امراض کا سبب بنتی  
ہے۔ بعض اوقات دانتوں کی جڑیں کمزور ہو کر دانت گر جاتے ہیں۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ مسوڑھوں میں کھنچاؤ۔ آسانی سے خون بہنے لگے۔ پائوریا۔  
کاربووج 3x یا 6 تین گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ مسوڑھوں میں دکھن اور سوزش۔ دانت نکلنے کے بعد خون کا اخراج۔

آرنیکا 200 یا 1M 'آدھے گھنٹے بعد

☆ مسوڑھوں سے گندے پتلے خون کا اخراج۔ مسوڑھے سوجے ہوئے۔ پھولے ہوئے یا  
سلیخ دار اور بہت زیادہ حساس کہ چھوا تک نہ جاسکے۔ آسانی سے خون بہنے لگے۔ صبح کے

وقت تکلیف بڑھ جائے۔

لیکے س 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ سوڑھے سو بجے ہوئے۔ ٹھنڈی اور گرم چیزیں لگیں اور تکلیف ہو۔ رات کے وقت تکلیف بڑھ جائے۔ غیر صحت مند سوڑھے۔ تھوک بہت زیادہ آئے۔

مرکیورس سال 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ سوڑھوں سے شدید خون جاری ہو۔ سوڑھے پھولے ہوئے اور موٹے، گرم اور کٹھی ڈکاریں آئیں۔

پیلے سا گھٹک ایسڈ

(Sali Cyclic Acid) 30 'چار گھنٹے بعد'

بعد

☆ آسانی سے اور بہت زیادہ خون خارج ہو۔ خون مسلسل بہتا رہے اور جے بھی نہیں۔ فاسفورس 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

بائیو کیمک کی فیرم فاس 3x سوڑھوں کی ہر قسم کی بیماری کے لئے بہت مفید دوا ہے۔

## پائوریٹا / سوڑھوں سے پیپ آنا

(Pyorrhoea)

پائوریٹا کے مرض میں دانتوں سے پیپ آنے لگتی ہے۔ جریان خون بھی ہوتا ہے۔ زبان میلی رہتی ہے اور سانس کے ساتھ بدبو آتی ہے۔ بعض دفعہ دوسرے شخص کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ اس مرض میں سوڑھے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کی جڑیں نکلی ہو جاتی ہیں اور دانت ہلنے لگتے ہیں۔ ٹھنڈی گرم چیزیں لگنے لگتی ہیں۔ دانت بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ مرض بڑھ جانے کی صورت میں مریض متاثرہ دانتوں سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ دانت اور سوڑھے کمزور ہو جانے کی وجہ سے دانت گر جاتے ہیں۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ دانتوں اور پائوریٹا کے لئے بہترین دوا۔

کیلنڈولا 30 'چار گھنٹے بعد'



☆ دانتوں کا درد۔ تھوک کثرت سے آئے۔ کھاتے ہوئے بہتر ہو۔ ٹھنڈی ہوا گلنے اور دانتوں کو ایک دوسرے سے ملانے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

پلاٹینگو 30' چار گھنٹے بعد

☆ سوڑھے سکڑے ہوئے جن سے آسانی کے ساتھ خون بنے لگے۔

کاربوئیج 3x یا 6' چار گھنٹے بعد

☆ درد والی سوزش اور زخم۔ ہوا سے بہت زیادہ حساس۔ سوڑھوں کے اوپر آبلے ہوں۔

سلیسیا 12x یا 30' چار گھنٹے بعد

☆ پھولے ہوئے سوڑھوں سے خون جاری ہو۔ منہ سے بدبو آئے۔ دانت جلدی ٹوٹے لگیں۔

کریازوٹم 30' چار گھنٹے بعد

☆ سوڑھے پکنے لگیں اور ان میں پیپ پڑ جائے۔

گن پاؤڈر 3x یا 6' چار گھنٹے بعد

☆ سوڑھے پھولے ہوئے اور منہ میں نمی ہو۔ بدبو آئے۔ تھوک زیادہ بنے اور پیاس ہو۔

مرک سال 30' چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی سلیسیا 12x یا 30x بھی مفید دوائیں ہیں۔

بہرونی علاج کے لئے سوڑھوں پر لگانے کے لئے کیلنڈولا Q ایک

نسیا ریپچی Q اور آرینکا Q + گلیسرین کا لوشن 1 اور 9 کی

مناسبت سے۔



# سکروی

## Scurvy

سکروی کا مرض وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے یا غیر متناسب اور ناکافی خوراک کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض میں منہ کی جھلیاں ورم آلود، خشک اور سوزشی ہو جاتی ہیں۔ جریان خون ہوتا ہے اور مسوڑھے سوج جاتے ہیں۔ ایک طرح کا السر یا زخم بن جاتا ہے۔ جلد میں مساموں کے گرد خونی نکلتے سے بن جاتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ سوچے ہوئے منہ کے لئے جو کہ مرکری یا پاپوریا کی وجہ سے ہو۔  
کاربوئیج 3x یا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ سکروی یا ورم آلود منہ کے لئے جبکہ مسوڑھے نرم ہوں اور ان سے آسانی کے ساتھ خون بنے لگے۔  
مرکیورس سال 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ شدید لاغری، ہلکے بخار کی سی کیفیت۔ السر میں جلن ہو اور مریض پریشان ہو۔  
آرسنک البم 30، چار گھنٹے بعد
- ہائپو کیمک کی کالی میور 6x اور نیزم فاس 6x بھی مفید ادویات ہیں۔



# سانس رک جانا

## Asphyxia

(Apparent Death)

بعض دفعہ کسی فرد کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی حیاتیات (گرمی یا حدت جسم) کسی خاص وجہ سے عارضی طور پر موقوف ہو گئی ہو اور ایسی صورت میں اگر احتیاط اور ضروری علاج معالجے سے کام نہ لیا جائے تو واقعی موت واقع ہو سکتی ہے۔ لہذا ایسے حالات میں جبکہ ابھی پورے طور پر موت واقع ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے بڑی احتیاط اور ضروری اقدامات کرنا نہایت ضروری ہے۔ جب تک واضح اور قطعی طور پر یقین نہ ہو جائے یا مردے کی مخصوص بو کا احساس نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی ایسا غلط اقدام نہیں کرنا چاہئے جس سے کہ عارضی حیاتیات ختم ہونے کے بجائے واقعی موت ہو جائے۔

اچانک موت درج ذیل اسباب سے واقع ہو سکتی ہے۔

- (1) بھوک سے۔
  - (2) بلندی سے گرنے یا شدید چوٹ آنے سے۔
  - (3) غیر معمولی بجلی کی کوند سے (آسمانی برق یا بجلی گرنے سے)۔
  - (4) ڈوبنے سے۔
  - (5) زہریلے مادے یا بخارات کی وجہ سے دم گھٹنے سے یا کسی کیمیکل کی بو سے۔
  - (6) سردی یا ٹھنڈے بخ ہو جانے سے۔
  - (7) کسی مسلسل یا اچانک جان لیوا بیماری سے۔
  - (8) لو لگنے (Sun stroke) سے۔
- اب ہم مندرجہ بالا اسباب میں سے ایک ایک کا علیحدہ علیحدہ جائزہ اور احتیاطی تدابیر اور ضروری علاج بیان کرتے ہیں۔

1۔ بھوک سے : جب کوئی شخص طویل عرصے تک بھوکا رہا ہو اور نتیجتاً اس کے جسم کی حرارت معطل ہو گئی ہو تو اسے وقفے وقفے سے گرم دودھ پلایا جائے۔ دودھ کی مقدار شروع میں کم سے کم یعنی کہ قطرہ قطرہ دی جائے اور آہستہ آہستہ اس کی مقدار چائے کے چمچے کے برابر کر دی جائے۔ ازاں بعد کچھ وقت کا وقفہ دے کر بہت تھوڑی سی مقدار میں کوئی گرم



مشروب مثلاً گوشت کی بخنی دی جائے یا Avena Sat Q کے 10 سے 15 قطرے گرم پانی میں ملا کر دیئے جائیں۔ جب جسم میں حرارت پیدا ہو جائے اور مریض کچھ دیر گہری نیند سوچکے تو اس کو تھوڑی سی مقدار میں خوراک دی جائے۔ کھانا وقفے وقفے سے اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں دیا جائے اور اس طرح مریض کو آہستہ آہستہ اپنی قوت بحال کرنے میں اس کی مدد کی جائے حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر صحت یابی حاصل کر لے۔

2- گرنے یا چوٹ لگنے سے : جب مریض کہیں سے گرنے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے تو اسے بڑے آرام کے ساتھ آہستہ سے پرسکون جگہ پر یا بستر پر لٹا دینا چاہئے۔ اس کا سر اونچا رکھنا چاہئے اور ہر آدھا گھنٹہ بعد اس کو آرنیکا مونٹ 200 کی چند خوراکیں دینی چاہئیں۔ منہ کے ذریعے آرنیکا دینے کے علاوہ جلد پر ملنا بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

3- برق یا بجلی سے : جب مریض بجلی گرنے سے بے ہوش ہو گیا ہو تو اس کو مکمل اور صاف فضا میں لٹا دینا چاہئے اور اس کے چہرے، گردن اور چھاتی پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے چاہئیں۔ اگر جسم ٹھنڈا ہو گیا ہو تو حرارت پیدا کرنے کے لئے اس کو سہلانا چاہئے۔ اگر ضرورت ہو تو مصنوعی تنفس بھی دیا جاسکتا ہے۔

4- ڈوبنے سے : اگر ڈوبنے کی وجہ سے مریض بے حس و حرکت ہو جائے تو اس کو ہاتھوں سے سہلانا اور رگڑنا چاہئے۔ اس کے جسم کو گرم کپڑے سے ڈھک دینا چاہئے اور اس کو گرم کمرے میں رکھنا چاہئے۔ اس کی ناک کے نچھنے، گلے اور منہ کو صاف کرنا چاہئے۔ گرم پانی کی بوتل یا کسی اور گرم چیز سے مریض کی ریڑھ کی ہڈی یا کمر کی سکاکی کرنی چاہئے۔ مریض کے پاؤں اور ٹکڑوں کو مسلسل سہلانا چاہئے۔ ضرورت ہو تو مصنوعی تنفس بھی دینا چاہئے۔ لیکے سس 30 یا 200 کے مطابق متعلقہ دوا جلدی جلدی دینی چاہئے۔

5- کیمیکل یا زہریلی گیس یا بخارات سے دم گھٹنا : کسی قسم کے کیمیکل زہریلی گیس یا بخارات سے دم گھٹنے کی صورت میں مریض کو کھلی ہوا میں رکھ کر مصنوعی تنفس دینا چاہئے۔ ساتھ ہی کاربوئیج 30 یا 200 تھوڑے تھوڑے وقفے سے دیتے رہنا چاہئے۔ بعض اوقات کونکے کی زہریلی گیس سے مریض کا چہرہ ہلکا گلابی نظر آتا ہے جس سے دیکھنے والوں کو مغالطہ لگ سکتا ہے کہ مریض خطرے سے باہر ہے اور اس میں زندگی کی حرارت باقی ہے۔ ایسا صورت میں غلط فہمی کی وجہ سے مناسب دیکھ بھال نہ کر سکنے کے نتیجے میں موت واقع ہو سکتی ہے لہذا اس حالت میں مریض کی مکمل طور پر نگرانی کی جانی چاہئے اور احتیاطی اقدامات اور طبی



امداد دینی چاہئے۔

اگر مریض مکمل طور پر بے حس یا بے ہوش ہو تو اوپیم 200 یا 1M استعمال کرانی چاہئے۔ اگر مریض کا جسم ٹھنڈا ہو تو اسے گرم کپڑے سے پورے طور پر ڈھانپ دینا چاہئے۔ گرم پانی وغیرہ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

6- ٹھنڈ یا سردی سے جسم جانے سے : جب مریض کی حرارت زندگی شدید ٹھنڈ کی وجہ سے معطل ہوئی ہو تو مریض کو ٹھنڈی جگہ یا ٹھنڈے کمرے سے بڑا آرام کے ساتھ کسی گرم جگہ منتقل کر دینا چاہئے اور کوشش کرنی چاہئے کہ اسے ٹھنڈی ہوا کا کوئی جھونکا تک نہ لگے۔

7- طویل، مسلسل یا اچانک شدید بیماری سے : مریض کا علامات کے مطابق علاج کیا جائے اور حسب ضرورت متعلقہ دوا دی جائے۔ گویا صدے کی نوعیت اور مریض کی کیفیت کے مطابق جس قسم کی احتیاطی تدابیر اور علاج ضروری سمجھا جائے ویسا ہی کیا جائے۔ اس سلسلے میں مذکورہ اسباب کو پیش نظر رکھا جائے اور ان سے متعلقہ جو علاج اور احتیاطی تدابیر بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق حسب ضرورت عمل کیا جائے۔

8- لو لگنے سے : اگر مسلسل دھوپ میں رہنے یا لو لگنے سے حالت بگڑی ہو تو مریض کو کسی اندھیری، سایہ دار اور پرسکون جگہ رکھنا چاہئے اور اس کے کپڑے ڈھیلے کر دینے چاہئیں۔ گرم پانی سے تر کر کے ایک کپڑا اس کے سر کے گرد لپیٹ دینا چاہئے اور اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بدلتے رہنا چاہئے۔ ساتھ ساتھ اس کے جسم کی ہلکے گرم پانی سے نکور کرتے رہنا چاہئے۔ Glonoine 6 یا 30 کی چند خوراکیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے دینا بہت فائدہ مند ہے۔ منہ کے ذریعے دینے کے علاوہ اس دوا کا جسم پر ملنا بھی مفید ہے۔ نمکین پانی یا گلوکوز وغیرہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں وقفے وقفے سے دیتے رہنا چاہئے۔



دومہ

Asthma

(سانس کی نالیوں کا دومہ)

سانس کی نالی کی سوزش جو کھانسی اور کسی چیز سے الرجک ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ ایسوی فیلیا کی مقدار بڑھا دیتی ہے۔ جن سے تشخیص کے عمل میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ عمل تنفس میں دقت، نسیج میں ہوا کی موجودگی، خراہٹ کی آواز کے ساتھ کھانسی سانس کی نالیوں کے دومہ کی تکلیف کی خاص خاص شکایات ہیں۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ سردی کے موسم میں تنگی، نفس کی شکایت بڑھ جائے۔ گردوغبار میں، موسم کی تبدیلی پر۔ ٹھنڈی چیزیں پینے سے، تھکن سے اور دھوئیں سے۔ صبح کے وقت شدت پیدا ہو جائے۔ آواز بیٹھ جائے ساتھ سینے میں درد کی شکایت ہو۔

کاسیا سوفیرا (Cassia Sophera) Q

یا 30، چار گھنٹے بعد

☆ کیرٹوں کی ہسٹری کے ساتھ بچوں کو دومہ کی تکلیف کے لئے۔

سائنا 10M یا 50M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ بہت زیادہ بو کی وجہ سے۔ گیس کی شکایت رکھنے والے مریض کے لئے۔ تنگی، نفس اور سینے میں کچھاؤ اور تناؤ کے لئے۔

سنگونیریا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ مریض صرف کھڑے ہوئے صحیح طور پر سانس لے سکے۔

کینابلس سٹوا 100 یا 1M، چار گھنٹے

بعد، چھ مرتبہ

☆ غصے کی وجہ سے۔ گھٹن کی وجہ سے سینہ بند ہو جائے۔

کیومیلا 200 یا 1M، چار گھنٹے بعد

☆ اگرچہ دے کے شدید حملے کے دوران جسم ٹھنڈا ہو اس کے باوجود پٹکے کی ہوا لینے کی خواہش ہو۔

کاربوونج 30، آدھا گھنٹے بعد

☆ ہسپتالوں میں ہوا پھپھانے میں دقت محسوس ہو۔ سمندر میں بہتر محسوس کرے اور زمین یا خشکی پر آنے کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔ سمندر سے دور رہنے والوں کا دمہ۔  
برومیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ خشک اور تلی کی وجہ سے ہونوالا دمہ۔ تنگی نفس اور سینے میں چھین کا احساس۔  
سکوٹیل 30 'چار گھنٹے بعد

☆ خشک کھانسی۔ آرام سے تکلیف بڑھے۔ صبح کے چار بجے تنگی نفس۔  
پینی سلینیم 200 'چار گھنٹے بعد

☆ کمر کے بل ہاتھ پاؤں پھیلا کر لیٹنے سے بہتر محسوس کرے۔  
سورینیم 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ بچوں میں دمہ کی وجہ سے تشنج۔ رطوبات کے اخراج کے ساتھ سوزش۔ (بطور معاون دوا)

☆ بیسی لینم 1M 'پندرہویں روز' چھ مرتبہ  
☆ ذرا سی بھی حرکت کے بعد سانس لینا مشکل ہو جائے۔ خون میں آکسیجن بڑھانے کے لئے سانس لینے والے مرکز میں حرارت پیدا کرنی پڑے۔

اپسی ڈوسپیرما (Asplidosperma) Q  
10-1 قطرے، دو گھنٹے بعد

☆ بہت زیادہ تنگی نفس۔ کھانسی اور رطوبات کا زیادہ اخراج۔ نسیج میں ہوا کی موجودگی۔  
انٹی مونیم آر سکیم 6 یا 30 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ رات کے وقت دمہ۔ جبکہ بہترین منتخب کردہ دوائیں بھی کام نہ کریں۔  
سفلینم 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ ٹھنڈے مزاج کے افراد کے لئے، جن کی تکلیف میں ٹھنڈی چیزیں پینے، غصہ کرنے اور فکر مندی سے اضافہ ہو جائے۔ طبیعت میں شدید بے چینی اور نہ مٹنے والی پیاس۔  
آرسنک البم 30 'دو گھنٹے بعد'

☆ برسات اور مرطوب موسم میں دمہ جس میں ہر حملے کے دوران آنتیں ڈھیلی پڑ جائیں۔  
نیرم سلف 6x یا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ شدید حملے کی وجہ سے مریض بے جان ہو جائے۔ ہسپتالوں میں فالج کی سی کیفیت ہو



جائے۔ نیلا یرقان ہو جائے۔

ہائڈرو ایسڈ 30 یا 200 'آدھا گھنٹے  
بعد، تین مرتبہ

☆ صبح سویرے یا آدھی رات کے وقت تنگی و نفس۔ خواہش کرے کہ تمام کھڑکیاں کھول  
دی جائیں۔

سلفر 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ اسٹریا کی وجہ سے دمہ۔ کھانسی ہو۔ بستر گرم ہونے کی وجہ سے تکلیف بڑھے۔

نکس موسکاٹا (Nux Moch) 30 یا

200 'چار گھنٹے بعد

☆ ٹریفک کی وجہ سے آلودہ فضا اور لوہے کے کارخانہ کی وجہ سے سانس لینے میں دقت۔

سلفور کم ایسڈ

(Acid Sulphurocum) 30 یا

200 'چار گھنٹے بعد

☆ پھولوں کی خوشبو سے دمہ ہو جائے۔

ایبلنٹس 30 'چار گھنٹے بعد

☆ نزلے زکام کے ساتھ دمہ۔ کھلی ہوا کی خواہش۔ رجم میں بد نظمی۔

سینا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ پتھر کانٹے والوں، کپڑے کی ملوں میں کام کرنے والے مزدوروں اور کارندوں کو دمہ کی  
شکایت۔ (احتیاط سے استعمال کرائی جائے۔)

سلیسیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد یا

حسب ضرورت)

☆ رفع حاجت کرتے ہوئے کچھ بہتر رہے۔ گردوغبار سانس کے ساتھ اندر جانے سے  
تکلیف زیادہ بڑھے۔

پوتھوس فونڈس (Pothos foe) 6 یا

30 'چار گھنٹے بعد

☆ شدید حملے کے دوران جبکہ فکر، خوف اور تنگی و نفس ہو۔

اکونائٹ Q 'اپنی کاک Q 5 تا 10

قطرے یکے بعد دیگر 'آدھا گھنٹہ بعد



☆ جب سونے لگے یا سونے کے بعد تکلیف بڑھے۔ کھٹے اور سرکے والی اشیاء کھانے سے بھی تکلیف میں اضافہ ہو۔

لگے کس 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ نفسیاتی قسم کے مریضوں کے لئے۔ دن کے وقت تکلیف بڑھے۔ گھٹنوں میں چھاتی دبا کر بیٹھنے کی پوزیشن میں کچھ بہتر محسوس کرے اور سمندر کے کنارے بھی اچھا محسوس ہو۔

میڈورنیم 200 یا 1M 'پندرہویں روز'  
تین مرتبہ

☆ مشکل سے اور جلدی جلدی سانس لے۔ ایسا محسوس کرے کہ ہر سانس آخری سانس ہو۔ پیاس بالکل نہ ہو۔

ایس ملینکا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ جذبات (رنج صدمہ) وغیرہ کو دبانے کی وجہ سے دمہ۔ (ذہنی اور جسمانی طور پر نفسیاتی) تھوک کم مقدار میں آئے۔ سانس کے ساتھ دھواں اندر جانے سے تکلیف بڑھ جائے۔

اکنیشیا 1M یا 10x 'چار گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ

☆ Steroids وغیرہ لینے کے بعد ہومیوپیتھک علاج کے لئے آنے والے مریضوں کے لئے۔ ویکسین کے برے اثرات۔ ٹھنڈے قسم کے مریض۔

تھوجا 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ سانس کی نالیوں میں رکاوٹ کے سبب دمہ جس میں غدد وغیرہ میں بھی بد نظمی ہو۔

تھائراؤڈین (Thyroidin) 1M 'ہفتہ

وار' تین مرتبہ

☆ اعصابی کمزوری کی وجہ سے دمہ۔ تشنج اور سینے میں کھپاؤ اور تناؤ۔ پانی پینے سے کچھ افادہ محسوس ہو۔

کوپرم میٹلیکم (Cuprum met) 30

یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ خشک ٹھنڈے موسم میں تکلیف بڑھے اور مرطوب موسم میں بہتر ہو۔

بیبیر سلف 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

- ☆ اعصابی تناؤ۔ ذہنی اور جسمانی طور پر نفسیاتی۔ سوتے ہوئے گلے میں پھندا سالک جائے۔  
 و۔ بلیریانا (Valeriana) Q یا 30 چار  
 گھنٹے بعد
- ☆ مریض صحیح طور پر سانس نہ لے سکے جبکہ بستر میں لیٹا ہو۔  
 گرینڈیلیا اور بلاٹا

Q (Grindelia and Blatta)

10-5 قطرے، دو گھنٹے بعد

جب ایسی نوفل کاؤنٹ (eosinophil count) زیادہ ہو تو  
 ہسٹامائن (Histamine) اور ایسی نوفلینم  
 1M (Eosinophilinum) یا 200 دینا بہت فائدہ مند

—



# ہوا کی نالیوں کا پھیلاؤ

(Bronchiectasis)

(See bronchitis and asthma also)

ہوا کی نالیوں (شعبتیں) کے پھیلاؤ کو Bronchiectasis کہا جاتا ہے۔

## علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ تنگی، نفس کے ساتھ نسیج میں ہوا کی موجودگی اور کھانسی۔ اخراج مشکل ہو اور بلغمی رطوبات کی زیادتی۔

انٹی مونیم آر سکیم 6 یا 30، چار گھنٹے بعد

☆ شدید کھانسی اور پوزیشن (پہلو) بدلنے سے بڑھ جائے۔ دانتوں کا ناسور یا زخم۔

کریازوٹ 30، چار گھنٹے بعد

☆ کھانسی جو چھینکوں پر ختم ہو۔ اخراج مشکل ہو۔ غدودوں کی رطوبت بہت زیادہ اور سخت ہو۔

سینگا Q 5 یا 10 قطرے، چار گھنٹے بعد

☆ نیلا ریکان۔ ہمسجڑے وریدی خون سے بھرے ہوں۔ خشک، نشجی اور گھٹن والی کھانسی۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ 30، دو گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ گھٹنے میں بہتر محسوس کرے۔ چھاتی کی حالت دن کے وقت خراب اور سمندر کے قریب بہتر محسوس کرے۔

میڈورنیم 200 یا 1M پندرہویں روز

تین مرتبہ

بائیو کیمک کی سلیسیا 6x یا 12x بھی مفید ہے۔



# ذات الجنب/ذات الصدر/بھسھرے کے پردے کی سوزش

## Pleurisy

اس مرض میں بھسھرے کے پردے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ سینے کے عضلات درد کرنے لگتے ہیں۔ اکثر اوقات سینے کے ایک طرف درد ہوتا ہے۔ سینے کو حرکت دینے اور گہرا سانس لینے سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ سینہ کے اوپر دبانے سے آرام ملتا ہے۔ درد کی لہریں بغل اور ہنسی کی ہڈی تک محسوس ہوتی ہیں۔ سانس کھنچ کر اور تیز آتا ہے۔ نبض بھری ہوئی اور تیز چلتی ہے۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ ہیلورسی کے ساتھ بھسھرے کے متورم ہو جانے کی صورت میں بلغم بکثرت اور خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ یہ مرض سردی لگنے، گیلا کپڑا پہنے رکھنے، زخم یا سینے پر چوٹ لگنے سے ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس مرض کا سبب مادہ سل ہوتا ہے جو بھسھروں میں سرایت کر جاتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ بھسھروں کے پردے کی سوزش کے ساتھ سینے میں چبھنے والے درد۔ آگے کی جانب جھکنے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ بلغم کا ذائقہ میٹھا سا ہو جس پر کھیاں بیٹھیں۔

شینم میٹلیکم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ چھاتی میں چبھنے والا درد ہو۔ بائیں کروٹ سے لیٹنے سے تکلیف بڑھے۔ ٹھنڈے پانی کی خواہش ہو۔

فاسفورس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ خشک سرد ہوا لگ جانے کی وجہ سے بھسھروں کے پردے کی سوزش ہو جس کے ساتھ تیز بخار بھی ہو۔

اکونائٹ 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ سینے میں شدید چبھنے والا درد۔ گرمائش اور چلنے سے تکلیف بڑھے۔

کالی آیوڈیم 30 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ سینے میں کھپاؤ۔ پیاس ندارد۔ گرمائش سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

ایس ملنیکا 30 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ



☆ بننے میں چبھنے والے درد۔ کمر کے بل لیٹنے سے تکلیف بڑھے۔ صبح کے وقت تکلیف میں اضافہ ہو۔

☆ چھاتی میں چھین دار درد۔ حرکت کرنے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ آرام اور گرمائی سے آفاقہ ہو۔

برائی اونیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

بائو کیمک کی فیرم فاس 6x کالی میور 6x اور کلکیریا فاس 12x  
بھی مفید ادویات ہیں۔

دیگر اہم ادویات : آرسینک ایوڈیم، ٹوبرکولینم، نیڑم سلف  
اور ایکنے لکسا انڈیکا وغیرہ۔



# کھانسی / گلا بیٹھنا

## Cough

(See hoarsness, Wheezing etc also)

کھانسی عموماً ہوا کی نالیوں کی لعاب دار جھلی کی سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سردی کی کھانسی اکثر اوقات چند روز رہ کر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار بد پرہیزی کی وجہ سے دیر تک چلتی ہے۔ بعض دفعہ کھانسی خشک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بلغم نہیں آتا ہے یا بہت کم مقدار میں نکلتا ہے۔ بلغمی کھانسی میں پتلا یسدار اور چمکیلا بلغمی مادہ بڑی مقدار میں خارج ہوتا ہے عام طور پر کھانسی کا زور رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے اور نیند خراب ہوتی ہے۔ کھانسی کے ساتھ گلے میں خراش ہوتی ہے۔ آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ سینے میں گھٹن ہوتی ہے۔

عام طور سے گردوغبار، سل، آتشک، جوڑوں کے درد، بعض امراض قلب اور دھوئیں وغیرہ کے سبب سے کھانسی ہو جاتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کھانسی ہوئے دماغ ڈھیلا پڑ جائے۔

کاربو اینی میلس 30 یا 200 چار گھنٹے

بعد

☆ کھانسی کے ساتھ محسوس ہو کہ گلے میں گرد جمی ہے۔

چیلی ڈونیم 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ کھانسی اور سانس کی گھٹن صرف دن کے وقت۔

ریو میکس 30 چار گھنٹے بعد

☆ رات کے وقت خشک کھانسی چھین کے ساتھ۔ کھانسی سے چہرہ سرخ ہو جائے اور سر میں گھٹن سی ہو۔

بیلاڈونا 30 چار گھنٹے بعد

☆ رات کے دو اور چار بجے کے درمیان شدید کھانسی۔

کالی کارب 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ خشک کھانسی گرم اور نمکدار مشروبات کی خواہش کے ساتھ۔

لیک کیناٹم (Lac Caninum) 30  
یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ کھانسی ہمیشہ چھینکوں پر آکر اختتام پذیر ہو۔

سینکا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ پہلی ایک دو گھنٹے کی نیند کے بعد کھانسی شدید ہو۔

اریلیا 30 (Aralia r) یا Q 'چار گھنٹے  
بعد

☆ خشک کھانسی خشک ٹھنڈی ہوا لگ جانے کی وجہ سے دماغ میں خوف یا پریشانی ہو۔  
اکونائٹ 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ درد کا ہر قسم کا دورہ اعصابی کھانسی کو بڑھا دے۔

ہرا برازیل 30 (Hura. b) 'چار گھنٹے  
بعد

☆ خشک اور سخت کھانسی۔ رات کے وقت بڑھ جائے۔ دن میں ہلکے ہلکے حرکت کرتے یا  
چلنے ہوئے بہتر ہو۔

سفیلیم 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین  
مرتبہ

☆ کھانسی جو اوپر کی طرف جانے کی نسبت نیچے کی طرف آتے ہوئے بڑھ جائے اور شام  
چار سے آٹھ بجے تک زیادہ ہو۔

لائیکو پوڈیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد  
☆ سگریٹ پیتے ہوئے کھانسی میں کمی ہو۔ ہر حملے کے بعد سانس لینے میں دقت ہو۔ رونے  
کے دوران اور بعد میں کھانسی۔

ٹرنٹولا ہسپانیہ 30 (Tarentula h.)  
200 'چار گھنٹے بعد

☆ گلہ بیٹھنے اور آواز ختم ہو جانے کے ساتھ کھانسی۔

فاسفورس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ پیلا اور زائقے میں میٹھا بلغم۔ سینے میں کمزوری اور خالی پن۔  
سینم میٹلیکم 'چار گھنٹے بعد

☆ دوران حمل کھانسی۔ ششی کھانسی۔

☆ دوائی برنم آپولس 30 'چار گھنٹے بعد  
☆ سینے میں خرخراہٹ۔ بلغم نکالنا مشکل ہو۔ زبان پر سفیدی۔ کھانسی اور جھائیاں یکے بعد  
دیگرے آئیں۔

☆ انٹی مونیم ٹارٹ 30 'آدھا گھنٹہ بعد'  
تین مرتبہ

☆ موسیقی سننے سے کھانسی شروع ہو جائے۔

☆ ایبر اگر۔ سیا 30 'چار گھنٹے بعد  
☆ ٹھنڈی ہوا لگنے کے بعد کھانسی۔ گلے میں کسی پیرنی چیز یا ریزے کا احساس۔ نگتے ہوئے  
وقت محسوس ہو۔ مریض ٹھنڈ اور چھوئے جانے سے بہت زیادہ حساس۔  
☆ بیبر سلف 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ لیٹے ہوئے کھانسی میں کمی ہو۔

☆ مینگنم (Manganum acet) 30  
چار گھنٹے بعد

☆ چیچک کے بعد کھانسی یا باری کے بخار کے دب جانے سے۔  
☆ یوپیوریم پروفیم 30 'چار گھنٹے بعد'  
☆ ہچکی کے بعد کھانسی۔

☆ ٹریملیم P 6 یا 30 'چار گھنٹے بعد'  
☆ علامات مسلسل بدلتی رہیں۔ بہترین منتخب ادویات بھی ناکام ہو جائیں۔ ذرا سی بھی ہوا  
لگنے سے نزلہ زکام ہو جائے۔

☆ ٹورکولینم 200 'ہفتہ وار' تین مرتبہ  
☆ جب بھی چلے کھانسی ہونے لگے لہذا ہر وقت کھڑے رہنا پڑے۔ دھوئیں سے تکلیف  
بڑھے۔ کھانسی کے ہر وقفے کے بعد نیند کا غلبہ ہو۔

☆ اکیسیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ نزلے زکام کی کھانسی۔ غیر ارادی طور پر پیشاب خطا ہو جائے۔ چھینکیں آئیں۔  
☆ سکیولا مارٹا (Squilla mar) 30 'چار  
گھنٹے بعد'



☆ بلغم کی بہت خرخراہٹ۔ ڈھیلی کھانسی۔ نہانے کے بعد اور صبح کے وقت زیادہ کھانسی۔  
سلفر 200، ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ سوتے میں خشک کھانسی۔ غصے کے بعد کھانسی زیادہ ہو۔  
کیومیلا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ خشک کھانسی۔ سکاری (حس کی آواز) کھانسی یعنی آری چلنے اور نکلنے کی سی  
آواز کے ساتھ۔  
سپا نیچا 30، چار گھنٹے بعد

☆ گاڑھے لیس دار بلغم یا رطوبت کے ساتھ کھانسی۔ گرم کمرے میں تکلیف بڑھے اور گرم  
چیزیں کھانے پینے سے بھی۔ جب ٹھنڈے پانی میں ہو تو کھانسی آئے اور ٹھنڈی چیزیں پینے  
سے آرام آئے اور ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے بھی سکون ملے۔  
کوکس کیکٹائی (Cocus Cacti) 30،  
چار گھنٹے بعد

☆ بے سدار، تاردار بلغم کے ساتھ کھانسی۔ مزمن نزلے زکام کا مریض۔ کھانتے ہوئے کانوں  
میں درد ہو۔  
کالی بائی کروم 30، چار گھنٹے بعد

☆ گلے میں سانس کی ٹالی میں چھن کے ساتھ کھانسی۔ تسنی کھانسی۔ رطوبت کی فہ کے  
ساتھ۔ چپک وغیرہ قسم کی بیماریوں کے بعد کی کھانسی۔  
کاربووٹیج 30، چار گھنٹے بعد

☆ خشک کھانسی۔ سانس کی ٹالی میں ہوا، دھواں اور دھند وغیرہ کے داخل ہونے سے تکلیف  
بڑھ جائے۔ بات کرتے ہوئے کھانسی آجائے۔  
مینٹھا پیپٹا (Mentha Pip) 30،  
چار گھنٹے بعد

☆ خشک درد والی کھانسی۔ سر درد۔ رونے اور حرکت کرنے سے تکلیف بڑھ جائے۔ شدید  
پھاس۔ قبض کے ساتھ اجابت۔  
برائی اونیا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ خشک کھانسی۔ کھانسنے کے لئے جھکنا پڑ جائے۔ کھانسی کے ساتھ کوئی بلغم نہ نکلے۔  
کالی میور 6x یا 30، چار گھنٹے بعد

☆ مسلسل مٹلی اور تے کے ساتھ چھینکیں۔ زبان صاف ہو۔

اپنی کاک 30 چار گھنٹے بعد

☆ لگاتار اور پھٹنے والی کھانسی۔ نزلے زکام کے بعد ہونے والی کھانسی۔

سٹرا پٹینم (Strychninum) 30

چار گھنٹے بعد

☆ کھانسی سے فاصلے کے اعضاء تک میں درد ہو جائے۔  
کیسی کم 30 چار گھنٹے بعد

☆ رات کے وقت کھانسی اور دن میں دست۔


پٹرولیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ گرم کمرے میں شدید کھانسی۔ کھلی ہوا میں بہت ہو۔ منہ خشک ہو لیکن پیاس نہ ہو۔  
ہلساٹیل 30 چار گھنٹے بعد

☆ کھانٹے ہوئے بچوں کا سانس رک جائے۔ چہرہ نیلا پیلا سا ہو جائے۔ سانس کے لئے  
جلدی جلدی کوشش کرے۔ بندوق کے فائر کی طرح کھانسی جلدی اور مختصری۔  
کورالیم (Corallium) 30 چار گھنٹے بعد

☆ کھانٹے ہوئے پیشاب نکل جائے۔ مرطوب اور ٹھنڈی جگہ اچھا محسوس کرے۔ ٹنگ  
کھانسی ہو۔  
کاشی کم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کمبیشن نمبر 6 چار چار گھنٹے بعد دینے سے بھی بہت  
فائدہ ہوتا ہے۔



# مزمن کھانسی

(Chronic Bronchitis)

ہیچرٹوں کی ہوائی نالیوں میں نزلہ ورم ہو جانے سے کھانسی کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ جب یہ ورم ہیچرٹوں کی کیپریز میں ہو جائے تو اس سے شدید کھانسی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ سنے میں خاص طور پر بالائی حصے میں جکڑن محسوس ہوتی ہے اور سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ ابتدا میں کھانسی خشک ہوتی ہے لیکن چند دنوں کے بعد جھاگ دار اور بیدار بلغم نکلتا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ بلغم گاڑھا پیلا اور پیپ جیسا ہو جاتا ہے۔ اگر اس مرض کا بروقت اور صحیح علاج نہ کیا جائے تو مزمن کھانسی ہو جاتی ہے جس میں مریض کو کثرت سے لھٹا پلینہ آتا ہے۔

## علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ بلغم بیدار اور گاڑھا ہونے کی وجہ سے اسے اکھاڑنے کے لئے بہت زیادہ کھانسا پڑے۔ کھانستے کھانستے پیشاب خطا ہو جائے۔

سکیولا مارٹھا (Squilla) 30 چار گھنٹے

بعد

☆ سنے میں خرخراہٹ۔ سانس لیتے ہوئے آوازیں نکلیں۔ جب سونے لگے تو سانس رکنے لگے۔ جب سو کر اٹھے تو سانس لینے کے لئے ہانپنے لگے اور اٹھ کر بیٹھنا پڑ جائے۔ جب لیٹے تو سانس لینا مشکل ہو جائے۔

گرینڈیلیا (Grindella) Q یا 6 آدمے

گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ درد اور نشیبی کھانسی، تنگی، نرس، رات کے وقت تکلیف بڑھ جائے۔

نپتھالین (Naphthalene) 30

چار گھنٹے بعد

☆ ایسے مریض جو جلد جلد کھانسی نزلے اور زکام میں مبتلا ہوتے ہیں اور انھیں سانس گھننے والی مزمن کھانسی ہو۔

بیس لینم (Bacillinum) 200 یا

1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ جب جسم ٹیلا پڑ جائے اور لھٹا ہو جائے۔ مریض خواہش کرے کہ اس کو پکھا کیا جائے۔

کاربونیج 30 چار گھنٹے بعد

☆ مزمن کھانسی۔ کھانتے ہوئے جسم کے دوسرے اعضاء تک دکنے اور درد کرنے لگیں۔  
کیسی کم 30' چار گھنٹے بعد

☆ کھانسی کے حملے کے بعد سانس رک جائے۔

کلورالم (Chloralum) 30' چار گھنٹے

بعد

☆ جب جلد جلد سانس لینا پڑے اور بہت دقت ہو۔ بہت زیادہ تنگی و نفس کے ساتھ  
خرخراہٹ۔ بلغم کا اخراج بڑی مشکل سے ہو۔

انٹی مونیم آرسنک 6 یا 30' چار گھنٹے

بعد چھ مرتبہ

☆ سانس کی نالیوں کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ تھوک یا بلغم بہت مقدار میں۔

سابل سیرولاٹا (Sabai Ser) 6 یا 30'

چار گھنٹے بعد

☆ خشک اور دشوار کھانسی۔ تھوک خارج کرنا مشکل ہو۔

انٹی مونیم آیوڈیم 30' چار گھنٹے بعد

☆ چھاتی میں سوزش کے ساتھ کھانسی۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بہتر محسوس کرے۔ کھانتے ہوئے

پیشاب خطا ہو جائے۔

کاشی کم 30' چار گھنٹے بعد

☆ نڈھال ہو جائے۔ سخت بے چینی ہو۔ مختصر وقفے سے ذرا سے پانی کی خواہش۔ خشک

کھانسی۔ پانی یا کچھ اور پینے کے بعد تکلیف بڑھ جائے۔ آدمی رات کے وقت اٹھ کر بیٹھ

جائے۔ ٹھنڈا محسوس کرے۔

آرسنک البم 30' چار گھنٹے بعد





# کھانسی

(Bronchitis)

Acute (حاد)

See cough also

بلغمی جھلیوں اور ہوا کی نالیوں کی سوزش کو Bronchitis کہا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے۔ حاد قسم کی کھانسی کے تین مراحل یا حالتیں ہیں۔ ان تینوں مراحل اور حالتوں کے لئے علامات کے مطابق علیحدہ علیحدہ تفصیل اور دوا نیچے بیان کی گئی ہے۔

پہلا درجہ

## علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ خشک کھانسی جس سے بخار اور سر میں شدید درد ہو۔ بہت زیادہ وقفے کے بعد زیادہ مقدار میں ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہو۔ حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔

برائی اونیا 30 یا 200، تین گھنٹے بعد

☆ صحت مند آدمی جو اچانک ٹھنڈی ہوا لگنے سے جلد متاثر ہو جائے۔ طبیعت میں بے چینی ہو اور ٹھنڈ محسوس کریں۔ بخار تیز ہو۔ نبض تیز ہو۔ خوف اور فکر مندی بہت ہو۔

ایکونائٹ 30 یا 200، دو گھنٹے بعد

☆ جسمانی طور پر کمزور اشخاص اور تیز بخار ہو۔

فیرم فاس 6x یا 30، تین گھنٹے بعد

☆ بخار، نزلہ، زکام۔ سینے میں خراش اور تھکا دینے والی اور کھٹن والی کھانسی۔ پسینہ آنے سے بھی تکلیف میں کمی نہ آئے۔ منہ میں تھوک بھر جائے۔

مرکیورس سال 30، چار گھنٹے بعد

☆ آنکھیں سرخ۔ چہرہ چمکیلا سرخ۔ تیز بخار۔ سانس لینے میں دقت۔ جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے سانس لینے پڑیں۔ خشک کھانسی۔ گلا بیٹھ جائے۔ جلد خشک اور گرم۔ لیکن جسم کے ڈھکے ہوئے حصے نرم آلود۔

بیلادونا 30، دو گھنٹے بعد

اگر اوپر دی گئی ادویات میں سے کسی سے بھی افادہ نہ ہو رہا ہو تو سلفر کی 30 یا

فلک اور اچانک ہو لیو ال کھانسی کے علاج کے لئے پیل ٹوراک انوکٹ 200  
تین گھنٹے بعد 20 سری ٹوراک سپر سٹک 200 اور چار گھنٹے بعد تیسری ٹوراک  
سپا لیا 200 اور اس کے بعد سپر 200 اور سپا لیا 200 کی سیکے بعد دیگر چار  
چار گھنٹے بعد دونوں کی 20 دو ٹوراکس دینے سے بہتر نتائج حاصل کے جائے  
ہیں۔

## کالی کھانسی

### Whooping Cough

(See cough also)

کالی کھانسی اکثر تین سال سے دس سال تک کی عمر کے بچوں کو ہوتی ہے۔ یہ مرض مریض  
میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ اس مرض کا سبب ایک خوردبینی کیزا بتایا جاتا ہے جو کہ مریض  
کی ناک اور منہ کی رطوبت میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ کالی کھانسی خود زیادہ مسلک نہیں ہوتی لیکن  
اس کی وجہ سے بعض دوسری تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔ کھانستے ہوئے زور لگانے کی وجہ سے  
آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔

ناک یا کان سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ کان کا پردہ پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بخار، تھ  
حس اور سینے میں سٹی سی بچنے لگتی ہے۔ بعض اوقات مہینوں میں درم ہو جاتا ہے اور در  
بھی ہو سکتا ہے۔ کمزور بچوں کے سر میں پانی بھی جمع ہو سکتا ہے۔ تشنگ کا عارضہ بھی ہو سکتا ہے۔  
کھانسی کی اصل وجہ ہوا کی ٹالیوں کی لعاب دار جھلی کی سوزش ہوتی ہے۔ کھانسی کے  
دوران ہوا اندر کی جانب کھینچنے سے طلق میں تیزی کے ساتھ گزرنے کی وجہ سے ہو پ سی آواز  
نکلتی ہے اور زیادہ کھانستے ہوئے مریض کی رنگت بھی کالی سی ہو جاتی ہے اس لئے اسے کالی  
کھانسی کہتے ہیں۔ اس مرض کی ابتداء میں عام طور پر بخار ہوتا ہے۔ نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔  
کھانسی کے سختی اور طویل دورے پڑتے ہیں۔ مریض کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ عام طور پر کالی کھانسی  
کی میناد چھ ہفتے ہوتی ہے۔ لیکن یہ عرصہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر کھانسی کا دورہ  
رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ متعلقہ ادویات کے ساتھ ساتھ چھاتی اور کمر پر زخون کے تیل  
سے مالش کرنا بھی مفید ہے۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

معاون دوا۔ کالی کھانسی کا علاج شروع کرنے کے لئے بہترین دوا۔  
سفیلیم 1M ایک ٹوراک

☆ کالی کھانسی کی اعلیٰ ترین دوا جبکہ کھانسی کا حملہ اچانک اور شدید ہوا ہو۔

اردو سیرا Q یا 6 چار گھنٹے بعد تین مرتبہ

☆ دماغی یا احتیاطی دوا۔ سفیلنم کے بعد اس کی ایک خوراک دینے سے بہتر نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

پرتوزین (Pertussin) 200 یا 1M  
ایک خوراک

☆ گلے کی خشکی کے ساتھ کالی کھانسی۔ پیٹ میں درد ہو اور کھانسی کا دورہ پڑنے پر آنکھ سے آنسو تک نکل آئیں۔ ٹھنڈے سے تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔

یلاڈونا 30 چار گھنٹے بعد .

☆ جوان بچوں کی کھانسی کے لئے بہترین دوا۔ جن کی تکلیف ذرا سے سانس ہوا اور دھند سے بڑھ جائے۔

ہیستما پھرٹا (Mentha Pip) 30  
تین گھنٹے بعد

☆ کھانسی کے ساتھ سخت اور بے سدار مادہ کی تے بھی ہو رات کے وقت اور گرمائش سے تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔ ٹھنڈے کمرے میں اور ٹھنڈی چیزیں پینے سے اتفاق ہو۔

کوکس کیکٹس (Coccus Cact)

30 چار گھنٹے بعد

☆ کھانسی کے ساتھ 'ٹشج' ٹھنڈے اور چپکنے والے پسینے کے ساتھ تبدیل ہونے والی کیفیات کے لئے۔

کوپرم آر سکیم (Cuprum ars) 30  
تین گھنٹے بعد

کھانا شروع کرنے پر چند نوالے لینے کے بعد کھانسی اور تے ہونے لگے۔

☆ کھانا شروع کرنے پر چند نوالے لینے کے بعد کھانسی اور تے ہونے لگے۔

برائی اونیا البم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
بایو کیمک کی میگنیشا 6x اور کلکیریا فاس 6x بھی مفید

ادویات ہیں۔



## یرقان Jaundice

یرقان بذات خود مرض نہیں بلکہ بعض امراض جگر اور بعض دوسرے امراض کی علامت ہے۔ یہ مرض متعدی بھی ہوتا ہے جو ایک مخصوص دائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک مریض سے دوسرے تک کھانسی اور چھینکوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ یہ مرض موسم خزاں میں زیادہ ہوتا ہے۔

اس مرض کے آغاز میں بھوک مر جاتی ہے۔ آنکھوں کی رنگت زرد ہو جاتی ہے۔ اکثر چی متلاتا ہے۔ پیٹ میں بے چینی ہوتی ہے۔ زیادہ مریضوں کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ عام طور پر پہلے چار دن بخار ضرور ہوتا ہے، جو کہ 99 اور 101 درجے تک ہوتا ہے۔ چوتھے دن بخار اترتے ہی یرقان ظاہر ہونے لگتا ہے۔ یرقان کی حالت میں پاخانہ بے رنگ اور پیشاب سرخی مائل آتا ہے۔ بخار اترتے ہی عام طور پر بھوک لگنے لگتی ہے۔ جگر اور تلی بڑھ جاتے ہیں۔ جسم پر خارش ہوتی ہے۔ بعض اوقات جسم پر دانے بھی نکل آتے ہیں کبھی مریض کو ہر چیز زرد دکھائی دیتی ہے۔ مرض بڑھ جانے کی صورت میں پیشاب پاخانہ بھی زرد آتا ہے۔ بلکہ تھوک بھی زرد آنے لگتا ہے۔ بعض بچوں کو پیدائش کے چند دن بعد یرقان ہو جاتا ہے۔ تین دن کے اندر یہ مرض بڑھ کر سات سے چودہ دن کے اندر رفع ہو جاتا ہے۔ یرقان کا بروقت علاج کرانا ضروری ہے ورنہ اس سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ جھاگدار سیاہی مائل پیشاب۔ لگاتار متلی کے ساتھ۔ خصوصیت سے موقوفیء حیض کی عمر کے دوران یرقان کے لئے۔

لیکے سس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ شدید بھوک۔ چہرے کی رنگت گہرے بھورے رنگ کی سی۔ جلد پیلی اور گندی۔

ایوڈیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ بے چینی اور بخار کے ساتھ جگر کے آس پاس شدید درد۔ حمل کے دوران یرقان۔  
نومولود بچے کے یرقان کے لئے۔

اکونائٹ 30 تین گھنٹے بعد



☆ شدید پیاس اور قبض۔ گوشت وغیرہ کی خوراک کھانے کے بعد تکلیف زیادہ ہو۔ معدے میں پھاڑنے اور پھیلنے والے درد کے ساتھ۔

برائی اونیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد چھ

مرتبہ

☆ نلک اور سخت پاخانہ۔ آنکھ کا سفید پردہ پیلا ہو۔ بھوک بالکل ختم ہو گئی ہو۔ متلی اور تے ہو۔ دودھ پینے سے بد ہضمی ہو جائے۔ دائیں کوکھ میں درد۔

کیریکا چپایا (Carica Papaya) Q

یا 30 چار گھنٹے بعد تین مرتبہ

☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والے مریض۔ جلدی جلدی اجابت کی ضرورت محسوس کرے لیکن اخراج نہ ہو۔ ریاچ، گیس، ہوا یا بلند معیار زندگی کی وجہ سے یرقان ہو۔

نکس دامیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ کونین کے اثرات بد کی وجہ سے یرقان۔ شدید نہ بچنے والی پیاس اور بے چینی۔

آرسنک البم 30 چار گھنٹے بعد

☆ نومولود کو یرقان ہو۔ بچہ بہت زیادہ روئے اور جتنے گود میں لے کر پھرنے سے سکون محسوس کرے۔

کیومیلا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ جگر کی سوزش کی وجہ سے پیچیدگیوں کے سبب یرقان۔ چاک کی طرح گندے بدبودار پانی کی طرح کے پاخانے۔

پوڈو فائلم 30 چار گھنٹے بعد

☆ رطوبات زندگی ضائع ہونے اور ضرورت سے زیادہ مباشرت کرنے کی وجہ سے یرقان۔ ہاضمہ کمزور۔ جگر پر درم ہو اور بہت حساس ہو جائے۔ ریاحی تکلیفات کی وجہ سے یرقان ہو۔

چائنا 30 یا 6 چار گھنٹے بعد

☆ یرقان کی ابتداء میں جبکہ زبان صاف ہو اور متلی اور بد ہضمی ہو۔

اپی کاک 30 تین گھنٹے بعد چھ مرتبہ

☆ خون کی کمی کے ساتھ دماغی اور بھیڑوں کی تکلیفوں کے ساتھ یرقان۔

فاسفورس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ آنکھیں پھلی۔ جگر بہت زیادہ حساس کہ چھونے سے بھی تکلیف ہو۔ جگر میں پھیلنے اور بڑھنے والا درد جو جگر کے اطراف میں جائے۔

چیلی ڈونیم Q یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ کالا اور مسلک یرقان۔ ناک، منہ، اندام نہانی اور آنتوں سے گہرے رنگ کا خون خارج ہو۔

کروٹیل ہرائڈس (Crotalus H)

30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ زبان پر سفیدی خصوصاً "مرکزی حصے میں۔ بائیں جانب لیٹنے کے بعد دائیں کوکھ میں پھاڑنے والا درد۔ بد ذائقہ۔ متلی اور تے اور ہلکا سردرد۔

کارڈس میرائس (Carduus M) Q یا

30 چار گھنٹے بعد

☆ جگر کی بد نظمی کے ساتھ یرقان۔ تارکول کی طرح کالا پاخانہ۔

لپینڈرا (Leptandra) 30 چار گھنٹے

بعد

☆ ہیولیک (Haemolytic) یرقان کے لئے

200 T.N.T ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ معاون دوا۔

سلفر 30 یا 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

بائیو کیمک کی فرم فاس 6x سلفر 30 یا 200 کالی میور 6x اور

نیزم سلفر 12x بھی مفید ادویات ہیں۔

## پتے میں پتھری کا درد

### Gall Stone Colic

پتے میں صفرا یا کسی کرم کے اسمیں چلے جانے سے اس پر صفراوی مہیں جم کر پتھریاں بن جاتی ہیں۔ جو چنے یا ماش کے دانے کے برابر، نوک دار اور گول سی ہوتی ہیں۔ یہ تعداد میں دو چار دس اور سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں۔ جب یہ صفراء کی کنکریاں پتے کے اندر رہتی ہیں تب تک مریض کو کوئی تکلیف یا درد نہیں ہوتا لیکن جب کوئی پتھری پتے سے نکل کر نالی میں آتی ہے تو نف معده اور دائیں طرف پسلیوں کے نیچے شدید اور ناقابل درد اور ٹیسس ہوتی ہیں جسکی لہریں منکم اور دائیں کندھے تک جاتی ہیں۔ جب تک یہ کنکری پتے میں واپس نہ چلی جائے یا بارہ انگشتی آنت (ڈیویڈنم) میں نہ گر جائے تب تک سخت درد ہوتا رہتا ہے اور اگر یہ کنکری نالی میں پھنس جائے اور صفرا کی نالی کو بند کر دے تو یرقان کا مرض ہو جاتا ہے۔ مریض کو ہچکیاں آنے لگتی اور جی متلانے لگتا ہے۔ قبض ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ بد ہضمی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ مریض کچھ کھانے پینے سے گریز کرنے لگتا ہے۔ پتے کا یہ درم پرانا ہو جائے تو بہت سی کنکریاں بن جاتی ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ پتے کی پتھری کے درد کے لئے سب سے اعلیٰ دوا۔

کالسترینم (Cholesterinum) چار گھنٹے بعد

☆ سب سے بہترین دوا۔ پتے میں پتھری کا درد جو دائیں مونڈھے کے نچلے کنارے سے گذرے۔ جگر چھوٹے اور دبانے سے نرم لگے۔ چہرہ پیلا اور میلا سا ہو۔ تے آئے۔

چیلی ڈونیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ پتے میں پتھری کا درد۔ مریض بخ ٹھنڈی چیزوں آکس کریم مشروبات اور پانی کی خواہش کرے۔

فاسفورس 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ ٹھنڈ کا شدید احساس۔ کثرت مہینہ کے ساتھ دائیں سے بائیں جانب تیر کی سی تیزی کے ساتھ بڑھنے والا درد۔

فلکیریا کارب 30 یا 200 ہفتہ وار،

تین مرتبہ

☆ چنے میں چھری بننے سے روکنے کے لئے۔ قبض ہو۔ چھری بنی گئی ہو۔ سڑا ہوی درد۔

Q (Chionathus v) کینا تمس

☆ چھری گھٹے ہو

☆ چھری۔ برکان۔ بکر کے مقام پر بھاری پتی اور سخت ہے پتلی۔

Q (Carduus m) کارڈس مائلس

☆ نمی گھٹے ہو

☆ چھروں۔ پتے سیدھے پائے۔ کھانے کے بعد دانت میں ہے آرائی۔ کارڈس مائلس کا نام ہے۔

☆ پاد شکم ہار گھٹے ہو

☆ اگرچہ بھوکا محسوس کرے لیکن بھوک مرہا ہے۔ کھائی ہوئی اشیاء کا غیر محسوس ہونا۔

☆ بہت مساس ہو کر ڈا ہلا تک برداشت نہ کر سکے۔ دلچسپی سے دور اٹھے۔

☆ ہانا ۵ پتے ہیں چھری گھٹے ہو

☆ ۵ سے ۳۰ غلات ایک دن ہمارا

☆ محسوس کرے۔ کوئی خوراک لینا پسند نہ کرے۔ چنے میں چھری اور برکان۔

☆ گھس دھسکا ۳۰ ہار گھٹے ہو





# تلی کی تکلیفات

## Ailments of Spleen

تلی میں اجتماع خون، تلی کا بڑھ جانا اور خون کا پھیکا ہو جانا تلی کے عام امراض ہیں۔ جن میں تلی کسی قدر بڑھ جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے۔ دبائے سے دکھتی ہے۔ اکثر قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ خون پھیکا اور پتلا ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے پینہ کثرت سے آنے لگتا ہے۔ خشک کھانسی ہو جاتی ہے۔ تلی کا حجم اور وزن بڑھ جاتا ہے، جو ہاتھ لگانے سے بڑھی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور مریض روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ تلی کے مقام پر تیز درد۔ پاخانہ قبض سے ہو۔
- ہائیڈراسٹس کین Q یا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ تلی بڑھ جانے کی وجہ سے اسسفا اور سو جن۔ بے چینی اور نہ بچنے والی پیاس ہو۔
- آرسنک الیم 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ تلی بڑھ جائے اور چھوٹنے سے حساس۔ ورم آلود تلی۔ مریض ٹھنڈے مشروبات کی خواہش کرے۔
- فاسفورس 30 یا 200، چار گھنٹے بعد
- تین مرتبہ
- ☆ بچپن میں تلی اور جگر بڑھ جائے۔
- کلیریا آرسنک 6، چار گھنٹے بعد
- ☆ بڑھی ہوئی تلی اور درد۔ بائیں جانب کے تمام حصے میں درد ہو۔ سانس لینے میں دقت ہو۔
- سینو تھس Q 5-10 قطرے، چار گھنٹے بعد
- ☆ تلی بڑھی ہوئی اور سخت۔ اچھی خوراک کھانے کے باوجود لاغر ہوتا جائے۔
- ایوڈیم 30، چار گھنٹے بعد

☆ تلی پر درم آ جائے۔ مرطوب آب و ہوا میں تکلیف پڑھے۔ ٹھنڈا محسوس ہو۔ ہانر  
ست ہو۔

چائنا 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

تلی کے مقام پر کانٹے والے درروں کے لئے ہائیو کیمک کی  
گلیکیریا فاس 6x اور چھینے والے درروں کے لئے جس میں  
حرکت کرنے سے اضافہ ہو، کالی فاس 6x بہترین ادویات ہیں۔



# لبلبے کی تکلیفات

## Affections of Pancreas

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ چہلی اور موٹاپا کم ہو رہا ہو۔ بد ہضمی کی شکایت ہو۔ برف کی مانند ٹھنڈی چیزوں کی خواہش ہو۔

فاسفورس 30 یا 200 '10 منٹ بعد'

تین مرتبہ

☆ سر کی جانب خون کے دوران کے ساتھ لبلبے کی سوزش اور نزلہ زکام اور ناک بہنا۔

ہیلاڈونا 30 'تین گھنٹے بعد'

☆ لبلبے سوزش زدہ۔ جلن کا احساس۔ بد ہضمی اور میٹھے سے مادہ کی قے۔

آئرس فرسیکلر (Iris V) 30 'چار

گھنٹے بعد'

☆ سکڑا ہوا لبلبہ۔ شدید بد ہضمی اور قے۔ گوشت اور وزن کم ہو رہا ہو۔ جبکہ اچھی اور مقدار میں کافی خوراک کھا رہا ہو۔

آیوڈیم 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ بڑھا ہوا لبلبہ۔ خاص طور پر گنڈ مالا کی یا خنازیری تکلیفات میں جٹا مریض کے لئے۔

کلیریا آیوڈیم 30 'چار گھنٹے بعد'

بائیو کیمک کی کالی فاس 6x بھی مفید دوا ہے۔



## بد ہضمی

### Indigestion

اس مرض میں ہاضمے میں نقص ہو جاتا ہے۔ معدے کے انضمام کا فعل درست نہیں رہتا۔ مختلف مریضوں میں مرض کی مختلف علامات ہوتی ہیں۔ چنانچہ شدید بد ہضمی یا تو کبھی کبھار ہوتی ہے یا پرانی بد ہضمی میں علامات شدید ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے چند گھنٹوں بعد معدے میں درد یا بوجھ ہوتا ہے۔ ڈکاریں آتی ہیں۔ غذا منہ کی طرف واپس آتی ہے۔ مٹی اور تے بھی ہوتی ہے۔ کبھی قبض اور کبھی اسہال آسکتے ہیں۔ منہ سے بدبو آتی ہے۔ پیٹ دبانے سے درد ہوتا ہے۔ پرانی بد ہضمی میں بھوک مرجاتی ہے۔ مقام معدہ میں گرانی اور ہلکا ہلکا درد رہتا ہے۔ پیٹ میں نفخ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد گیس بن جاتی ہے۔ بلند آواز سے ڈکاریں آتی ہیں۔ غذا جلد بدن نہیں بنتی ہے۔

بد ہضمی کی بڑی وجہ ضرورت سے زیادہ کھانا، چبا کر نہ کھانا، کچی یا ٹھیل چیزیں کھانا۔ ترش اور چھلنی والی غذائیں کھانا۔ تمباکو اور چائے وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنا۔ بے وقت کھانا۔ ورزش اور سیر نہ کرنا، خون کا خراب ہونا، ذہنی اور جسمانی محنت زیادہ کرنا۔ غیر ضروری طور پر طرح طرح کی ادویات استعمال کرنا وغیرہ عام اسباب ہیں۔ عصبی کمزوری، پائوری، ذہنی پریشانیاں، جگر اور پتھریاز کی رطوبت میں نقص ہونے کی وجہ سے بھی بد ہضمی کی شکایت ہوتی ہے۔ دوسری کسی بیماری مثلاً "بخار وغیرہ کی وجہ سے بھی ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ غصہ کرنے کے بعد بد ہضمی۔ دوہرا ہونے سے بہتر محسوس کرے۔  
کالوسنتھ 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ
- ☆ بہت زیادہ پیاس اور قبض۔ کافی پینے کے بعد بد ہضمی۔  
نیزم میور 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ
- ☆ کسی رنج، مایوسی اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے بد ہضمی۔  
اگنسیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'



☆ جو کچھ بھی کھائے پئے تے کر دے۔ کسی بھی چیز کا صحیح ذائقہ محسوس نہ کرے۔ زبان جلی ہوئی سی محسوس ہو۔ مسلسل درد ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ جوف شکم میں کوئی نوک وار چیز چبھی ہو۔ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرے۔ ناشتہ کرنے اور سبزیاں کھانے کے بعد تکلیف پڑے۔

ہائڈراسٹس کین 6 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ زیادہ چائے پینے سے بد ہضمی ہو جائے۔

تھوجا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ مٹھائیاں کھانے یا کسی قسم کا خدشہ محسوس کرنے سے بد ہضمی۔

ار جشم نائٹرکیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ جگر کے مقام پر ہلکا سا درد۔ خشک کھانسی۔ صفراوی بد ہضمی۔ بہت مقدار میں پانی کی پیاس لیکن گرم مشروبات سے تے ہو جائے۔ کاروبار کے بارے میں سوچتا رہے۔ پیٹ میں پتھر کا سا بھاری پن۔ دل میں جلن سی محسوس ہو۔ جوف شکم میں بھاری پن۔ کھانے کے فوراً بعد کمر کے بل لیٹنے سے بہتر ہو۔

برائی اونیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ بائیں جانب کی پسی کے نیچے کسی چھوٹے سے مقام پر درد۔ خراش اور سوجن اور نرم پن۔ کھانے کے فوراً بعد درد، جلن اور بھاری پن۔ درد پیچھے کی جانب کندھوں کی طرف پھیلے۔ کھانے کے بعد کچھ بہتر ہو۔

کالی بالی کروم 30 'چار گھنٹے بعد

☆ خوراک کی نالی میں ٹھن اور سکلنے کے ساتھ بد ہضمی۔

ایبیس نالگرا (Ables nig) 30 'چار گھنٹے بعد

☆ خدشات اور خوف کی وجہ سے بد ہضمی۔ کوئی بری خبر سن کر یا کہیں جاتے ہوئے بد ہضمی۔ جیلی میم 30 یا 200 'آدھا گھنٹہ بعد، تین مرتبہ

☆ شدید قسم کا اچھارا۔ بہت زیادہ ڈکاریں۔ صبح کے وقت مدہوشی۔ صفراوی۔ جگر کے قریب چبھنے والے درد۔ تھوڑا اور ہلکا کھانے کے باوجود جوف شکم میں بھاری پن، جلن اور دباؤ۔

شراب اور مسالے دار چیزیں کھانے کی خواہش۔ چلنے سے تکلیف بڑھے اور کھانے کے بعد بہتر ہو۔

بیبیر سلف 30' چار گھنٹے بعد

☆ کھانے کے ذائقے کی ڈکاریں۔ کچے کھانے کی ڈکاریں۔ معدے میں جلن۔ چند گھنٹے پہلے کھائے ہوئے کھانے کی تے۔ بہت زیادہ اچھارا۔ ایسا محسوس ہو کہ بہت زیادہ کھایا ہے۔ معدے میں پتھر کا سا بھاری پن۔ کھانے کے ایک دو گھنٹے بعد تے ہو۔ کھایا پیا نکل جائے۔ گرم کمرے میں تکلیف بڑھے۔ عمدہ اور گرم کھانے سے بھی تکلیف میں اضافہ ہو۔ لھنڈی چیزیں کھانے سے عارضی طور پر کچھ افادہ ہو۔

ہلساٹیا 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ ریا حوں کے ساتھ بد ہضمی۔ ریا ح خارج کرنے کے بعد بہتر محسوس کرے۔

کاربووٹج 30' چار گھنٹے بعد

☆ اچھارا اور پیٹ درد۔ سوتے ہوئے منہ سے تھوک نکلے۔ مسلسل ابکائی آنے کو ہو۔ کھانے کے ذائقے اور تیزابی ڈکاریں۔ کھانے کے قریباً دو گھنٹے بعد جوف شکم میں کھنچاؤ کے ساتھ درد ہو۔ متلی اور کمزوری محسوس کرے۔ صبح کے وقت کچکی ہو۔ بہت زیادہ جلن۔ پیٹ درد اور اچھارا ہو۔

گریفائٹس 30' چار گھنٹے بعد

☆ بیٹھے رہنے کے عادی لوگ۔ زیادہ کھالینے سے بد ہضمی کی شکایت ہو۔

نکس دامیکا 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ دل میں جلن سی محسوس ہو۔ سانس لینے میں دقت ہو۔ پیٹ اور آنتوں میں ڈاٹ سی انک جائے۔ کھانے کے دو سے تین گھنٹے بعد درد۔ پیٹ بھرا بھرا معلوم ہو۔ منہ کا ذائقہ خراب ہو۔ دل ڈوبتا سا محسوس ہو۔ لھنڈے مشروبات پینے کے بعد اور جذباتی دباؤ سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

اناکارڈیم 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ پیٹ اور معدے میں جلن کے احساس کے ساتھ بے چینی۔ نہ بچنے والی پیاس۔ رکے ہوئے پانی کھانے اور سبزیاں کھانے سے بد ہضمی۔

آرسنک البم 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

بائیو کیمک کی گلیکیریا فاس 6x اور سلیسیا 12x چار گھنٹے بعد دینا بھی فائدہ مند ہے۔

## ضعف معدہ / بد ہضمی

(گیس کی شکایات کے ساتھ معدے کی گڑبڑ اور بد ہضمی)

### Dyspepsia

(See Flatulence also)

معدے کا فعل درست نہ رہنے کی وجہ سے بد ہضمی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ معدے کی جگہ اکثر اوقات درد ہوتا ہے۔ معدے پر بوجھ سا ہوتا ہے۔ بعض اوقات غذا منہ کی طرف واپس آتی ہے۔ ڈکاریں، متلی اور تے ہوتی ہے۔ بعض اوقات شکم میں نفخ ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں ایسوس خارج ہونے لگتی ہے۔ دست آنے لگتے ہیں یا قبض ہو جاتا ہے۔ بسیار خوری، کچی پکی غذائیں کھانا، کھانے کے ساتھ پانی زیادہ پی لیتا، چبا کر نہ کھانا، جگر اور ہنکریاز کی رطوبت میں نقص ہو جانا، مرغن اور ثقیل چیزیں کھانا وغیرہ اس مرض کے عام اسباب ہیں۔ ورزش نہ کرنا، شراب نوشی، تمباکو نوشی، چائے نوشی، عصبی کمزوری اور آنتوں کی تکلیفات بھی اس مرض کے اسباب ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ ہلکا ریاحی درد۔ کھٹی ڈکاریں اور متلی۔ بھوک مرجانا۔ زبان لمبی سی پللی اور پتلی۔ ہائیڈراکس کین 6 یا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ صبح کے وقت سخت متلی۔ انتہائی کمزوری کے ساتھ سبزی مائل زرد تے۔ شدید بھوک۔ مٹھائیوں کے لئے خواہش۔ ہوا کا اخراج معدے کے بھاری پن کے ساتھ۔ کھانے کے بعد زیادہ ہو جائے۔ ذائقہ کڑوا۔ تلے ہوئے کھانوں سے بد ہضمی۔ کھٹی ڈکاروں کے ساتھ سخت تیزابیت۔

ایسٹا اینڈیکا 30 چار گھنٹے بعد

☆ نشہ کرنے اور شراب پینے والوں کا ضعف معدہ یا بد ہضمی۔

نیزم سلف 12x یا 30 چار گھنٹے بعد

- ☆ جوف شکم یا معدے میں گیس یا ریاح کے ساتھ درد۔ زردی مائل بھوری زبان۔ زبان کے کناروں پر دانٹوں کے نشان۔

چینی سلیم 30 چار گھنٹے بعد



☆ کھانے کے فوراً بعد پیٹ میں شدید درد اور کھپاؤ۔

گریٹولا (Gratiola) 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ مسکن ادویات کھانے کے بعد بد ہضمی۔

پوڈو فاللم 30 ' چار گھنٹے بعد  
اعصابی کمزوری سے ہونوالی بد ہضمی کے لئے بائو کیمک کی  
کالی فاس 6x یا 30 بہترین دوا ہے۔

## آلات ہاضمہ / اعضاء ہاضمہ کے زخم

### Peptic Ulcer

(Including gastric of Duodenal ulcers)

اس مرض کی ابتداء میں بد ہضمی کی شکایت ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد قم معدہ میں ایک  
رسولی محسوس ہوتی ہے اور درد ٹیسیں اور جلن ہونے لگتی ہے۔ دبانے یا کھانا کھانے سے یہ درد  
اور زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر تے آتی ہیں۔ جس میں غذا اور کینسر کے ٹکڑے اور خون خارج ہوتا  
ہے۔ سخت قسم کا قبض ہو جاتا ہے۔ پیٹ سخت ہو جاتا ہے۔ بدبو دار ڈکاریں آتی ہیں۔ برہمی  
چبھنے اور چھری کھونپنے کے سے درد ہوتے ہیں۔ مریض روز بروز کمزور و لاغر ہوتا جاتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ معدے سے متعلق مقامات کا حساس پن۔ کمر کے بل لیٹنے اور چلنے سے تیزابیت ہو۔  
معدے میں جلن ہو اور کسی بھی قسم کا کھانا موافق نہ آئے۔ تیزابی بد ہضمی جس سے دل  
میں جلن ہو۔ معدے میں جلن جو بعض اوقات کمر کے کسی خاص حصے میں پہنچے اور گیس  
کی وجہ سے تباؤ ہو۔

کاربوئیج 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ جوف شکم کے پار درد بھری حساسیت۔ معدے میں زخم جس سے خون کا اخراج ہو۔ بارہ  
انگشتی آنت سے کھانا گزرنے کے دوران شدید درد ہو۔  
اورنی تھوکیلیم (Ornithogalum)  
5-10 Q قطرے ' چار گھنٹے بعد



☆ ہر کھانے کے بعد شکم اور معدے میں غیر معمولی تناؤ اور کھنچاؤ۔ کھانے کے بعد معدے میں گڑبڑاہٹ اور پتلے پاخانے آئیں۔

ٹائٹریک ایسڈ 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ معدے میں انتہا درجے کی جلن اور چھین۔ جلن دار گرمی کے ساتھ ورم اور سوزش  
معدہ۔ شدید بے چینی کے ساتھ درد۔ پیاس شدید۔

آرسنک الیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ خالی ڈکاریں۔ کافی کے رنگت کی تے جس میں سیاہ تیزابی مادہ شامل ہو۔ گرمی کے موسم  
میں تکلیف بڑھے۔ مسالہ دار اور تیز کھانوں کی خواہش ہو۔

فاسفورس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ چھینے والے درد جو کہ پسلیوں کے نچلے حصے میں پھیلیں۔ مگرے سانس اور چھوٹے سے  
تکلیف میں اضافہ ہو۔ جلن کے ساتھ پیٹ درد۔ معدے میں گرمی کا احساس۔ میٹھی چیزوں  
کی خواہش جن کو کھانے سے تکلیفات بڑھیں۔

ارجنٹم ٹائٹریکیم 30 یا 200 'چار گھنٹے  
بعد' تین مرتبہ

دیگر اہم ادویات : کالچی کم، سٹینٹی سگریا، سفیلینم،  
پائرو جینم۔

بائیو کیمک کی نیزم 6x بھی مفید دوا ہے۔ دودھ میں ملا چونے  
کا پانی تیزابیت کم کرنے کے لئے بہتر ہوتا ہے۔

# متلی

## Nausea

جی متلانا بذات خود کوئی مرض نہیں ہے بلکہ یہ کسی دوسرے مرض کی علامت اور نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلاً معدہ، جگر، گردوں، انتڑیوں، رحم اور بخار کے امراض میں متلی اور تے ہوتے ہیں۔ جب معدے کی خرابی یا بد ہضمی کی وجہ سے تے آتی ہے تو جی متلانا ہے۔ جبکہ دماغی تے آنے سے پہلے دل نہیں متلانا بلکہ خالی معدہ ہونے کی وجہ سے ابکائیاں آتی ہیں۔ معدے کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے، معدے کے دب جانے، دورے کی سوزش یا تشنج، زیادہ مقدار میں یا نامرغوب یا خراب اور گلی سڑی اشیاء کھانے سے متلی ہوتی اور تے آتی ہے۔ دماغ کے پردوں کی سوزش، دماغ کے ہل جانے، دماغ پر چوٹ لگنے اور دماغ پکڑانے سے بھی متلی اور تے ہوتے ہیں۔ بعض اشیاء کی بو سے بھی نازک مزاج لوگوں کا جی متلانا اور تے آتی ہے۔ بعض اشیاء کی سمیت اور زہر سے بھی متلی اور تے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اصل مرض کی تشخیص اور علاج کے بعد متلی اور تے رفع ہو جاتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ معدے کے آپریشن کے بعد کے لئے۔ مریض تمباکو کی خواہش کرے۔  
شیخی سگریٹ 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ ریڑھ کے مہروں کی تکلیفات کی وجہ سے متلی۔ جب آنکھ بند کرے سر پکڑانے کے ساتھ متلی ہو۔ ذرا سی بھی حرکت کرنے سے متلی۔  
تھیرڈیان 30 'تین گھنٹے بعد'
- ☆ صاف اور گیلی زبان کے ساتھ لگاتار متلی کا احساس۔  
اپی کاک 30 'تین گھنٹے بعد'
- ☆ اوپر کی جانب دیکھنے سے متلی۔ پیاس ندارد۔ گرم کمرے میں تکلیف بڑھے جبکہ ٹھنڈی اور کھلی ہوا میں بہتر ہو۔  
ہلسٹیل 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد'
- ☆ کھانے کے بعد متلی میں کمی ہو۔ خاص طور پر پہلی رگمت اور خون کی کمی والی خواتین کے لئے۔  
لیکنک ایسڈ 30 'تین گھنٹے بعد'

☆ ہاضمہ کمزور ہو۔ دوران حمل اور صبح کے وقت مہلی زیادہ ہو۔

کاربوئیج 30 تین گھنٹے بعد

☆ صبح کے وقت کھانے سے پہلے مہلی ہو۔ کروٹ سے لیٹنے سے، کھانے کی خوشبو یا دیکھنے سے مہلی ہو۔

سیپیا 30 یا 200 تین گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ صبح کے وقت مہلی اور تے۔ کھانے کے بعد الٹی کرنا چاہے لیکن کرنے سکے۔

نکس دامیکا 30 تین گھنٹے بعد

☆ سخت تکلیف دہ مہلی۔ آنکھیں کھولنے سے زیادہ ہو۔ تمباکو کی بو سے اور حرکت کرنے سے مہلی ہو۔

نسیکم 30 یا 200 تین گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ خراب خوراک کی بدہضمی کی وجہ سے مہلی۔ کھانے پینے کے بعد مہلی اور تے زیادہ ہو۔ سخت بے چینی ہو۔

آرسنک الیم، تین گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی سیلیا 30 بھی مفید دوا ہے۔

نوٹ : زیادہ تکلیف کی صورت میں مندرجہ بالا ادویات

علامات کے مطابق آدھا گھنٹہ بعد بھی دی جاسکتی ہیں۔



## ریاح/بادی/ہوا کا بننا

Flatulence (wind formation)

(See Dyspepsia also)

اس مرض میں غذا کے صحیح طور پر ہضم نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں ریح بن جاتی اور اچھارہ ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے ڈکاریں آتی ہیں اور کھنا اور کڑوا مادہ خارج ہوتا ہے۔ سانس کے ساتھ بدبو ہوتی ہے۔ زبان پر میل جم جاتا ہے۔ معدے میں بوجھ اور درد ہوتا ہے۔ سینے میں جلن ہوتی ہے۔ قبض ہو جاتا ہے یا پاخانے آنے لگتے ہیں۔ جی مٹلاتا ہے۔ یہ مرض عام طور پر زیادہ کھانے، ثقیل چیزیں کھانے، دو کھانوں کے درمیان وقفہ کم رکھنے، چبا کر نہ کھانے اور کچی ہکی چیزیں کھانے سے ہوتا ہے۔ ورزش نہ کرنا، رات کو دیر تک جاگنا، جسمانی اور دماغی محنت زیادہ کرنا اور ذہنی پریشانیاں بھی اس مرض کے اسباب ہوتے ہیں۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ اونچی آواز کے ساتھ ڈکاریں۔

ایسٹوڈا، چار گھنٹے بعد

☆ پیٹ میں بڑی گڑگڑاہٹ۔ پاخانہ کی تھوڑی سی مقدار بھی ہوا کی آواز کے ساتھ خارج ہو۔ زبردست ریحیں۔

ایلو سوکشرین (Aloe-Soc) چار گھنٹے

بعد

☆ ہوا اور بہت زیادہ ریح۔ پیٹ میں درد۔ پیٹ ہوا سے بھرا ہو۔ کھانے کی خوشبو سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

کالچی کم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ پیٹ میں اچھارے اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ ریح۔

تھو جا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ اونچی ڈکاریں۔ مٹائیوں کی خواہش۔ ریح خارج ہونے کے باوجود آرام نہ آئے۔ پیٹ



سخت اور اکڑا ہوا۔

☆ ار جشم تاثرکیم 30 چار گھنٹے بعد  
ہر کھائی ہوئی چیز ہوا میں تبدیل ہو جائے۔ ہوا خارج کرنے اور ڈکار آنے سے آرام  
آئے۔ معدے کے اوپری حصے میں ہوا کا اجتماع جس کا اوپر کی جانب دباؤ ہو۔ رات کے  
وقت اور لیٹنے کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو۔

☆ کاربوٹیج 30 چار گھنٹے بعد  
پیلو یا کوکھ کے مقام پر ہوا جمع ہو جائے۔ غصے کے بعد تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے۔  
کیومیلا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
پیٹ اکڑا ہوا اور سخت۔ معدے کا فچلا حصہ زیادہ متاثر ہو۔ ریاخ خارج کرنے یا ڈکار  
آنے کے بعد بہتر محسوس کرے۔ شام 4 تا 8 تکلیف زیادہ ہو۔

☆ لائیکوپوڈیم 30 چار گھنٹے بعد  
گلے سڑے امٹوں کی سی بدبو۔ زبردست ریاخ۔ (بہترین اور معاون دوا)  
سورنیم 30 تین گھنٹے بعد تین مرتبہ  
☆ ضعف معدہ اور ریاخی بد ہضمی۔ ہر کھائی اور پئی ہوئی چیز ہوا یا گیس میں تبدیل ہو  
جائے۔

☆ نکس موسکاٹا 30 چار گھنٹے بعد  
کمزور ہاضمہ۔ ہوا خارج ہونے کے باوجود آرام نہ آئے۔ معدے میں ہوا اور ریاخ کا بڑا  
اجتماع۔ معدہ اکڑا ہوا سخت۔

☆ چائنا 30 چار گھنٹے بعد  
☆ بیٹھے رہنے والے لوگوں کی ریاخی تکلیفات۔ شراب کے اثرات بد۔ قبض۔ پاخانہ کرنے  
کی ناکام کوشش۔

☆ نکس دامیکا 30 چار گھنٹے بعد  
☆ بڑی دیر تک منہ یا مقعد کے ذریعے ہوا خارج نہ ہو۔ ناف کے ارد گرد ہوا یا گیس جمع ہو  
جائے۔

☆ ر-فینس (Raphanus) 30 چار  
گھنٹے بعد

☆ معدے کے اوپری حصے میں کالی مرچ کے ذائقے کی سی جلن کے ساتھ ریاخ جو اوپر کے تک جائے۔

کیسی کم 30' چار گھنٹے بعد  
بائو کیمک کی بائو کبی نیشن نمبر 25 چار گھنٹے بعد دنا مفید  
ہے۔

## ڈکاریں

### Eructations

بد ہضمی اور فم معدہ کی وجہ سے ڈکاریں آتی ہیں۔ دل مٹلاتا ہے۔ بد ہضمی کی وجہ سے ریش یا کھارا پانی منہ میں بھر آتا ہے۔ مریض سخت پریشان اور بے چین ہوتا ہے۔ مریض کو ہلکی اور زود ہضم غذائیں کھانی چاہئیں۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ خراب ذائقہ اور گندے سانس کے ساتھ ڈکاریں۔

ایسڈ کارب 30' چار گھنٹے بعد

☆ بے قاعدہ۔ کھائے ہوئے کھانے کے ذائقے کے ساتھ زبان ایسی سفید جیسے سفیدی سے پیٹ کر دی گئی ہو۔

انٹم کروڈم 30 یا 200' چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ کھانے کے بعد پیٹ میں درد کے ساتھ ڈکاریں۔

ایس نالکرا (Ables nlg) چار گھنٹے بعد

☆ ڈکاریں لیتے ہوئے دقت ہو۔ بے ہوشی سی ہو جائے۔ مثالی کھانے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

ار جشم بائزکم 30 یا 200' چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ سخت تیزابیت کی وجہ سے بدبودار کھٹی اور اونچی آواز والی ڈکاریں۔ گیس خارج ہونے کے بعد اور تازہ ہوا میں بہتر محسوس کرے۔

کاربودج 30 یا 200' چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ خالی ڈکاریں۔ دودھ پینے سے بڑھ جائیں۔ معاون دوا۔

سلفر 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ پکے مسالہ دار، سبز ترکاریاں پھل، کیک، پیسٹیاں اور گوشت سے بنے کھانے کھانے کے بعد ڈکاریں۔ منہ کی خشکی کے ساتھ پیاس ندارد۔

ہلکا ٹیلا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

## غذا/کھانے کی بد ہضمی

### Food Poisoning

اشیاء خوردنوش کچھ عرصہ کے بعد اکثر خراب ہو جاتی ہیں۔ ان میں پھوندی لگ جاتی ہے۔ زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں یا مختلف النوع قسم کے کھانے زیادہ مقدار میں کھائے جائیں تو بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ جی متلانے لگتا ہے۔ چکر آنے لگتے ہیں۔ تے آجاتی ہے اور طبیعت میں سخت قسم کی بے چینی ہوتی ہے۔ عام طور پر تے ہو جانے کے بعد فاسد مادے نکل جانے سے مریض کو سکون ہو جاتا ہے۔ مناسب اور بروقت علامات کے مطابق متعلقہ دوا سے بد ہضمی کی شکایت رفع ہو جاتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ ٹن کے ڈبوں میں بند یا خراب سڑی ہوئی چیزیں کھانے سے بد ہضمی۔ مریض تازہ ہوا کی خواہش کرے اور پٹکھا کرائے۔

کاربووٹج 30 'آدھا گھنٹہ بعد'

☆ تربوز کھانے یا گندہ پانی پینے سے بد ہضمی۔

زنجبیر (Zingiber) 30 'آدھا گھنٹہ

بعد

☆ چاکلیٹ وغیرہ اور مرغن اور گوشت سے بنے ہوئے مسالہ دار کھانے کے بعد بد ہضمی۔

ہلکا ٹیلا 30 'آدھا گھنٹہ بعد'

☆ برف سے بنی ہوئی چیزیں کھانے سے۔ رکھے ہوئے کھانے اور زیادہ گلے ہوئے پھل کھانے سے بد ہضمی۔

آرسنک البم 30 'آدھا گھنٹہ بعد'



## بھوک مرجانا

### Loss of Appetite

اس مرض میں کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا۔ کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے یا بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات مریض کو غذا سے نفرت ہو جاتی ہے یا رغبت کے ساتھ مناسب مقدار میں خوراک نہیں کھاتا ہے۔ عام غذائیں کھانا پسند نہیں کرتا ہے بلکہ مسالہ دار اور چٹ پٹی چیزیں کھانا چاہتا ہے۔

اس قسم کی بیماری بد ہضمی، عصبی کمزوری، شراب نوشی، چائے نوشی اور مرغن غذا زیادہ مقدار میں کھا لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سرطان معدہ یا معدے کے السر کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ بھوک بڑھانے کے لئے ٹانک۔
- ☆ الفلفا 5-10 Q قطرے، چار گھنٹے بعد
- ☆ بھوکا بغیر کھانے کی خواہش کے۔ چائے کے بد اثرات۔ کمزور ہاضمہ۔
- ☆ چائنا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ پیاس ختم ہو جائے اور کھلی ٹھنڈی ہوا کی خواہش کرے۔
- ☆ ہلٹائلا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ شراب اور کافی کے رسیا لوگوں کے لئے۔
- ☆ لیسی تھن (Lecithin) 3x، چار گھنٹے بعد
- ☆ نظام انضام میں بد نظمی کی وجہ سے بھوک مرجائے۔ ذائقہ کڑوا۔ زبان پر خاص طور سے پچھلے حصہ پر میل کی تہ۔
- ☆ نکس وامیکا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ شدید بیماری کے بعد بھوک اڑ جائے۔
- ☆ ہشیاٹا (Gentiana lut) 5-10 Q قطرے، چار گھنٹے بعد
- ☆ کھانے سے نفرت کے ساتھ بھوک میں کمی بیشی۔ مٹی اور تے کھانا ہضم نہ ہونے کی وجہ سے۔
- ☆ فیرم فاس 6x یا 6، چار گھنٹے بعد



☆ کھانے کی خواہش کے ساتھ بھوک مر جائے۔

میزیریم 30' چار گھنٹے بعد

☆ آسانی سے مطمئن ہو جائے۔ کھانے کے چند نوالوں سے ہی بھوک کم ہو جائے۔

لائیکوپوڈیم 30' چار گھنٹے بعد

☆ صبح کے وقت بھوک مکمل طور سے مر جائے لیکن دوپہر کے وقت کھانے کی خواہش بڑھے اور رات کو بھی۔

ایبیس نائگرا (Abies nig) 30' چار گھنٹے بعد

☆ معمولی کھانے کے لئے بالکل رغبت نہ ہو لیکن ناقابل ہضم، تیز مسالے اور مختلف النوع قسم کے کھانوں کی خواہش۔

اگنیشیا 30' چار گھنٹے بعد

☆ زبان پر سفید مادہ جما ہو۔ بے ہنگم سی ڈکاریں۔ ہوا نیچے کی جانب جائے۔

انٹم کروڈم 30' چار گھنٹے بعد

☆ مسلسل کام کرنے کے بعد تھکن سے مکمل طور پر بھوک مر جائے۔ موٹے جسم اور ٹھنڈے مزاج کے مریضوں کے لئے۔

کلیریا کارب 30' چار گھنٹے بعد

علامات کے مطابق متعلقہ دوا کے علاوہ سلفر 30 تین مرتبہ ہر تین گھنٹے کے بعد دینا مفید ہے۔



## اشتها (بھوک)

### Appetite

اس مرض میں بھوک بہت لگتی ہے یعنی بھوک کا ہو کا سا ہوتا ہے۔ ادھر مریض نے کچھ کھایا ادھر تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر بھوک لگ گئی۔ گویا مریض کچھ نہ کچھ کھاتے رہتا چاہتا ہے۔ کچھ نہ کھانے کی صورت میں اس کا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ مریض ست اور نڈھال ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی بھی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔

زیادہ پیٹس کے مریض، معدے کی خراش کی تکلیف میں مبتلا اور جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھوک بہت لگتی ہے۔ بعض امراض سے صحت یابی کے بعد بھی زیادہ بھوک لگا کرتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ بھوک شدید پیاس کے ساتھ۔ میوزک سے بہت زیادہ حساس۔  
ٹرنٹولا ہسپانیہ 30' چار گھنٹے بعد
- ☆ کیڑوں کی وجہ سے بھوک۔ کھانے کے بعد بھی بھوکا محسوس کرے۔  
چائنا 30 یا 200' چار گھنٹے بعد
- ☆ بھوک محسوس کرے لیکن کھانے کی خواہش نہ ہو۔  
رہس ٹاکس 30' چار گھنٹے بعد
- ☆ بھوک بڑھے خصوصاً 11 بجے دن میں۔ کھانے کی کمی کی وجہ سے سر میں درد ہو جائے۔  
سلفر 200' 10 منٹ بعد، تین مرتبہ
- ☆ آسانی سے مطمئن ہو جائے لیکن رات کو بھوک محسوس کرے اور بے وقت کھائے۔  
لائیکو پوڈیم 30 یا 200' چار گھنٹے بعد
- ☆ پیٹ میں درد کے ساتھ بھوک۔ کھانے کے بعد بہتر محسوس کرے۔  
لیکے سس 30' چار گھنٹے بعد
- ☆ بہت زیادہ بھوک۔ مشکل سے ہی مطمئن ہو۔ صبح کھانے سے پہلے مٹی اور تے۔  
سپیا 30' چار گھنٹے بعد
- ☆ دستوں کے ساتھ بھوک۔ اجابت کے بعد بھوک بڑھے۔  
پروٹیم 30' چار گھنٹے بعد
- ☆ ہچکیوں کے ساتھ بھوک۔ گرم کھانے اور مشروبات پسند کرے۔  
چیلی ڈونیم Q یا 6' چار گھنٹے بعد

☆ پورا کھانا کھانے کے بعد جلد ہی پھر خواہش ہو جائے۔

ارجنٹکم میٹلیکم 30 چار گھنٹے بعد

☆ پورا کھانا کھانے کے باوجود پیٹ خالی خالی محسوس کرے۔ مونے اور پلے مریض۔

گلگیریا کارب 200 ہفتہ وار 7 تین

☆ کھانے سے پہلے اور بعد میں بہتر محسوس کرے۔ اچھے قسم کے کھانے کھانے کے باوجود وزن کم ہوتا جائے۔

ایوڈیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ پیٹ بھرا ہونے کے باوجود بھوک محسوس کرے۔ تحریک دینے والی اشیاء کی خواہش کرے۔

شینفی سیکریا 30 چار گھنٹے بعد

☆ بھوک سے بے حال ہو جائے۔ کھانے کے باوجود لاغری محسوس کرے۔ پیٹ میں محسوس ہو جیسے پانی میں تیر رہا ہو۔

ایورٹینم (Abortanum) 30 چار گھنٹے بعد

ہائپو کیمک کی کالی فاس 6x اور نیزم فاس 6x ہر تین گھنٹے بعد  
دینا بھی بہت مفید ہے۔

## تیزابیت

### Acidity

(Hyperacidity gastralgia)

پیٹ کے اندر غیر معمولی تیزابیت جس سے اینٹھن، سیکڑنے والے اور گھن کی طرح کانٹے اور کھانے والے درد ہوں اور شدید جلن ہو اور نسیجنا سخت پریشانی ہو۔ ڈکاریں نہ آئیں۔ سر درد ہو اور قبض وغیرہ ہو جائے۔ اس قسم کی تکلیف کو زیادتی و ترشی یا (Hyperacidity gastralgia) معدے کی تیزابیت کہتے ہیں۔

تیزابیت کے علاج کے لئے درج ذیل ادویات علامات کی مناسبت سے بڑی مفید اور آزمودہ ہیں۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ ہائپروکلورک کی تیزابیت کی زیادتی، کھانے کی ٹال میں شدید جلن، کھجے کی جلن، متلی اور



ٹھنڈ محسوس کرنے کے لئے۔

ایسڈ سلف 30' ہر چار گھنٹے بعد

☆ شدید تیزابیت، کھٹی اور بد ذائقہ ڈکاریں۔

آزورسیکالر 30' ہر چار گھنٹے بعد

☆ آہستہ ہاضمے۔ رتخ یا ہوا خارج ہونے اور ڈکاریں آنے کے باوجود بھی کوئی فرق نہ پڑے۔ باؤ اور ریاخ معدے کے درمیان میں زیادہ جمع ہو جائے۔

چائنا 6 یا 30' چار گھنٹے بعد

☆ زیادہ کھانے یا مسلسل بیٹھے رہنے سے ریاخی بد نظمی اور معدے کی گڑبڑ۔

نکس دامیکا 30' چار گھنٹے بعد

☆ پیٹ میں درد اور ریاخ کا اجتماع۔ کھائے ہوئے کھانے کی بو سے متلی ہو۔

کالچی کم 30' چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ مرغن کھانا کھانے کے بعد پیدا ہونے والی ریاخ کی شکایت جس میں کم پیاس ہو یا بالکل نہ ہو اور کھلی ہوا میں کچھ آرام ملے۔

ہلسائٹلا 30' چار گھنٹے بعد

☆ معدے میں اچھارا۔ جلد کھانے سے جی بھر جائے معدے کے نچلے حصے میں ہوا کا اجتماع۔ شام چار سے آٹھ بجے تک تکلیف میں اضافہ ہو۔

لائیکو پوڈیم 30' چار گھنٹے بعد

☆ خالی پیٹ ضعف معدہ یا بد ہضمی، جس کو کھانے کے بعد کچھ آرام آئے۔

اناکارڈیم 30' چار گھنٹے بعد

☆ رونما ہونے والے واقعات کے احساس سے پیدا ہونے والی گیس۔ میٹھی چیزوں کی خواہش ہو۔

ار جٹم نائٹرکیم 30' چار گھنٹے بعد

☆ مسلسل ڈکاریں۔ زبان پر سفیدی جی ہو۔ جگر میں جلن۔ تیز مسالے اور اچھا وغیرہ کی خواہش۔

انٹم کروڈم 30 یا 200' چھ گھنٹے بعد

☆ آہستہ اور نامکمل ہاضمہ۔ معدے کے اوپری حصے میں شدید قسم کا ریاخی اجتماع۔ ڈکاروں اور اخراج ریاخ کے بعد کچھ آرام محسوس ہو۔

کاربووٹیج 30' چار گھنٹے بعد

☆ تیزابیت جلن دار ڈکاروں کے ساتھ سر میں سامنے یا اگلے حصے میں درد۔ رات کو تکلیف بڑھ جائے۔

روبینیا (Robinia) 30' چار گھنٹے بعد



☆ علامات کے مطابق متعلقہ دوا کے علاوہ۔

سورینم 30، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ  
بائیو کیمک کی نیزم فاس 3x یا 6x ہر تین گھنٹے بعد بچوں کے  
لئے خصوصی طور سے بہت مفید ہے۔

## پیٹ کا درد

### Abdominal Pain

(باؤ گولہ بھی دیکھئے)

پیٹ کا درد اصل میں بد ہضمی کی علامت ہوتا ہے اور اکثر یہ عصبی ہوتا ہے۔ کبھی درد کے شدید دورے ہوتے ہیں اور کبھی مروڑ ہوتا ہے۔ فم معدہ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد درد ہوتا ہے۔ پیٹ میں لٹخ اور مروڑ ہوتا ہے۔ سینے میں جلن ہوتی ہے۔ ڈکاریں آتی ہیں۔ جی متلاتا ہے اور تے بھی ہو جاتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد یا رات کے وقت عموماً یہ درد ہوا کرتا ہے۔ کبھی کبھی پیٹ کا درد معدہ خالی ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور کھانے کے بعد افاقہ ہو جایا کرتا ہے۔

بد ہضمی، قبض اور ثقل غذائیں کھانا اس مرض کے عام اسباب ہیں۔ مستورات کو ایام حمل میں بھی پیٹ درد کی شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ تمباکو نوشی، ذہنی پریشانی، نقرس اور ملیریا کی سمیت دیگر بھی اس مرض کے اسباب ہوتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ پیڑوں میں شدید دکھن ہو۔

دراثرم ورائنڈ 30، ہر تین گھنٹے بعد

☆ درد کے ایک مرکز سے دوسرے حصوں کی جانب درد منتقل ہو۔

ہلمیم میٹلیکم 30، ہر تین گھنٹے بعد

☆ کھانا شکم (پیٹ) میں پتھر کی طرح محسوس ہو، پاخانہ سخت ہو قبض ہو۔ خاموشی سے پرسکون لیٹنے کو جی چاہے۔

برائی اونیا 30 یا 200، دو دو گھنٹے بعد،

تین مرتبہ

☆ پیٹ کے سامنے کے حصے میں درد ہو اور زبان صاف ہو۔

اپنی کاک 30' ہر تین گھنٹے بعد

☆ حلقہ ناف میں شدید درد ہو اور دبانے سے آرام آئے۔

کالوسنتہ 30' ہر تین گھنٹے بعد

☆ شدید قسم کی گیس بنے۔

سی سی فوگا 30' ہر تین گھنٹے بعد

☆ شدید باؤ گولہ 'پھاڑنے والے درد کے ساتھ۔

اگنیسیا 30 یا 200' ہر تین گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ بہت زیادہ ہوا خارج کرنے کے بعد۔ عمدہ خوراک اور مرغن غذا کھانے سے درد ہو۔

ہلساٹلا 30' ہر تین گھنٹے بعد

☆ چپنے والے درد جو کہ حرکت سے بڑھیں۔ ماہواری سے پہلے باؤ گولہ کا درد۔

کالی کارب 30 یا 200' ہر تین گھنٹے

بعد، تین مرتبہ

☆ پیٹ کے اوپری حصے میں درد۔ پاخانہ سخت اور قبض۔

گریفائٹس 30' ہر تین گھنٹے بعد

☆ درد اچانک جسم کے دوسرے حصوں مثلاً "الگیوں اور ٹخنوں میں منتقل ہو اور پیچھے کی

جانب بھٹکنے اور جسم کو کھینچنے سے کم ہو۔

ڈاٹسکوریا (Dioscorea) 30' ہر تین

گھنٹے بعد

☆ زیادہ کھانے کے بعد یا مسلسل بیٹھنے رہنے سے درد۔

نکس وامیکا 30' ہر تین گھنٹے بعد

☆ معدے یا پیٹ کے آپریشن کے بعد درد۔ ضعف معدہ۔

شیفنی سیکریا 30 یا 200' ہر چار گھنٹے

بعد

☆ شدید خشکی درد جس کو گرم چیزیں پینے یا گرم سکاکی سے قائم ہو۔

ہیکٹیسیا فاس 6x یا 30 یا باؤ کئی

نیشن نمبر 30' ہر دو گھنٹے بعد

# اسہال / دست / گیس

loose Motions, gastroenteritis etc

اسہال کے مرض میں چھوٹی انتڑیوں کے فعل میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کے سبب وقفے وقفے سے مختلف رنگوں کے پتے پتے پاخانے آتے ہیں۔ جو کبھی بھاگ دار، نیالے اور کبھی زردی مائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات پاخانے کی مقدار تو زیادہ نہیں ہوتی لیکن بار بار حاجت ہوتی رہتی ہے۔ آنکھوں میں شعلہ ہوتا ہے۔ پیٹ میں موڑ اور دردیں ہوتی ہیں۔ پیٹ میں خف ہو جاتا ہے۔

اسہال کی پانچ اقسام صغراوی، سوزشی یا درمی، خراشدار دست، عصمی دست اور غولی دست ہوتی ہیں۔ صغراوی میں مادہ صغرا یعنی پت خارج ہوتا ہے۔ سوزشی میں آنکھوں میں ہوتی ہے اور پیٹ میں موڑ ہوتا ہے۔ خراشدار میں پیٹ میں خف اور موڑ ہوتا ہے اور بھورے رنگ کے دست آتے ہیں۔ عصمی دست انتڑیوں کے اعصابی مرکز کے ذکی الحس ہونے کی وجہ سے آتے ہیں۔ غولی دست معدے میں زخم اور انتڑیوں میں ورم کی وجہ سے آتے ہیں۔

بد پرکزی، زیادہ کھا لینا، تیز مسالے دار چیزیں کھانا، خراب گوشت، کپے پھل، ٹھیل اور ہائی غذا، مرغن غذا، بیمار جانور کا گوشت اور گلی سزی سبزیاں کھانا اس مرض کے عام اسباب ہیں۔ بکلی اور زرد ہضم غذا کھانا بہترین پرکزی اور علاج ہے۔

## علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ دوران رفع حاجت لگتی۔ کھلی ہو والا دست۔

روم 30 بار کھئے بعد

☆ صبح کے وقت اسہال۔ سخت دھوا کی وجہ سے صبح کو بستر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔

سلفر 30 یا 200 بار کھئے بعد

☆ آنکھوں میں کھجوا کے ساتھ دست۔ بے ہوش کر دینے والی دوا کا پاخانہ۔ معدے میں غلغلہ ہونے کے ساتھ بھوک محسوس کرے۔ زیادہ مقدار میں ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش۔ مٹھی چھڑوں سے لڑتے۔

کلوروماشین (Chloromycetin)

30 بار کھئے بعد

☆ بچوں کے دانت ٹٹنے کے دورانیہ میں دست۔ بہت زیادہ چڑچڑاہٹ۔ نپے کے بعد تکلیف

بڑھ جائے۔

کیومیلا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' چم  
مرتبہ

☆ رات کے وقت زیادہ اسہال۔

☆ سفیلنم 200 'ہفتہ وار' تین مرتبہ  
☆ پاخانہ قابو سے باہر ہو جائے۔ یہاں تک کے ریح خارج کرتے ہوئے بھی پاخانہ نکل  
جائے۔ بستر پر پاخانہ نکل جائے۔

☆ ایلو (Aloe Soc) 30 'چار گھنٹے بعد'  
☆ اچانک دست شروع ہو جائیں۔ بہت زیادہ فکر مندی اور بے چینی کے ساتھ۔ خشک  
ٹھنڈی ہوا لگ جانے سے معدے میں درد ہونے لگے۔  
اکونائٹ 30 یا 200 'آدھا گھنٹہ بعد'

☆ مچھلی کھانے کے بعد دست آنا شروع ہو جائیں۔  
چنی نم آرس (Chin ars) 30 'چار  
گھنٹے بعد'

☆ موٹے اور پلپے لوگوں کے اسہال۔ مزمن دستوں کی بیماری شدید بھوک کے ساتھ۔ تا  
ہضم ہونے والی چیزوں جیسے چاک، کوئلہ پنسل وغیرہ کھانے کی خواہش۔  
کلیریا کارب 200 'چار گھنٹے بعد' چم

☆ کار، بس وغیرہ قسم کی سواری میں بیٹھنے سے دست آنے لگیں۔ نیند کی کمی کی وجہ سے  
تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔  
مرتبہ  
کوکولس انڈیکا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ اگرچہ اسہال کافی عرصہ تک جاری رہیں لیکن کمزوری نہ ہو۔  
ایسڈ فاس 6 یا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ بغیر درد کے بہت زیادہ کمزوری کے ساتھ پانی کی مانند پتے دست۔ پیاس زیادہ۔ تمام جسم  
پر پسینہ۔ تازہ ہوا کی مسلسل خواہش۔ معدہ میں اچھارا۔  
چائنا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ رونما ہونے والے واقعات سے فکر مندی یا جذباتی ہونے کی وجہ سے دست آئیں۔  
بلاوج کے وہم اور خوف کی وجہ سے دست شروع ہو جائیں۔  
بیلی میم 30 'چار گھنٹے بعد'



☆ اہلا ہوا دودھ پینے کے بعد اسال لگ جائیں۔

سیپا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ چکٹائی دار بھاری کھانے کھانے کے بعد دست۔ پیسٹری اور غیر سبزی وغیرہ کے متفرق کھانوں سے دست شروع ہوں۔ دستوں کی رنگت اور بناوٹ میں مسلسل فرق ہوتا رہے۔ رات کے وقت تکلیف بڑھے۔ خشک منہ کے ساتھ پیاس نہارد۔

ہلساٹلا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ شدید قسم کے دست۔ معدے اور نچلے حصے میں درد۔ جسم ٹھنڈا پڑ جائے۔ ہتے اور سفید دست۔

دراڑم الہم 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ پاخانہ بڑی تیزی کے ساتھ جیسے کسی نلکے سے زوردار طریقے سے پانی نکلے۔ گرم پانی پینے سے بہتر محسوس کرے۔

کروٹن ٹیگم (Croton tig) 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد'

☆ شدید درد کے ساتھ اسال۔ دوہرا ہو جائے۔ دبانے سے بہتر محسوس کرے۔ غصے کے بعد تکلیف بڑھے۔

کالوسنتہ 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ کینفر خاص طور پر مقعد کے کینفر کی وجہ سے دست۔

کارڈس مرانٹس (Carduus m) 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ مقعد میں ٹھنڈا پن۔ پاخانہ کرنے سے پہلے شام 4 سے 8 تک تکلیف زیادہ ہو۔

لائیکوپوڈیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ سبزی مائل پاخانہ۔ چھوٹے بچوں میں دودھ ہضم کئے بغیر نکل جائے۔

میکنسیا کارب 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ شدید بے چینی کے ساتھ۔ پیاس بہت زیادہ۔ تھوڑا سا پانی پئے لیکن وقفے وقفے سے پانی طلب کرے۔ کھانے سے بد ہضمی۔ رکھے ہوئے کھانے اور ٹھنڈے کھانوں سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

آرسنک الہم 30 'تین گھنٹے بعد'

☆ دن کے وقت دست اور رات کو کھانسی جلدی بیماریوں کے دب جانے کے بعد۔

پٹرولیم 30، چار گھنٹے بعد

☆ تربوز کھانے اور ندی نالوں کا گندہ پانی پینے سے اسال۔

زنجبیر (Zingiber) 30، چار گھنٹے بعد

☆ زیادہ مقدار میں سالہ دار اور بھاری کھانے کھانے سے دست۔ دودھ برداشت نہ کر سکے۔

نکس دامیکا 30، چار گھنٹے بعد

بائیو کمک کبی نیشن نمبر 8 تین گھنٹے بعد دینا بھی بہت فائدہ

مند ہے۔

## پچیش

### Dysentery

(See Colitis also)

پچیش کا مرض ایک باریک کیرے ایسا ڈی سنٹریائی کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ یہ جراثیم انڈے اور زندہ جراثیم کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یہ کیرا بذریعے پانی یا غذا آنتوں میں پہنچ کر پچیش کا مرض پیدا کرتا ہے۔ کھیاں بھی اس مرض کو پھیلاتی ہیں۔ اس بیماری میں بڑی آنتوں میں درم اور اندرونی سطح پر زخم ہو جاتے ہیں جس سے بار بار مروڑ اور درد کے ساتھ پاخانے آتے ہیں۔ اس مرض میں صرف آنوں یا خون کی آمیزش والی آنوں آتی ہے۔ بعض اوقات بخار بھی ہو جاتا ہے۔ پاخانہ کرتے ہوئے مریض کو بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی آنتوں میں کوئی مادہ پھنسا ہوا ہے۔ بعض اوقات پیٹ میں سدے بن جاتے ہیں اور ان کی گولیاں خارج ہوتی ہیں جنہیں خارج کرنے کے لئے مریض کو بہت زور لگانا پڑتا ہے۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کمپ میں زندگی گزارنے والے یا ہجرت کرنے والوں میں پچیش۔

سپیسیم (Septicimin) 30 یا

200، تین گھنٹے بعد، چھ مرتبہ

☆ اموبیا جراثیم کی وجہ سے پچیش۔ تھوڑے وقفے سے گھونٹ گھونٹ پانی پینے کی پیاس۔

آرسنک الہم 30، چار گھنٹے بعد

☆ رفع حاجت کرتے ہوئے رانوں سے نیچے کی جانب ٹانگوں میں جانحوالے درد کے ساتھ پیش۔

روہس ٹاکس 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ پانی کی طرح پتلے زردی مائل خون آلود یا بلغم اور آنوں والے پاخانے۔

ایگل فولیا (Aegle folia) Q یا 6

چار گھنٹے بعد

☆ ہر دفعہ ٹھنڈا پانی پینے سے جاڑا لگے اور جلدی سے رفع حاجت کی ضرورت پیش آئے۔

سیسکم 30 یا 0/5 یا اس سے اوپر کی

طاقت چار گھنٹے بعد

☆ تبدیل ہونے والے جراثیم والی پیش جس میں مٹلی بھی ہو اور زبان صاف ہو۔

اپی کاک 0/5 یا اوپر کی طاقت

پندرہویں روز چھ مرتبہ

☆ جراثیمی پیش۔ پاخانے میں خون۔ آنٹوں کی کمزوری۔ رفع حاجت کرنے کے بعد ایسا محسوس ہو کہ حاجت باقی ہے یا پورے طور پر اجابت نہیں ہوئی ہے۔

مرکیورس کار 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ رطوبت بلغم یا آنوں والے پاخانے۔ رات کے وقت زیادہ آئیں۔

مرکیورس سال 30 چار گھنٹے بعد

☆ مزمن پیش جبکہ منتخب ادویات بھی موثر نہ ہوئی ہوں۔ صبح کے وقت تکلیف بڑھے۔

سلفر 200 چار گھنٹے بعد تین مرتبہ

☆ کھنی ڈکاروں کے ساتھ بد ہضمی۔ چائے اور سگریٹ نوشی کے سبب بھوک مر جائے۔

تھوک کثرت سے آئے۔ منہ کا ذائقہ کڑوا۔ زبان بھوری۔ ریح اور بادی معدے کے کھپاؤ

کے ساتھ۔ پتلے پاخانے رطوبت ملے۔ کھانے کے بعد رفع حاجت کی ضرورت۔ رات کے

وقت تکلیف بڑھ جائے۔

ٹرمی نیلیا شیولا

30 (Terminalia Chebula)

چار گھنٹے بعد

☆ تبدیل ہونے والے جراثیمی پیش کے لئے معاون دوا۔

تھوجا 200 یا 1M پندرہویں روز چھ

مرتبہ

☆ مزمن پچش جس میں خون اور پیپ بھی خارج ہو۔

سٹیفائیلو کوکسین (Staphlococcin)

200 یا 1M پندرہویں روز، تین مرتبہ

☆ شدید درد جیسے چاقو سے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ عام پاخانے کی بجائے خالص خون کا اخراج۔ مریض ایسا محسوس کرے کہ مقعد کا منہ کھل گیا ہے۔

فاسفورس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ جراثیمی پچش کے لئے معاون دوا۔

سٹرپٹوکوکسین (Streptococcin)

200 یا 1M پندرہویں روز، چھ مرتبہ

☆ رطوبت یا آنوں کی بہت زیادہ مقدار۔ معدے میں گڑگڑاہٹ کے ساتھ درد رفع حاجت کے بعد پاخانہ غیر محسوس طریقے سے نکل جائے۔

ایلو (Aloe Soc) 30 چار گھنٹے بعد

بائیو کبی نیشن نمبر 9 پچش کے لئے بہترین دوا ہے۔





# قبض

## Constipation

اس مرض میں پاخانہ سخت موٹا، خشک، مقدار میں تھوڑا، بدبودار اور سیاہ رنگت کا ہوتا

ہے۔ پاخانے کے سخت ہونے کی وجہ سے رفع حاجت کے وقت مریض کو بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ پاخانہ بڑی مشکل سے خارج ہوتا ہے۔ بعض اوقات پاخانے میں خون یا آنوں بھی آتی ہے۔ پیٹ میں اچھارا ہو جاتا ہے۔ فضلا کے انتڑیوں میں رکے رہنے کی وجہ سے رتخ پیدا ہوتی ہے۔ مریض کا دل زیادہ دھڑکتا ہے۔ وہ ست اور چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اکثر سردرد کی شکایت رہتی ہے۔ خاص طور پر سر کے پچھلے حصے میں درد ہوتا ہے۔ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مریض کے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ رنگت زرد ہو جاتی ہے۔

مردوں کی نسبت مستورات اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ سبزیاں کم کھانا، خشک اور قلیل غذا کھانا، چائے زیادہ پینا، سگریٹ اور حقہ پینا، شراب زیادہ پینا، ترش اشیاء کھانا اور ورزش نہ کرنا اس مرض کے عام اسباب ہیں۔

بواسیر، موٹاپا، بعض عصبی امراض اور امراض رحم بھی اس مرض کے اسباب ہو سکتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ مریض صرف کھڑے ہو کر رفع حاجت کر سکے۔

کاشی کم 30 یا 200 چم گھنٹے بعد

☆ مزمن دائمی قبض۔ بہت زیادہ ریاخ بنے۔ معدے میں کھپاؤ پیدا ہو۔

کوکا 10 Q قطرے نیم گرم پانی میں چم

گھنٹے بعد

☆ بہت زیادہ سخت پاخانہ۔ خشک جلے ہوئے کی مانند لبا بندھا ہوا۔ اجابت کی خواہش نہ

ہو۔ پیاس بڑھی ہوئی۔ لمبے وقفے کے بعد زیادہ مقدار میں پانی پئے۔

برائی اونیا 30 یا 200 چم گھنٹے بعد

☆ زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنے والے لوگوں کا قبض۔ رفع حاجت کی غیر موثر خواہش۔ دن

میں کئی مرتبہ اجابت کی کوشش کرے۔

ٹکس وامیکا 30 یا 200 چم گھنٹے بعد

☆ معدے میں ڈوبنے کے سے احساس کے ساتھ۔ زبان پلپلی سی۔ سفید اور پتلی زبان۔

ہائیڈراسس چار گھنٹے بعد

☆ انتڑیوں کی خشکی اور آنتوں کے راستے کے بے عمل ہونے کی وجہ سے سخت پاخانہ۔  
خشک کھانوں کی خواہش۔

☆ لیو منا 0/7 یا اس سے اوپر، چھ گھنٹے بعد  
☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والے مریض جن میں قوت حیات کی کمی ہو۔ پاخانہ مقعد میں واپس  
لوٹ جائے جبکہ کچھ حصہ خارج ہو جائے۔

☆ سلیسیا 12x یا 30، چار گھنٹے بعد  
☆ ایسے مریض جو قبض کی کیفیت میں بہتر محسوس کریں۔ موٹے پلپے اور سرد مزاج لوگ۔  
کلیریا کارب 200، چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ آنتوں کی مناسب حرکت و عمل کے لئے ٹانک کے طور پر۔  
کاسکرا سگراڈا (Cascara Sag)

10-10 قطرے، چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کا کمبیشن نمبر 4 قبض کے لئے مفید دوا ہے۔  
مذکورہ دواؤں کے علاوہ سلیئم، سلفر، گریفائٹس، اوجیم، میگنسیا  
کارب بھی فائدہ مند ادویات ہیں۔



## قے/الٹیاں

### Vomiting

قے کسی مرض کی علامت ہوتی ہے۔ بعض قسم کے بخاروں میں بھی مہلی اور قے ہوتی ہے۔ عام طور پر معدے کی تکلیفات یا بد ہضمی کے سبب مہلی اور قے ہوتی ہے۔ جگر، انتڑیوں یا گردوں کی بعض تکلیفات کی وجہ سے بھی قے آتی ہے۔ بعض دفعہ بدبو، بد مزہ چیزیں کھانے یا سوچنے سے بھی مہلی اور قے ہو جاتی ہے۔ بعض دماغی امراض کے سبب بھی قے آتی ہے۔ ریل، جہاز یا گاڑی کے سفر سے بھی مہلی اور قے ہوتی ہے۔ حاملہ خواتین کو بھی مہلی اور قے ہو جاتی ہیں۔ غیر مرغوب اور ضرورت سے زیادہ کھانے اور صبح طور پر ہضم نہ ہونے کی وجہ سے بھی مہلی اور قے ہوتی ہے۔ بد ہضمی سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ معدے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ سینے میں جلن ہوتی ہے۔ منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ بد ہضمی کی وجہ کھانے میں بے اعتدالی، تیز مسالہ جات کا استعمال، بے وقت کھانا، چائے نوشی، شراب نوشی، زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانا، ثقل کھانا، بیٹھے رہنا وغیرہ مہلی اور قے کے عمومی اسباب ہیں۔ مرض کے اصل اسباب معلوم کر کے علاج کیا جائے تو جلد صحت یابی ہوتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ شدید قسم کی مہلی کے ساتھ قے اور الٹیاں۔  
نہاکم 30، دو گھنٹے بعد
- ☆ مسلسل مہلی اور صاف زبان کے ساتھ قے۔  
اپنی کاک 30، دو گھنٹے بعد
- ☆ دوران حمل قے۔ مہلی اور قے۔ زیادہ کھا لینے کی وجہ سے قے آئے۔ صبح کے وقت مہلی اور قے کی تکلیف۔  
نکس دامیکا 30 یا 200، دو گھنٹے بعد
- ☆ ابکائی اور موت کا خوف۔ شدید اور مسلسل پیاس وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی پئے۔  
پیٹ میں جلن دار درد کے ساتھ الٹیاں لگیں۔  
آرسنک البم 30، دو گھنٹے بعد
- ☆ پکنے پانی کے ساتھ خوراک کی شدید قے، جس میں ٹھنڈے پسینے آئیں اور چہرے کی کیفیت کریٹک ہو جائے۔  
دراژم البم 30، دو گھنٹے بعد

☆ کھانے کے ایک گھنٹہ بعد کھٹی تے۔ شراب پینے کے بعد کی تے۔

کالی ہالی کروم 30' دو گھنٹے بعد

☆ دوران حمل تے اور مٹی۔ چہرہ لٹھڑے پسینے سے نما جائے۔ منہ سے رال ہونے لگے۔ سانس بند ہونے لگے۔ نقاہت ہو۔

لو۔ یلیا انفلینزا 30' دو گھنٹے بعد

☆ شدید قسم کی ابکائیاں اور درد۔ پانی معدے میں نیچے پہنچتے ہی تے ہو جائے۔ البتہ خوراک کچھ دیر تک معدے میں رہے۔ تے کا مواد زور سے خارج ہو۔

سمتہ 30' دو گھنٹے بعد

☆ بغیر ہاضمے کے کھایا پیا نکل جائے۔ خوراک دن بھر معدے میں رہے۔ رات کو غیر ہضم شدہ خوراک کی تے ہو جائے۔

فیرم میٹ 30' دو گھنٹے بعد

☆ کھانے کے پکنے کی خوشبو سے مٹی اور تے۔ گوشت، مچھلی اور انڈے کی خوشبو برداشت نہ کر سکے۔

کالچی کم 30' دو گھنٹے بعد





## ہیضہ

## Cholera

ہیضے کا مرض جھوٹ سے پھیلتا ہے۔ ہیضے کے جراثیم گندے پانی اور اشیاء خوردنی کے ذریعے تندرست آدمی کے معدے میں پہنچ کر پیٹ میں درد، تے اور دستوں کا سبب بنتے ہیں۔ مریض کو التیاں لگ جاتی ہیں۔ چاولوں کی پیچ کی مانند دست آتے ہیں۔ آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں۔ چہرہ پر مردنی چھا جاتی ہے۔ جسم سرد پڑ جاتا ہے۔ مریض سرد پینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ نبض نہایت کمزور اور باریک ہو جاتی ہے۔ پیاس شدید اور بے چینی ہوتی ہے۔ پیشاب بند ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے۔ تنگی نفس اور ہڈیانی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں اٹھنے لگتے ہیں۔ پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے۔ جسم سے تے اور دستوں کے ذریعے پانی خارج ہونے کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور دوران خون ست ہو جاتا ہے۔ نیم بے ہوشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اگر اس مرض کا بروقت اور صحیح علاج نہ کیا جائے تو مریض کا انجام موت ہوتی ہے۔

ہاضمے کی خرابی، کچے گندے اور سڑے ہوئے پھل کھانا، خراب گوشت اور مچھلی کھانا، تربوز، کھیرے، گلزیاں اور خربوزے وغیرہ بہت زیادہ کھا لینا، باسی اور نیم پختہ مرغن اشیاء، ملائی دار برف اور قلعی زیادہ مقدار میں کھا لینا وغیرہ اس مرض کے عام اسباب ہیں۔ کنوئیں، چشمے اور تالاب سے گندہ پانی پی لینا اس مرض کا بڑا سبب ہوتا ہے۔ جس میں اس مرض کے جراثیم پائے جاتے ہوں۔

## علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ احتیاطی دوا حفظ ماتقدم یا مانع مرض کے طور پر۔

کوپریم میٹلیکم 200 اور ورائزم الیم  
200 جب تک وبا ختم نہ ہو جائے کیے  
بعد دیگر ہفتہ وار

☆ ہیضے کی سب سے اعلیٰ دوا۔ جبکہ اندرونی معدنک کے ساتھ جسم بھی معدنڈا پڑ جائے۔  
کمفر Q یا 30، آدھا گھنٹہ بعد

☆ بدبودار پتے سبزی مائل زرد رنگ کے اسال (دست)

پوڈو فالٹم 30، آدھا گھنٹہ بعد

☆ جب پیسنے کے ساتھ سخت کھانسی بھی شروع ہو جائے۔

اسپیڈ نیچا 30' آدھا گھنٹہ بعد

☆ گھنٹے مشروبات کی خواہش۔ سخت قسم کا درد قویج اور درد خاص طور پر ناف کے ارد گرد۔ اجابت کے بعد مریض ایسا محسوس کرے کے مقعد چوڑا ہو گیا ہے یا کھلا رہ گیا ہے۔

فاسفورس 30 یا 200' آدھا گھنٹہ بعد

☆ جب جسم ٹھنڈا پڑ جائے۔ سانس میں کمزوری اور مشکل سے سانس آئے۔ مریض ہلکا کرانا چاہے۔

کاربودیج 30' آدھا گھنٹہ بعد

☆ پاخانے چاؤل کی پیچ کی طرح سفید۔ گھنٹے پیسنے۔ ناقابل قابو ابکائیاں۔ الکیوں میں تھکا اور کھچاؤ کے ساتھ۔

ورائزم البم 30' آدھا گھنٹہ بعد

☆ تمام جسم میں جلن کا احساس۔ سخت بے چینی۔ سانس لینے میں بڑی دقت۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوڑے تھوڑے پانی کی خواہش۔ سخت کمزوری حالت نزع کی سی۔ آرسنک البم 30' آدھا گھنٹہ بعد

☆ جب شدید قسم کی مہلی اور تے ہو اور گھنٹے پیسنے آئیں۔

ٹاکم 30' آدھا گھنٹہ بعد

☆ جب پیسنے کی علامات کے ساتھ اونچی آواز والی جان لیوا قسم کی شدید کھانسی بھی ہو۔

سکوتا (Cicuta V) 30' آدھا گھنٹہ بعد

☆ جسم ٹھنڈا اور نیلا پڑ جائے۔ دستوں کے ساتھ ساتھ تشنج بھی ہو۔ اعصاب کھینچنے لگیں۔ جب معدے اور پیسنے کے اعصاب اور پنوں میں نیچے کی جانب سے اوپر کو تشنج اور کھچاؤ شروع ہو۔

کوپرم میٹلیکم 30' آدھا گھنٹہ بعد

☆ جب التیاں بند ہو جائیں البتہ دست جاری رہیں۔ اعصاب برف کی طرح گھنٹے ہوں لیکن مریض ان کو ڈھکنا بند نہ کرے۔ مہلی اور تے سے زیادہ ابکائیاں آئیں۔

سکالے کار 30' آدھا گھنٹہ بعد

بائیو کیمک کی بیکیٹیا فاس 6x فیرم فاس 12x کالی میور 6x

نیوزم سلف 12x کالی فاس 6x اور نیوزم میور 12x آدھا آدھا

گھنٹہ بعد دینے سے بھی بہتر نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

مرض کی شدت کی حالت میں مندرجہ بالا ادویات میں سے علامات کے مطابق 200 یا اس سے زیادہ کی طاقت میں مختصر وقفے کے بعد بھی دی جاسکتی ہیں۔

## بچوں کا ہیضہ

### Cholera Infantum

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ دست کھانسی کے ساتھ۔ پاخانہ سنہرا پیلا۔ مریض برف کی مانند ٹھنڈے مشروبات کی خواہش کرے۔

فاسفورس 30، آدھا گھنٹہ بعد

☆ جب دستوں میں واضح کھٹی قسم کی بدبو ہو۔

رہیوم 30، آدھا گھنٹہ بعد

☆ جب ذرا ذرا سے پانی کی بار بار خواہش یا پیاس ہو۔ مٹی اور تھے جلدی جلدی پاخانوں کے ساتھ۔ سخت بے چینی۔

آرسنک الیم 30، آدھا گھنٹہ بعد

ان کے علاوہ مندرجہ ذیل ادویات بھی دی گئی طاقت میں مفید ہیں۔

1- تیموزا 30، انٹم کروڈ 30، کلیریا فاس 6x یا 30، کیموٹا 30

چائنا 30، اوپیم 30 یا 200، فاسفورس 30، پوڈوفالیم 30

وغیرہ۔





## مقعد کا سرک جانا/ کالچ نکلنا

### Rectum Prolapsus

اس مرض میں ابتداً "تو رفع حاجت کے وقت ہی کالچ نکلتی ہے لیکن آہستہ آہستہ مقعد کا عضلا اتنا ڈھیلا ہو جاتا ہے کہ زور کا کام کرنے، کھانسنے، زیادہ دیر کھڑے رہنے اور ہنسنے تک سے بھی کالچ نکل آتی ہے اور اجابت کے وقت سخت درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات کالچ پر زخم بھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ پانچ اور چھ انچ لمبی ہوتی ہے۔ یہ مرض زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار بڑے بوڑھے بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ معاون دوا۔

سلفر 200 یا 1M '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ رفع حاجت کرتے ہوئے اور اس سے پہلے۔ یکے بعد دیگر قبض اور دست۔

پوڈو فاللم 10M یا 50M 'پندرہویں

روز، تین مرتبہ

☆ ایسے بچے جن کو ٹھنڈ لگنے کی رغبت اور قبض ہو۔

ہائیڈرا سٹس 30 'چار گھنٹے بعد

☆ پیشاب کرتے ہوئے مقعد سرک جائے۔ مسوں کی وجہ سے خاص طور پر بچوں کے لئے۔

میورک ایسڈ 30 'چار گھنٹے بعد

☆ مقعد سرک جائے۔ پتلے اسہال ہونے کی صورت میں زیادہ تکلیف ہو۔

اگنیسیا 200 یا 1M '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ بواسیر کی تکلیف میں مبتلا مریض۔ رفع حاجت کے بعد مقعد سرک جائے۔ کمر میں ہلکا سا

درد ہو۔

ایسے کولس ہپ 30 'چار گھنٹے بعد

☆ معدے کے درم، سکڑن اور اکڑاہٹ کے ساتھ مقعد کا سرک جانا۔

مرکبوس سال 30 'چار گھنٹے بعد



☆ مقعد کے سرکنے کے بعد اسہال شروع ہو جائیں۔

بٹلاڈونا 30، چار گھنٹے بعد

☆ ایسے مریض جو زیادہ بیٹھ کر وقت گزارتے ہوں اور حرارت پیدا کرنے والی اشیاء پیتے اور کھاتے ہوں۔ مثلاً "کافی اور شراب وغیرہ۔"

نکس دامیکا 30 یا 200، چھ گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی کلکیریا 12x چار گھنٹے کے وقفے سے دینا بھی بہت فائدہ مند ہے۔

دیگر ادویات : لائیو یوڈیم، کلکیریا کارب اور ٹوبرکولینم وغیرہ۔



# کرم/کیڑے

## Worms

پیٹ کے کیڑوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں سے کچھ ملپ (Round worm) خون چوسنے والے (Hook worms) چمکنے والے (Pin worms) اور کدو کیڑے (Tape worms) زیادہ اہم ہیں اور عام طور پر یہ بچوں میں پائے جاتے ہیں۔ کدو کیڑے زبان خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کا اخراج مشکل سے ہوتا ہے۔ زمین پر کھیلنے، ننگے پاؤں پھرنے اور گندے ماحول میں رہنے کی وجہ سے معدے میں مختلف قسم کے کیڑے پرورش پاتے جاتے ہیں۔ بہت سے بچے مٹی کھاتے ہیں۔ مٹی کے ساتھ ملپ کے انڈے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ کھیاں بھی کیڑوں کے انڈے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں وہ کھانے کی چیزوں پر بیٹھ کر ان انڈوں کو پھوڑ جاتی ہیں اور اس طرح کھانے کی اشیاء کے ساتھ انڈے پیٹ میں پہنچ کر بچے پیدا کرتے ہیں۔ مریض کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اکثر مٹی اور تے اور اکیاں آنے لگتی ہیں۔ مریض کمزور ہوتا جاتا ہے کیونکہ غذا جزو بدن نہیں بنتی ہے۔ بہت سے بچوں کو سوکھیا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔

احتیاطی تدابیر : بچوں کو میدانوں اور گھر کے صحن میں پاخانہ نہ کرنے دیا جائے۔ مہزی اور پھل کو اچھی طرح دھو کر کھایا جائے۔ بچوں کو مٹی کھانے سے منع کیا جائے۔ ناخن نہ بیٹھنے دیے جائیں۔ کھانے سے پہلے بچوں کے ہاتھ صابن سے دھلوائے جائیں۔ مجموعی طور پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ کیڑوں کی بہترین دوا۔ علاج شروع کرنے کے لئے۔

سانا 1M چدرہ منٹ بعد، تین مرتبہ۔  
سینو ٹائن 3x، نیلرم قاس 6x، دوسرے  
دن سے دونوں دوائیں 10x مرتبہ ایک  
پہلے تک یا ضرورت کے مطابق دی  
جائیں

☆ ہارک کیڑوں کے لئے۔

ایر فٹنیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ کدو کیڑے (Tape worms) کے لئے جن کی وجہ سے بھوک زیادہ لگے۔

☆ انتھیرم (Anantherum) 30' چار گھنٹے بعد

☆ کیڑوں کی وجہ سے مریض (بچہ) دانت رگڑے یا دانت پیسے۔ معدے میں کھپاؤ ہو اور درد بھی۔ کھانے کے بعد تکلیف بڑھ جائے۔ مقعد کے ارد گرد جلن ہو۔ رات کے وقت غیر ارادی طور پر پیشاب خارج ہو جائے۔ میٹھی چیزوں کی خواہش ہو۔

☆ امبیلیا رائبس (Embilia Ribes) Q یا 30' چار گھنٹے بعد

☆ چونوں/چرنوں (pin worms) کے لئے۔

☆ ٹیوکریم (Teucrium V) 30' چار گھنٹے بعد

☆ جب کیڑے پیڑو پر ریگتے ہوئے محسوس ہوں اور اندام نہانی میں چلے جائیں۔ اور مٹھ نئی/رگڑنے کی خواہش کے لئے ابھاریں۔

☆ کیلیڈیم 30' چار گھنٹے بعد

☆ خون چوسنے والے (Hook worms) کے لئے۔

☆ چینو پوڈیم Q یا 6' چار گھنٹے بعد

☆ معاون دوا۔

☆ سلفر 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ بائیو کیمک کی نیزم فاس 6x اور کالی میور 6x بھی مفید ادویات ہیں۔



## بواسیر خشک سے

Piles-dry

Haemorrhoids

بواسیر کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ (1) اندرونی یا خونی بواسیر جس میں اندرونی مسوں سے خون آتا ہے۔ (2) بیرونی بواسیر۔ اس میں خون نہیں آتا البتہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ اس مرض میں مقعد کے اندر اور اعضاء زیریں کے منہ پر سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن میں خون جمع رہتا ہے۔ مے مٹر کے دانے سے لے کر اخروٹ تک جیسے موٹے ہو سکتے ہیں۔ ان مسوں کی وجہ سے مقعد میں جلن، خارش، بوجھ اور درد ہوتا ہے۔ رفع حاجت کے وقت مریض سخت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ درد اور خون بہنے کے خوف سے مریض رفع حاجت سے گریز کرتا ہے جس سے قبض ہو جاتا ہے اور پاخانہ سخت ہونے کی وجہ سے مسوں میں رگڑ سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خون کی کبھی پاخانہ میں آمیزش ہوتی ہے اور کبھی کبھی قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے اور کبھی بہت مقدار میں اور تیزی کے ساتھ خون بہتا ہے۔ جس کے خوف سے مریض کو غش پڑ جاتا ہے۔ رنگ زرد ہو جاتا ہے اور مریض سخت کمزور ہو جاتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ سب سے اعلیٰ دوا۔ مقعد کی جلن اور چھین کے لئے جبکہ نظر نہ آنے والے یا خون والے سے ہوں۔

سلفر 200 یا 1M پندرہویں روز، تین

مرتبہ

☆ ہر پاخانہ کے بعد انگور کے پتھوں کی طرح سے باہر کو نکل آئیں۔ ٹھنڈے پانی سے کچھ سکون اور افادہ ہو۔

ایلو سوک 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ جلن دار درد والے سے۔ کوئی گرم چیز لگانے سے اضافہ ہو۔

آرسنک الیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ بیٹھے رہنے کی وجہ سے مے ہو جائیں۔ قبض ہو۔ جلدی جلدی اجابت کی ضرورت پیش



آئے اور مقعد میں جلن اور چیرنے والے درد ہوں۔ دماغی صحت اور تھکاوٹ کے بعد اور کھانے کے بعد بھی تکلیف میں اضافہ ہو۔

نکس دامیکا 30 چار گھنٹے بعد

☆ جب بھی مریض پیشاب کرے تو سے نکل آئیں۔

برٹا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ کمر کی ٹکونیہ ہڈی کے مقام پر درد کے ساتھ سے۔ ایسے محسوس ہو کہ مقعد میں بہت سی کھپیاں بھری ہوئی ہیں یا ایسے کہ کوئی کھٹل رہی رہا ہو۔

ایسی کونس ہپ 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ مقعد میں سے ہوں یا پاخانہ کی تالی میں کوئی اور تکلیف ہو جس سے چلنے پھرنے سے ناقابل برداشت تکلیف اور درد ہو۔

کاشی کم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ مقعد میں سے اور پاخانے کے بعد مقعد سرک جائے یا نیچے کو گر جائے یا باہر کو نکل آئے۔

پوڈو فائلم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ پیاز کی طرح کے گول سے جن کی رنگت پیازی ہو۔ مقعد میں ہتھوڑے سے لگنے والے ٹپکن والے درد یا جھپن۔

لیکے سس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

چھ مرتبہ

☆ زبان پر سفیدی سی جھی ہو۔ مسوں یا مقعد سے رطوبت خارج ہو۔

انٹی مونیم کروڈم 30 یا 200 ہفتہ وار

تین مرتبہ

☆ خون بننے کے ساتھ باہر کو نکلے ہوئے سے درم آلود۔ اس کے باوجود کہ پاخانہ قبض سے نہ ہو مریض ہوا بننے سے سخت پریشان ہو۔ سے کپڑے تک کا لگنا برداشت نہ کر سکیں اور ذرا سا چھوئے جانے سے بھی شدید تکلیف ہو۔

ایسڈ میور 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ مسوں میں ایسا محسوس ہو کہ ان میں کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ مقعد میں سوجن اور درم

ہو۔ مقعد کے منہ پر لمبی شکل کا پھوڑا یا زخم۔ مسلسل بننے کی وجہ سے مقعد گیلا سا رہے۔

پایونیا Q یا 6 چار گھنٹے بعد

☆ مقعد بھیگا ہوا سا ہو۔ مقعد کے کنارے پر پھنسیاں پھوڑے اور درد جس کے گرد چپے سے ابھار ہوں۔ کھینچنے اور پھاڑنے والے دردوں کے ساتھ جلن اور کھچاؤ تباؤ محسوس ہو۔

تھو جا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ مقعد میں غیر معمولی اور گہرے پھوڑے پھنسیاں۔ اجابت کے بعد شدید چھین اور تکلیف جیسے مقعد اور پاخانے کی نالی میں شیشے کی کڑیاں بھری ہوں۔ مقعد میں اتنی شدید گرمی اور درد کہ مریض ایک لمحے کو بھی سکون محسوس نہ کرے۔ مقعد کے منہ یا سوراخ میں کھچاؤ اور تباؤ۔

رہینا 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ مسوں میں ایسا محسوس ہو کہ مقعد میں سرخ گرم لوہا ٹھونس دیا گیا ہو۔

کالی کارب 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ مسوں میں چھین اور جلن دار درد جن کو ٹھنڈی چیز لگانے سے افاتہ ہو۔

ایس ملیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

بائیو کیمک کی ٹکلی یا فلور 12x بھی مفید دوا ہے۔



# ہرنیا / فتق / آنت بڑھ جانا

## Hernia

اس مرض میں آنت کا کوئی حصہ پیٹ کی حدود سے نکل کر کسی ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا ابھار نظر آتا ہے۔ مردوں میں انتڑی جنگسہ والی ناف کے راستے اتر کر فوطوں میں آجاتی ہے۔ عورتوں میں کیچ ران کے راستے نیچے اتر آتی ہے۔ شیر خوار بچوں میں ناف کے مقام پر ایک چھوٹا سا ابھار پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ دبانے سے فتق اپنی جگہ چلا جاتا ہے۔ البتہ پھنسا ہوا فتق بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پیٹ میں نفخ اور قونج کا سا درد ہوتا ہے۔ عام طور پر اس مرض کا سبب غیر معمولی دباؤ ہوتا ہے، جو کسی بھاری بوجھ وغیرہ کے اٹھانے اور اس کا زور حکم کے عضلات پر پڑنے سے ہو سکتا ہے۔ دائمی قبض بھی اس کا ایک سبب ہوتا ہے۔ قبض میں رفع حاجت کے لئے زور لگانے سے بھی آنت کا کوئی حصہ نیچے آجاتا ہے۔ بعض لوگ سہارا دینے کے لئے مخصوص قسم کی بیٹی باندھتے ہیں۔ لیکن اس کا اصل علاج آپریشن ہے جس سے ہرنیا کے سوراخ کی مرمت کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہرنیا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہرنیا کے مریض کو سخت قسم کی محنت مشقت یا وزن اٹھانے کا کام نہیں کرنا چاہئے قبض ہو تو اس کا علاج کیا جائے اور ہلکی اور زود ہضم غذا میں کھانی چاہئیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

- ☆ چٹے کا ہرنیا۔ خود کشی کے خیالات آئیں۔ دماغی افسردگی۔  
اورم میٹلیکم 200 یا 1M ہفتہ وار،  
تین مرتبہ
- ☆ بند یا رکا ہوا ہرنیا۔ بدبودار ریاخ۔ بے چینی۔ ڈکار یا ریاخ خارج ہونے سے بہتر ہو۔  
کاربودیج 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ جان لیوا مٹلی کے ساتھ دبایا ہوا ہرنیا۔  
ٹباکم 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ ہر قسم کے ہرنیا کے لئے جبکہ معدے کے پردے پٹے یا باریک ہوں۔  
گلییریا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار،  
تین مرتبہ
- ☆ ٹوٹی ہوئی یا چھید دار آنت۔ معدے میں درد۔ لیٹنے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ کھلی ہوا  
میں بہتر ہو۔  
ہلساٹیل 30 یا 200 چار گھنٹے بعد



☆ دائیں جانب کا۔ روکا ہوا چڈے کا ہرنیا۔ مریض کو گیس کی شکایت کا میلان ہو۔  
لائیکو پوڈیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ رکا ہوا ہرنیا جلن دار درد اور پریشانی کی علامات کے ساتھ۔  
اکونائٹ 200 چار گھنٹے بعد

☆ دبا ہوا اور رکا ہوا ہرنیا۔ فضلے کی قے کے ساتھ۔  
اوپیم 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ دبا ہوا یا رکا ہوا ہرنیا۔ مریض پیٹ پر کپڑے تک کا چھوا جانا برداشت نہ کر سکے۔  
لیکے سس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والا مریض۔ چڈے کا ہرنیا۔ درد۔ پاخانہ اکثر قبض سے ہو۔  
سیلیسیا 12x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ نہ مٹنے والی پیاس۔ شدید بے چینی اور جلن کا احساس۔ ایک وقت میں تھوڑا پانی پئے۔  
لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد۔ رکا ہوا ہرنیا۔  
آرسنک البم 30 چار گھنٹے بعد

☆ چڈے کا ہرنیا۔ بائیں جانب کا ہرنیا۔ ناف کا ہرنیا۔ صبح کے وقت اور جب قبض زیادہ ہو  
تو تکلیف بڑھے۔ چڑچڑے مزاج کا اور ٹھنڈ محسوس کرنے والا مریض۔  
نکس دامیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ ناف کے آس پاس درد۔ کسی دوسری قسم کا ہرنیا۔  
ہلمبر میٹلیکم 30 چار گھنٹے بعد

☆ مٹانہ کا ہرنیا۔  
شیفی سگریا 30 چار گھنٹے بعد

☆ ران کی ہڈی سے متعلق ہرنیا۔  
ویزیڈن 30 چار گھنٹے بعد

☆ ناف سے متعلق ہرنیا۔  
مر۔ نیٹم 30 چار گھنٹے بعد

☆ جب تمام منتخب ادویات غیر موثر ہوں۔  
کوکولس انڈیکا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ



## مقعد میں چیر یا مقعد کے کنارے پر

### لمبی شکل کا پھوڑا

#### Fissure

اس مرض میں مقعد کے کنارے پر زخم یا لمبی چیر آ جاتی ہے۔ رفع حاجت کے وقت مقعد میں سخت درد اور جلن ہوتی ہے جو رفع حاجت کے بعد بھی کچھ دیر تک ہوتی رہتی ہے۔ عام طور پر بواسیر کے ساتھ یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ مردوں کی نسبت عورتیں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔

#### علامات 'دوا اور طاقت' دورانیہ

☆ علاج شروع کرنے کے لئے (معاون دوا بھی)

ٹوبرکولینم 1M یا 10M پندرہویں روز

چھ مرتبہ

☆ آنکھوں یا ناک سے پانی جاری رہے یا منہ میں پانی بھرا رہے۔ جسم کی تمام بلغمی اور لمفی غدلیوں کے خشک ہو جانے کی وجہ سے مقعد کے کنارے پر پھوڑا۔

نیزم میو 30 چار گھنٹے بعد

☆ بدبودار رطوبت کا اخراج۔ مقعد میں ایسا محسوس ہو جیسے کبھی کبھار چبھ رہی ہوں۔

ٹائٹریک ایسڈ 30 یا 200 ہفتہ وار 'تین

مرتبہ

☆ مقعد کے ارد گرد واضح سرخی جس میں لگاتار جلن ہوتی رہے اور رفع حاجت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی رہے۔

سلفر 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ آنکھوں یا رطوبت والا سخت پاخانہ۔ سخت قسم کا قبض۔

گریفٹائٹس 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ پاخانہ پھنس کر رہ جائے۔ شکل سے نیچے گرے۔ کبھی کبھار کھچاؤ یا ٹکاؤ کے احساس کے ساتھ۔ پاخانہ کا کچھ حصہ نکل جائے اور کچھ واپس اوپر چڑھ جائے۔

سلیسیا 12x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ مقعد ٹوٹے ہوئے شیشے کی کڑیوں سے بھرا محسوس ہو۔ اجابت ہونے کے بعد بہت دیر تک جلن ہوتی رہے۔

رٹینیا (Ratanhia) 6 یا 30 چار  
کھٹے بعد

☆ بہت زیادہ رطوبت کے اخراج کے ساتھ مقعد میں لگاتار چھین ہوتی رہے۔

پائیومیا (Paeomia) Q یا 30 چار  
کھٹے بعد

پائیو کیمک کی کلکیریا فلور 12x اور سلیبا 30x ہر چار گھنٹے  
بعد دینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔

## ناسور مقعد

### Fistula

ابتدا میں مقعد کے قریب چھوٹی گولی کی مانند ایک ابھار سا ہوتا ہے جو بعد میں بڑھ کر بڑا ہو جاتا ہے اور پھوڑے کی سی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ متورم اور سرخ ہو جاتا ہے اور اس میں مواد بنتا شروع ہو جاتا ہے۔ رفع حاجت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ پھوڑا پھٹ جانے پر بدبودار مواد خارج ہوتا ہے اور مریض سکون محسوس کرتا ہے۔ پھوڑا پھٹنے کے بعد مقعد کے نزدیک ایک چھوٹا سا سوراخ رہ جاتا ہے جس سے کبھی کبھار پتلا مواد خارج ہوتا رہتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ علاج شروع کرنے کے لئے (معاون دوا بھی ہے)

ٹوبر کو لینم 200 یا 1M پندرہویں روز

تین مرتبہ

☆ دکھن اور سوجن۔ گہرا جلن دار درد۔ سبزی مائل رطوبت خارج ہو۔

ٹائٹریک ایسڈ 200 یا 1M ہفتہ وار تین

مرتبہ

☆ مقعد میں مزمن لمبے مہاسے یا پھنسیاں۔ جلن دکھن اور درم۔ سوزش۔ مرطوب آب و ہوا میں تکلیف میں کمی آئے۔

کاشی کم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ تپش کے مریض۔ ایسے مریض جو ٹھنڈ سے جلد جلد متاثر ہوں۔ (معاون دوا بھی ہے) مینس لینم 200 یا 1M 'پندرہویں روز' تین مرتبہ

☆ مقعد میں سرخی۔ ٹپکن والا درد۔ پیپ پڑنے کا ابتدائی مرحلہ۔ پلاڈونا 30 اور مرکبوس سال 30 'یکے بعد دیگر تین گھنٹے بعد'

☆ مقعد کے اخراج کے راستے کو بہتر بنانے کے لئے۔ مقعد کے ارد گرد پھاڑنے اور کاٹنے والے درد اور ٹپکس۔

بریس وگلرس Q 5-10 قطرے 'چار گھنٹے بعد'

☆ پھنسیاں پیپ میں تبدیل ہو جائیں۔ شدید گہرا درد۔ ٹکندر کا دوسرا مرحلہ۔

ہیبیر سلف 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ نظرنہ آنے والا ٹکندر۔ بغیر درد کے سبزی اور زردی مائل رطوبت خارج ہو۔

سلفر 200 یا 1M ہفتہ وار 'تین مرتبہ'

☆ مقعد میں ہتھوڑے کی چوٹ کا شدید درد۔

لیپے سس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ جب ٹاسور بن جائے اور اخراج کا راستہ ٹالی کی شکل کے لمبے پھوڑے کی صورت اختیار کر لے اور بدبودار پانی کی طرح کی رطوبت نکلنے لگے۔

سلیسیا 12x یا 30 'چار گھنٹے بعد'

بائیو کیمک کی ٹکیریا فاس 6x یا ٹکیریا سلف جب درد نہ ہو تو

چار گھنٹے بعد دینا بہت مفید ہے۔

بیرونی استعمال کے لئے

Lotion of Hydrastis or Calendula



# ورم قولون/ بڑی آنت کا ورم

## Colitis

(See dysentery also)

اس مرض میں بڑی آنت میں سوزش اور ورم ہو جاتا ہے۔ آنت کے عضلاتی ریٹھ اٹھنے یا سکڑتے ہیں اور پیٹ میں کھپاؤ والا درد ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انتڑی کہ مروڑا جا رہا ہو۔ مریض درد کی شدت سے پریشان ہو کر ٹانگوں کو پیٹ کے اندر سکھاتا ہے۔ کبھی پیٹ کو دبا کر لیٹتا ہے اور سخت بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے۔ مریض کو بار بار پاخانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے لیکن قبض کی وجہ سے اخراج نہیں ہوتا۔ جب آنت کے عضلات فضلے یا جمع شدہ ہوا کو نیچے کی طرف دھکیلتے ہیں تو نیچے کا حصہ سکڑا ہوا ہونے کی وجہ سے شدید درد کی لہرس اٹھتی ہیں۔ گھٹیا اور وجع المفاصل، ثقیل غذا اور ترش پھل کھانا، کرم امعاء اور قبض، ٹھنڈا لگنا اور پاؤں بھیگنا وغیرہ اس مرض کے عام اسباب ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ السر کی وجہ سے سادہ ورم قولون۔ برہمی کے بعد یا کوئی غیر انسانی یا غیر اخلاقی کام کرنے کے بعد مثلاً "زناہ بالجبر۔"

شینی سیکریا 200 یا 1M پندرہویں روز، تین مرتبہ

☆ غصے کے بعد علامات بڑھ جائیں۔ کڑوا ذائقہ۔ معدے میں شدید اور پھاڑنے والا درد۔ درد کی شدت سے مریض دوہرا ہو جائے۔

کالومنتھ 30، تین گھنٹے بعد

☆ پاخانے میں سفید ذرات کے ٹکڑے۔ معدے میں سکڑاؤ۔ جگر کے مقام پر شدید درد۔ کھانوں کی خوشبو سے غیر معمولی حساس۔

کالچی کم 30، تین گھنٹے بعد

☆ سبزی مائل پانی کی طرح پتلے دست۔ جو فوارے کے سے زور کی طرح باہر نکلے پڑیں۔ معدے میں شدید کھپاؤ۔

کنیسیا کارب 30، چار گھنٹے بعد



☆ بدبودار پتلے دست۔ مریض معدے کے اوپر کپڑے تک کا چھوا جانا برداشت نہ کر سکے۔  
موسم بہار میں اور سونے کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو۔

لیکے کس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ پانی کی طرح نیلے پاخانے رتخ یا ہوا کے اخراج کے ساتھ۔ کھانے کے بعد تکلیف  
بڑھے۔ برف کی مانند ٹھنڈے پانی پینے اور رکھے ہوئے پھل کھانے سے تکلیف میں اضافہ  
ہو۔ ہاضمہ ست ہو۔

چائنا 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی میگنسیا فاس 6x تین گھنٹے بعد دینا مفید ہے۔

## درد قونج/ مروڑ

Colic

(See abdominal pain also)

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ جب درد اچانک شروع ہو اور اچانک ہی ختم ہو جائے۔

بیلادونا 30 چار گھنٹے بعد

☆ زیادہ کھانے کے بعد۔ خاص طور پر سالہ دار اور ہنٹھی چیزیں اور دودھ کے بعد درد  
شروع ہو۔

نکس و امیکا 30 تین گھنٹے بعد

☆ کھانے کی بدہضمی کی وجہ سے درد قونج۔ نہ مٹنے والی پیاس۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے  
گھونٹ گھونٹ پانی پئے۔ پریشانی اور بے چینی۔

آرسنک الیم 30 دو گھنٹے بعد

☆ بہت شدید درد کہ اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ درد کس مقام پر ہے دھرا ہو جانے سے  
درد کم محسوس ہو۔

کالوسنتھ 30 چار گھنٹے بعد

- ☆ سخت اور تشنجی درد۔ وقفے وقفے سے شدید درد اٹھے۔  
کو پرم میٹلیکم، چار گھنٹے بعد
- ☆ تیزابیت کی وجہ سے درد ہو۔ السر ہو۔ مریض لگاتار ہوا کی خواہش کرے۔ تازہ ہوا چاہے۔  
کاربووٹج 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ جب درد ناقابل برداشت ہو۔ خصوصاً حاملہ عورت کا۔ غصے کے بعد تکلیف بڑھ جائے۔  
کیمو میلا 200، دو گھنٹے بعد
- ☆ پیٹے کے دوران شدید درد ٹھنڈے پسینے کے ساتھ۔  
درازم البم 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ کھانے کے دوران۔ ناف کے گرد جلن دار درد۔  
گلکیریا ریتال، چار گھنٹے بعد
- ☆ چکنائی والے کھانے کھانے کے بعد۔ پیاس ختم ہو جائے۔ کھلی ٹھنڈی ہوا کی خواہش کرے۔  
ہلسا ٹیلا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ کیڑوں کی وجہ سے معدے کا درد۔  
ساکا 200 یا 1M، چھ گھنٹے بعد
- ☆ معدے کے آپریشن کے بعد درد۔  
شینفی سیکریا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ اچھارے بادی اور رتج کی وجہ سے درد۔ پیچھے کی جانب مڑنے سے آرام آئے۔  
ڈسکوریلا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ بائو کمک کی گنیسیا فاس 6x دو دو گھنٹے بعد دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔



## بواسیر، بواسیر کے مہاسے

### Bleeding Piles/Haemorrhoids

اس مرض میں مقعد کے اندر اور امعاء زیریں کے کناروں پر سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان مسوں میں خون جمع رہتا ہے۔ سے چھوٹے چھوٹے اور بعض اوقات کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ان مسوں میں شدید درد، جلن اور خارش ہوتی ہے۔ خون کبھی قطرے قطرے اور کبھی بہت زیادہ مقدار میں آتا ہے۔ مریض ڈر کے مارے رفع حاجت سے گریز کرتا ہے جس سے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے اور سخت اجابت کی وجہ سے سے چھل جاتے ہیں اور اس سے خون بہنے لگتا ہے۔ خون بعض دفعہ پاخانے سے پہلے، کبھی پاخانے میں ملا ہوا اور کبھی بعد میں آتا ہے۔ اندرونی سے بعض دفعہ مقعد سے باہر نکل آتے ہیں اور اس قدر متورم ہو جاتے ہیں کہ پھر اندر داخل نہیں ہو سکتے، جس کے سبب بڑی شدید تکلیف اور درد ہوتا ہے۔ یہ سے زخم بن جاتے ہیں یا گل مزکر مردار ہو جاتے ہیں۔

اگر مرض کا بروقت اور صحیح طور پر علاج نہ کیا جائے اور مرض زور پکڑ جائے تو مریض کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ وہ نہایت لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ خون بہت زیادہ خارج ہو جانے سے توانائی میں کمی آ جاتی ہے۔

کبھی یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ورزش نہ کرنا، سالہ دار چپٹی چیزیں کھانا، عیاشانہ زندگی بسر کرنا، قبض ہونا، مستفل بیٹھے رہنا، گیلی جگہ بیٹھے رہنا، زیادہ شراب اور گرم چیزیں پینا اور کھانا، جگر کا فعل ست ہونا وغیرہ اس مرض کے عام اسباب ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ بواسیر کے مہاسوں سے خون کے اخراج کے لئے قدیم ہندوستانی دوا۔

بلومیا اوڈ، چار گھنٹے بعد

☆ خون کے اخراج اور قبض کے لئے سب سے اعلیٰ دوا۔

سلفر 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ مہاسوں کے بغیر بواسیر۔ خون بند۔ موقوتی حیض میں تکلیف زیادہ بڑھے۔

ایس کولس ہپ

(Aesculus hipp) چار گھنٹے بعد

☆ قبض رہے۔ یا کبھی اس سال شروع ہو جائیں اور کبھی قبض ہو جائے۔ بھوک مر جائے

خصوصاً دوران حمل۔ مہاسوں سے درد کے ساتھ خون بنے۔

کولن سونیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ مہاسوں سے خون جاری رہنے کے دوران تک کے لئے۔

ڈولی کوس Q 4-5 قطرے 'چھ گھنٹے بعد

☆ شدید جلن دار درد۔ دوران اجابت ڈنک لگنے اور چھین کا شدید احساس۔

کپسیکم 30 'چار گھنٹے بعد

☆ جب ہر اجابت کے ساتھ پتلی دھار سے خون بنے۔

فاسفورس 200 '10 منٹ بعد 'تین

مرتبہ

☆ جب خون سرخ اور چمکیلا ہو اور ڈولی کاس Q بھی کام نہ کرے۔

ملی فولیم Q یا 200 '5-10 قطرے 'چار

گھنٹے بعد

☆ خون کے کالے لوتھڑے۔ دکھن اور سوزش۔ مقعد سے خون جاری ہو اور اس میں تپکن

اور دھڑکن ہو۔

ہیما یلس Q یا 30 '5-10 قطرے 'چار

گھنٹے بعد

☆ مہاسوں سے بہت زیادہ خون کا اخراج درد کے ساتھ۔ اجابت کے بعد بہت دیر تک

کاٹنے والے درد۔

ٹائٹریک ایسڈ 200 یا 1M '10 منٹ

بعد 'تین مرتبہ

☆ ہندوستانی مجرب دوا 'جبکہ خون چمکیلا سرخ ہو۔

فکس ریلگ Q (Ficus religiosa)

5-10 قطرے 'چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی فیرم فاس 3x ہر چار گھنٹے بعد دینا بھی بہت مفید

ہے۔





## ورم زائدہ

### Appendicitis

اندھی آنت کے زائدہ کے بڑھ جانے کو ورم زائدہ کہتے ہیں۔ اس میں شدید درد شکم ہوتا ہے۔ درد کا حملہ اچانک ہوتا ہے اور ناف کے ارد گرد کاٹنے والے درد محسوس ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد یہ درد چھوٹی بڑی آنت کے ملنے والے مقام پر ٹھہر جاتا ہے۔ مریض کا جی متلانے اور تے آنے لگتی ہیں۔ حتیٰ کہ پانی وغیرہ بھی نکل جاتا ہے۔ سردی لگ کر بخار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بخار کا درجہ حرارت زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ البتہ نبض کی رفتار تیز ہوتی ہے اور مرض کی شدت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔

مریض کا پیٹ پھولا ہوا اور زبان میلی ہوتی ہے۔ مریض کو دائیں ٹانگ کو ڈھیلا اور اونچا رکھنے سے آرام ملتا ہے۔ کیونکہ اس طرح ماؤف مقام پر کھپاؤ کم ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اندھی آنت کی سوزش پھوڑے میں تبدیل ہو جانے سے بار بار سردی کے ساتھ بخار چڑھنے لگتا ہے۔ اندھی آنت میں کسی پھل کی گٹھلی یا چھلکا پھنس جانا، دائمی قبض، کرم امعاء اس مرض کے عام اسباب ہیں۔ یہ مرض عام طور پر پندرہ سے تیس سال کی عمر کے دوران ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ علاج شروع کرنے کے لئے۔

پیشیا CM ایک خوراک

☆ دائیں جانب لیٹنے سے درد میں شدت آجائے۔ کثرت سے پینہ آئے جو کسی طور ختم نہ ہو۔

مرکیورس سال 200 '15 منٹ بعد'

تین مرتبہ

☆ پیچھے کی جانب مڑنے سے درد کی شدت میں کمی آئے۔ انتڑیوں میں گیس بھر جائے۔  
شدید مروڑ والا درد۔

ڈسکوریا 30 یا 200 'آدھا گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ اندھی آنت اور چھوٹی آنت ملنے کی جگہ (ileocecal) پر شدید درد۔ ذرا سی بھی حرکت سے درد میں اضافہ ہو جائے۔

آئرس ٹینکس (Iris Tenax) 1M '10

گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ شدید قسم کا درد۔ ناقابل برداشت درد حتیٰ کہ معمولی سے ہوا کے جھونکے تک یا ذرا پھونکنے سے بھی درد بڑھے۔ مریض ٹھنڈا ہو۔

بیبیر سلف 200 یا 1M پندرہ منٹ بعد  
تین مرتبہ

☆ اچانک شدید درد۔ مریض متاثرہ جگہ کو ذرا سا بھی دبانا یا بھینپنا برداشت نہ کر سکے۔  
بیلادونا 30 یا 200 پندرہ منٹ بعد پھر

مرتبہ  
☆ تمام پیٹ بہت زیادہ حساس۔ سوزش کی جگہ سے شدید درد پیچھے اور نیچے کی جانب ہوتا  
ہوا ران میں پہنچے۔ متاثرہ حصے پر کپڑا تک برداشت نہ کر سکے۔  
لیکے سس 200 '10 منٹ بعد' نمین

مرتبہ  
☆ جب حیوانی اجسام سڑنا شروع ہو جائے۔ ٹھنڈا۔ اسہال لگ جائیں۔ سخت بے چینی ہو۔  
بہت زیادہ پریشانی۔ بہت تیزی سے قوت ختم ہوتی جائے۔ شدید درد اور سوزش۔  
آرسنک البم 200 یا 1M '10 منٹ  
بعد' تین مرتبہ

☆ شدید چھین اور کاٹنے والا درد جو ذرا سی بھی حرکت سے اور بڑھ جائے۔ یہاں تک کہ  
سانس لینے سے بھی تکلیف زیادہ ہو۔ کچھ بہتر محسوس کرے جبکہ درد والی جانب بڑے سکون  
سے لیٹ جائے۔ دائیں جانب درد۔

برائی ادویا Q 5-10 قطرے 'دو گھنٹے بعد'  
☆ آرام کرنے سے تکلیف بڑھے اور حرکت کرنے سے درد میں کمی آئے۔  
رہس ٹاکس 30 یا 200 'دو گھنٹے بعد'

چھ مرتبہ  
بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x کالی میور 6x اور میگنیسیا فاس 6x  
گرم پانی میں ملا کر دینا بھی بہت فائدہ مند ہے۔

# فُضْلے / پاخانے کی تکلیفات

## Affections of Stools

(See Constipation, Diarrhoea, Dysentery and Cholera etc also)

قبض، اسہال، پیچش اور ہیضہ وغیرہ فضلے کی تکلیفات ہیں۔ لیکن فضلہ کا اخراج مختلف کیفیات میں مختلف طریقے اور انداز سے ہوتا ہے۔ اجابت سے پہلے اور بعد میں کچھ خاص کیفیات ہوتی ہیں۔ فضلے کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے اور فضلے کے ساتھ میں کچھ دوسرے مادے بھی خارج ہوتے ہیں۔ فضلے کے اخراج سے پہلے اور بعد میں کچھ ذہنی اور جسمانی تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ غیر ارادی طور پر فضلہ نکل جائے۔ کسی خوف کے بعد پاخانے جاری ہو جائیں۔ سخت اور خشک پاخانہ ہو۔

اوپیم 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ صرف پیچھے کی جانب جھکنے کی صورت میں درد کے ساتھ پاخانہ ہو سکے۔

میڈورینم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ کان کے رنگ کی سطح کا پاخانہ۔

نیر۔ بستم (Terebinth) Q یا 6 چار

گھنٹے بعد

☆ مٹی کے رنگ کا پاخانہ۔ درد کے ساتھ اور زور لگانے سے اخراج ہو۔

ہیپر سلف 30 چار گھنٹے بعد

☆ اجابت کے بعد سیون میں جلن اور سوزش ہو۔

ٹائٹرک ایسڈ 30 چار گھنٹے بعد

☆ پاخانے میں سے کھٹی بو آئے اور سبز رنگت کا ہو۔

نیرم قاس 6x یا 30 چار گھنٹے بعد



- ☆ اجابت کے اخراج کے دوران اور بعد میں مقعد میں ناقابل برداشت درد ہو۔  
پونیا Q یا 6 چار گھنٹے بعد
- ☆ یسدار فضلہ۔ اجابت کے بعد عضلہ ماصرہ یا مقعد بند کرنے والے عضو میں ششی درد ہو۔  
کھانے کی خوشبو ناپسند کرتا ہو۔  
کالچی کم 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ آنوں کے ساتھ ڈلی دار گلیٹیوں والا اور ٹکڑے ٹکڑے پاخانہ۔  
گریفائٹس 30 یا 1M چار گھنٹے بعد
- ☆ پاخانے کا کچھ حصہ سخت اور کچھ پتلا، کالا خون ملا۔ زبان پر سفید میل ہو۔ معدہ باہر کو نکلا ہوا ہو۔  
انٹم کروڈم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ سردھونے کے فوراً بعد حاجت رفع کرے۔  
ٹیرنٹولا ہسپانیہ 200 یا 1M 10 منٹ بعد، تین مرتبہ
- ☆ پاخانہ واپس لوٹ جائے جبکہ قریباً ٹکٹنے والا ہو۔  
سلیسیا 12x یا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ بہت زیادہ ریاہ بنیں۔ بغیر درد کے پاخانہ ہو۔ دستوں کی بدبو سڑے ہوئے انڈوں جیسی۔  
گہری بھوری رنگت۔  
سورینم 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ اعصابی دردوں کے ساتھ بدبودار اور خون کی آمیزش کا پاخانہ۔ پاخانوں کے درمیان لمبا وقفہ۔  
آرنیکا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ صبح سویرے بہت جلدی سے حاجت ہو۔  
سلفر 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ گاڑھا اور سخت پاخانہ بھی غیر ارادی طور پر نکل جائے۔  
ایلو 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ سخت اور قبض والا پاخانہ۔ صرف کھڑے ہو کر اخراج ہو سکے۔  
ایلوینیا 30 یا 0/5 یا پوی طاقتیں چار گھنٹے بعد



☆ شک پاخانہ۔ ہلکے رنگ کا فضلا۔

☆ کولن سونیا Q یا 6 چار گھنٹے بعد  
☆ پاخانہ کرتے ہوئے سیون میں درد ہو۔ کھانے کے بعد اجابت کے لئے لازمی طور پر جانا  
پڑے۔ دیر تک رہنے والی تیز سخت بدبو۔

☆ سینگونیریا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
☆ کسی بھی قسم کی جذباتیت کے بعد ضرورت پیش آجائے یا پیشاب کرتے ہوئے بھی۔  
ہائوسامس (Hyoscyamus)

☆ 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ  
☆ مقعد کے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے اجابت کے لئے زور نہ لگا سکے۔ فراغت کے بعد  
کمزوری اور دھڑکن ہو۔ پاخانہ ٹھنڈا ہو۔

☆ کونیم میک 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
☆ دو پاخانے ایک ہی طرح کے نہ ہوں۔ رنگت بدل جائے۔  
ہلسائلا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ کھڑے ہونے کی حالت میں آسانی سے بہتر طور پر اخراج کر سکے۔  
کاشی کم 30 یا 0/5 یا بڑی طاقت، چھ  
گھنٹے بعد

☆ پیپ دار، رطوبت والے، چکنے، پتلے اور گرم پاخانے۔  
کلکیریا فاس 6x یا 6 چار گھنٹے بعد

☆ اچانک، تیزی سے پھٹ کر آواز کے ساتھ پھیلنے والا پاخانہ۔  
نیزم سلف 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
☆ کوئی مشروب پینے کے بعد اجابت کے لئے ضرور جانا پڑے۔ فراغت کے بعد پیاس ضرور  
لگے۔  
کیسی کم 30 چار گھنٹے بعد

☆ پاخانہ ملائم ہونے کے باوجود اخراج مشکل سے ہو۔  
نکس موسکاٹا 30 چار گھنٹے بعد

☆ غیر موثر احساس ضرورت۔ جلن ہو۔  
نکس دامیکا 30 چار گھنٹے بعد

☆ پاؤں لگاتار ٹھنڈے۔ پتے کے مقام پر شدید اور ناقابل برداشت درد۔ چھوٹے تنک سے حساس۔

لائیکو پوڈیم 200 یا 1M ہفتہ وار تین مرتبہ

☆ نفل ہونے والے اور کانٹے والے درد۔ پتے کی پتھری کا درد۔ پیچھے کی جانب مڑنے سے مریض بہتر محسوس کرے۔

ڈاٹسکوریلا 30 چار گھنٹے بعد

☆ کسی ایک نکتے یا مقام پر ٹھہرا ہوا شکنجی درد۔ ٹیسوں اور لمبوں والا درد۔ گردے کی تکلیف کے ساتھ پتے کے مقام پر بھی درد۔ پتے کی پتھری کا خارش والا درد۔

بربرس وگلرس Q یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ شدید درد۔ چہرہ تھمایا ہوا۔ حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔

بیلادونا 30 چار گھنٹے بعد

☆ معاون دوا۔

میڈورنیم 200 یا 1M پندرہویں روز تین مرتبہ

بائیو کیمک کی میکنیسا فاس 6x اور نیزم سلف چار گھنٹے بعد دینا بھی فائدہ مند ہے۔



## مٹانہ کی پتھری

### Stone in the Bladder

اس بیماری میں گردے یا مٹانے کے اندر ریگ یا پتھری پیدا ہو جانے سے پیشاب کی تہ میں معدنی قسم کا تلچھٹ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ معدنی ذرات اگر گردے میں الگ الگ پڑے رہیں تو انہیں ریگ گردہ کہتے ہیں اور ان ذرات کے باہم مل جانے سے نگریاں بن جاتی ہیں تو ان کو گردے کی پتھری کہا جاتا ہے۔ اکثر گردے میں بننے والی پتھریاں مٹانے میں آجاتی ہیں اور وہاں سے پیشاب کے ساتھ باہر نکل جاتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی یہ پتھریاں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ مٹانے کی ٹالی سے گذر نہیں سکتیں اور وہ مٹانے میں اٹک جاتی ہیں۔

بعض دفعہ کھائی ہوئی خوراک میں کچھ نمکیات صحیح طور پر جسم سے خارج نہیں ہوتے اور جسم میں جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر پینے والا پانی صاف نہیں ہوتا ہے یا کم مقدار میں پیا جاتا ہے۔ اس طرح جسم میں اکٹھے ہونے والے نمکیات سے پتھری بنتا شروع ہو جاتی ہے۔ مٹانے یا گردے میں پتھری بن جانے سے پیشاب کے دوران جلن ہوتی ہے۔ پیشاب جلدی جلدی آتا ہے۔ کبھی کبھی پیشاب رک جاتا ہے جس سے مٹانے اور گردے کی جگہ درد ہوتا ہے۔ گردوں میں پتھری بن جانے سے گردے پھول جاتے ہیں اور ان میں پیپ پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ گویا گردوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے۔ کمر میں درد ہونے لگتا ہے جو ران تک جاتا ہے۔ اچھلنے، کودنے، دوڑنے، ماور گھڑسواری سے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیشاب میں خون کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ مرض غیر متوازن غذا، پانی کے کم استعمال، وٹامن کی کمی، کیلشیم اور یورئیس خارج ہونے اور زیادہ پینے آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غذا میں بعض ایسی اشیاء جن میں تیزابیت ہوتی ہے کے زیادہ استعمال سے بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے مثلاً "نٹائر" پالک، چندر اور گوشت وغیرہ۔ زیادہ چکنائی بھی اس مرض میں مضر ہوتی ہے۔ لہذا اس مرض کی احتیاطی تدابیر کے طور پر پانی زیادہ پینا چاہئے اور تیزابیت والی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہئے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ بار بار پیشاب کرنے کی حاجت ہو۔ کانٹے والا اور جلن دار درد۔  
"کیسترس 30" چار گھنٹے بعد

☆ پیشاب قطرہ قطرہ نکلے۔ اگرچہ مٹانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہو۔  
نکس دامیکا 30" چار گھنٹے بعد

☆ مٹانے کی کمزوری یا فعل مٹانہ کمزور ہونے کی وجہ سے پیشاب آہستہ آہستہ ہو۔ پیشاب کی جلدی جلدی حاجت ہو خاص طور پر رات کے وقت۔ پیشاب قلت سے ہو۔ رنگ دار اور بدبودار پیشاب ہو۔

میڈورینم 200 یا 1M 10 مٹ بعد  
تین مرتبہ

☆ مٹانہ کی کمزوری یا خالی کی وجہ سے بار بار پیشاب کی حاجت ہو۔ پیشاب قلیل مقدار میں ہو۔ کمر کے بل لیٹنے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ مریض کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں اچھا محسوس کرے۔

پلساٹیل 30 چار گھنٹے بعد

☆ لگاتار پیشاب کرنے کی حاجت۔ جیسے ہی مٹانے میں چند قطرے جمع ہوں فوراً ہی حاجت ہو جائے۔ پیشاب کنٹرول نہ کر سکے۔ پیاس نہ ارد۔

ایس ملنیکا 30 چار گھنٹے بعد

☆ مٹانہ کا انزال یعنی پیشاب جاری رہے۔ پیشاب میں گاڑھی یسدار رطوبت آئے۔ برا شدید ہو۔

ہائیڈراشس کین 30 چار گھنٹے بعد





## مٹانے کے غدود کی تکلیفات

### Ailments of Prostate Glands

مٹانے کا غدود (Prostate gland) قریباً "اخروٹ کے برابر ہوتا ہے جو کہ مٹانے کے سرے پر واقع ہوتا ہے۔ اس غدود میں ایک قسم کی سفیدی یا بے رنگ رطوبت پیدا ہوتی ہے جسے مڈی کہتے ہیں۔ مٹانے کے اس غدود کے بڑھ جانے سے یا سوزش کی وجہ سے مقام سیون پر بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ جس سے پاخانہ کی غیر ضروری حاجت محسوس ہوتی ہے۔ مٹانے میں خراش محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے یا بند ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی پیشاب میں خون بھی آجاتا ہے۔ مزمن مرض ہو جانے کی صورت میں یہ مملک ہو جاتا ہے اور غدود میں پتھپ پڑ کر پھوڑا بن جاتا ہے۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ پروٹیٹ غدود/کی سوزش اور بڑھ جانے کی اعلیٰ ترین دوا۔

سائل سارولانا Q 5-10 قطرے، چار  
گھنٹے بعد

☆ پروٹیٹ غدود کا کینسر۔

سٹس کیناؤلس 30 یا 200، چار گھنٹے  
بعد

☆ اگر پیشاب کرنے کی شدید حاجت اور خواہش ہو۔ لیکن پیشاب تھوڑی مقدار میں  
قطرے قطرے کر کے پکے۔

شینفی سیکریا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد،  
تین مرتبہ

☆ مٹانے کی خرابی کی وجہ سے بار بار پیشاب کرنے کی حاجت اور غدود کا بڑھ جانا۔ منہ  
ٹنگ ہونے کے ساتھ پیاس۔

ہلماٹیل 30 یا 200، چار گھنٹے بعد، تین  
مرتبہ

☆ مریض کھڑے ہو کر ہی آسانی سے پیشاب کر سکے۔ خاص طور پر بوڑھے اور غیر شادی شدہ لوگوں کے لئے۔

کوئیم میک 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ شریلی طبیعت کے بڑی عمر کے لوگوں کے لئے جو بچوں کی طرح حرکتیں کریں۔

برٹا کارب 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ پروٹیسٹ غدد کا کینسر۔ جبکہ لیٹنے کے بعد پیشاب کے قطرے ٹپکیں۔

کریازوٹ 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ معاون دوا کے طور پر۔

سلفر 200 یا 1M 'پندرہویں' تین مرتبہ



# گردے کی پتھری

## Renal Calculi

(Kidney Stone)

گردے میں پتھری ہونے سے کمر میں درد ہوتا ہے۔ کمر کے درد کی لہریں 'خپپے' ران اور ٹخنے تک بھی جا سکتی ہیں۔ بار بار پیشاب آتا ہے۔ تھوڑا بہت خون آنے لگتا ہے۔ گردے میں سوزش کی وجہ سے پیشاب میں پس بھی آنے لگتی ہے۔ دونوں گردوں میں پتھری ہونے کی وجہ سے پیشاب پیدا ہونا بھی بند ہو سکتا ہے۔ پتھری مٹانے میں ہونے سے بھی سخت درد ہوتا ہے۔ کوئی منت کا کام کرنے، زیادہ چلنے پھرنے سے درد بڑھ جاتا اور پیشاب بار بار آتا ہے۔ مٹانے میں پتھری ہونے کی خاص علامت یہ ہے کہ پیشاب کر چکنے کے بعد بھی مٹانہ جاری یا بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ پتھری کے مٹانے کے منہ پر آجانے سے پیشاب رک رک کر آنے لگتا ہے یا بند ہو جاتا ہے۔ پیشاب دن میں زیادہ اور رات کو نسبتاً کم آتا ہے۔ مریض تکلیف کی شدت سے بدمحال اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ اینٹ کے سے رنگ کا سرخ ساربتلا اور ذرات ملا غیر شفاف اور گدلا پیشاب۔  
سیپا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ آٹے کے ذرات کی طرح کا سفید بگھس ملا، خون کی آمیزش والا سرخ یا بھورے رنگ کا پیشاب۔ کچھ دیر تک رکھنے کے بعد پیشاب کی رنگت چوڑے کے پانی کی سی ہو جائے۔  
پیشاب کرنے کے دوران پیشاب کی نالی میں جلن ہو۔  
کلیریا کارب 200 'چھ گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ گردے کا درد سینے میں سرایت کرے۔ بدبودار پیشاب۔ گہرے بھورے رنگ کے ذرات  
پیشاب میں آئیں۔  
بنزوک ایسڈ 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ حاد حالت کے لئے جبکہ درد قابل برداشت ہو۔

اکونائٹ 200 یا 1M اور کیومیلا 200  
یا 1M پندرہ منٹ کے بعد دوبار  
دوائیں یکے بعد دیگر تین تین مرتبہ دی  
جائیں۔

☆ تیز چرنے والے درد۔ پیشاب کے ساتھ جلن۔ پیشاب کی نالی میں سوزش اور زخم۔  
کیسٹرس 30 چار گھنٹے بعد

☆ مریض بڑی کوشش کے بعد پیشاب کر سکے۔ رک رک کر پیشاب آئے۔ پیشاب میں  
سرخ ریت ہو۔ گردے کے پچھلے حصے میں پیشاب کرنے کے دوران اور پہلے جلن اور کانٹے  
والے درد۔ پیشاب کرنے کے بعد آفاقہ ہو۔ دائیں جانب زیادہ تکلیف ہو۔

لائیکو پوڈیم 200 یا 1M 10 منٹ بعد  
تین مرتبہ

☆ مریض لیٹ کر بہتر طریقے سے پیشاب کر سکے۔ پیشاب کو روک نہ سکے۔ لیٹنے کے بعد  
قطرے پگھنے لگیں۔

کریازوٹ 30 چار گھنٹے بعد

☆ گردے کی پتھری کا راستہ میں شدید درد جس کی وجہ سے مریض دوہرا ہو جائے۔ پیچھے کی  
جانب مڑے۔ جھکنے سے بہتر محسوس کرے۔

ڈاکس کوریا 30 چار گھنٹے بعد

☆ گردے اور مثانے کی پتھری توڑنے اور نکالنے کے لئے اور پتھری یا سنگریزے بننا روکنے  
کے لئے۔

کلکیریا رینالس 3x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ گھٹنوں کے بل جھک کر اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر پیشاب آسانی سے کر سکے۔ پیشاب میں  
بہت زیادہ بے سار گاڑھی چمکی سفید رطوبت شامل ہو یا سرخ ریت ملا ہو۔ امونیا کی سی تیز  
بو ہو۔

ہیپرا براوا Q 5-10 قطرے چار گھنٹے

بعد تین مرتبہ

☆ پیشاب کرنے کے فوراً بعد مثانے کی گردن میں شدید قسم کا درد محسوس ہو۔

سار سا پرلا Q یا 30 چار گھنٹے بعد



☆ پیشاب کی نالی اور مثانے میں پیشاب کرتے ہوئے کھلبلی اور غارش محسوس ہو۔ پیشاب کرنے کی غیر موثر حاجت۔ گردے کا درد اعضاء تناسل تک پھیل جائے اور پیشاب کے قطرے ٹپکنے لگیں۔ ٹھنڈ محسوس ہو۔

نکس دامیکا 200 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ درد گردہ۔ انتہائی درجہ کی مٹلی جس سے مریض سخت پریشان ہو۔

نپاکم 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ گردے کے راستے سے کمر اور کولہوں میں ازیت ناک درد۔ پیشاب میں اینٹ کے ذرات کا ساربت۔

آرنیکا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ ایک یا دونوں گردوں کے مقام پر کھودنے، پھاڑنے اور ٹپکن والے درد۔ گمرے دباؤ سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ زردی گردوں سے آگے مثانے اور پیشاب کی نالی میں پھیلیں اور پیشاب کرنے کی حاجت پیدا کریں۔ بائیں جانب زیادہ متاثر ہو۔ شدید قسم کی پڑمردگی، بڑھال پن اور لاغری کے ساتھ کمر میں درد۔

بربرس وگرس Q یا اوپر کی طاقتیں 'چار

گھنٹے بعد'

☆ مشکل سے پیشاب کر سکے۔ پیچھے کو جھک کر آسانی سے پیشاب کر سکے۔

رگم سیلیکم 200 '10 منٹ بعد' تین

مرتبہ

☆ مثانے میں پتھری یا سنگریزے۔ پیشاب کا بہاؤ اچانک یا ایک دم رک جائے۔ پیشاب میں

خون کی آمیزش ہو اور تار دار ہو۔

یوا ارسی (Uva Ursi) 30 'چار گھنٹے

بعد'

درد کے لئے بائج کیمک کی میکیسا فاس 6x آدھا آدھا گھنٹہ

بعد پتھری کو گھلانے اور توڑنے کے لئے سیلیا 12x یا 30x

اور ٹکیریا 30x چار چار گھنٹے بعد دینا بھی بہت فائدہ مند ہے۔



# سوزش گردہ / ورم گردہ

## Nephritis

(Inflammation of the kidneys)

اس مرض میں ایک یا دونوں گردوں کی ساخت میں نقص پیدا ہو کر سوزش ہو جاتی ہے اور پیشاب میں البیومن آنے لگتی ہے اور استسقا ہو جاتا ہے۔ چند گھنٹوں میں تمام جسم پر ورم آجاتا ہے۔ بعض دفعہ چہرہ اور جسم اس قدر پھول جاتا ہے کہ آنکھیں تک چھپ جاتی ہیں۔ پی متلاتا اور ابکیاں آتی ہیں۔ پیاس زیادہ لگتی ہے اور سر میں درد ہوتا ہے۔ پیشاب بدبودار سرخی مائل یا سیاہی مائل آتا ہے جس میں البیومن اور خون کے ذرات بھی ہوتے ہیں۔ پیشاب تھوڑا تھوڑا اور شدت مرض میں بالکل نہیں آتا۔ سردی کے ساتھ بخار چڑھ جاتا ہے۔ ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ بھوک مر جاتی ہے۔ گردے کے مزمن مرض کی صورت میں بار بار حاجت ہوتی ہے خاص طور پر رات کے وقت۔ سرخ بخار، بھگنے، ٹھنڈ لگنے، سل اور آتشک کی سمیت اس مرض کے عام اسباب ہیں۔ منشیات کا زیادہ استعمال اور نفرس مزاج افراد کو بھی یہ مرض لاحق ہو جایا کرنا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کھانٹے ہوئے اور چھینکتے ہوئے غیر ارادی طور پر پیشاب نکل جانا۔ تیز اور چھیننے والا درد گردہ۔

کالی کارب 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ شدید درد گردہ جو مٹانے اور پیشاب کی نالی میں پھیلے۔

☆ پیشاب میں شدید اور پھیلنے والی بدبو۔ شدید درد گردہ جو سینے میں داخل ہو جائے۔ پیشاب میں گہرے بھورے رنگ کے ذرات۔

بنزوک ایسڈ 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ کسی خاد بیماری کے سبب ورم گردہ کے ساتھ بار بار پاخانے اور پیشاب کی لگاتار حاجت۔  
ر۔ بستہ Q 5-6 قطرے 'تین گھنٹے بعد'

☆ پیشاب کی رنگت سرخ ہو۔ چیرنے والے درد جو کہ مٹانے کی طرف بڑھیں اور گردے کے مقام پر گرمی اور کھپاوت کا احساس ہو۔ درد اچانک شروع ہو کر اچانک ختم ہو جائے۔ پیشاب میں قطرہ قطرہ نکلے۔

بیلادونا 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ پیشاب میں خون، پیپ، البیومن۔ سوت کی طرح کی ایک باریک چیز جو خون اور نباتاتی مادے میں پائی جاتی ہے اور اسی تحلیل سیل شامل ہوں۔ پیاس بڑی شدید ہو۔ تھکن اور شدید بے چینی ہو۔

آرسنک البم 30 چار گھنٹے بعد

☆ گردوں میں شدید درد اور درم پیشاب کی شدید قسم کی سمیت اور تیزابیت کے ساتھ۔ پیشاب میں البیومن اور گردے کے عناصر۔ دل کی بیماریوں میں۔ گردے جو کہ پہلے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہوں اچانک متاثر ہو جائیں۔

ایل سیرم (Eel Serum) 30 چار گھنٹے بعد

☆ پیشاب کرنے کی غیر موثر خواہش کے ساتھ جسم کے دائیں جانب درد۔ دائیں گردے کا درد۔ آنتیں اور منی کی نالی اوپر کو چڑھتی محسوس ہوں۔ قبض ہو۔ کچے پن کی عادات اور تحریک پیدا کرنے والے مشروبات کا زیادتی سے استعمال۔ خونی بواسیر کے اخراج رکنے کے بعد گردے کی تکلیفات کی پیچیدگی پیدا ہوئی ہو۔

نکس دامیکا 30 چار گھنٹے بعد

☆ پیشاب مکمل طور پر رک جائے۔ پیشاب میں البیومن اور خون ملا ہو اور قطروں میں آئے۔ کانٹے والا شدید درد اور جلن۔ سوزش کے ساتھ بار بار پاخانہ اور پیشاب کی حاجت ہو۔

کیسٹرس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ مثنی چوٹ کی وجہ سے۔ مسلسل چوٹ لگنے یا جھنجھوڑے جانے کی وجہ سے گردے کی تکلیف۔

آرنیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ نیند اڑ جانے کی وجہ سے یا رات بھر جاگتے رہنے کی وجہ سے نرس خواتین کی گردے کی تکلیف۔

کوکولس انڈیکا 30 چار گھنٹے بعد



☆ ہوا لگ جانے سے گردے کے مقام پر تیز کاٹنے والا درد۔ گردے کے درم اور درد کے ابتدائی مرحلے کے لئے۔

اکونائٹ 30 یا 200 دو گھنٹے بعد

☆ گردے کے ارد گرد کی جگہ نرم۔ درد گردے سے مٹانے اور جسم کے دوسرے نچلے حصے اور پیٹ کی طرف پھیلے۔ پیشاب میں البیومن۔ پیپ اور فاسفورک ایسڈ خارج ہو۔

سالی ڈاگو Q 4-5 قطرے چار گھنٹے بعد

☆ ماہواری رک جانے کی وجہ سے درم گردہ۔ کھانتے اور چھینکتے ہوئے پیشاب کے قطرے نکل جائیں۔ لیٹنے کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو۔

پلسائٹلا 30 چار گھنٹے بعد

☆ مریض ٹھنڈ اور درد سے سخت حساس۔ مزمن مرض کی کیفیت میں جب کہ ہاتھوں اور غددوں میں سختی اور کڑا پن پایا جائے۔

ہیپر سلف 30 یا بڑی طاقت چار گھنٹے

بعد

☆ پیشاب کرنے میں دقت ہو۔ جلن، کٹن، دکھن تیز درد۔ جیسے جلد چھیل دیں گے۔ گردے کے مقام سے چڈے کی جانب پھیلیں۔

کینابس سٹیوا 200 یا 1M 10 منٹ

بعد تین مرتبہ

☆ پیٹ میں شدید درد اور مروڑ کے ساتھ متلی۔ قلیل مقدار میں اور درد بھرا۔ پیشاب میں کچا خون، شوگر اور البیومن شامل ہو۔ پیشاب کی رنگت سرخ چمکدار ہو۔

کالچی کم 30 چار گھنٹے بعد

☆ گردے کے مقام پر سوجن اور سوزش۔ بطور معاون دوا۔

میڈورنیم 200 یا 1M پندرہویں روز

تین مرتبہ

☆ البیومن کے ساتھ قلت پیشاب۔ شدید درم گردہ۔ پیاس ندارد۔ البیومن بیریبا۔ ایس ملفیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ سیاہی مائل کم مقدار میں پیشاب۔ درم گردہ اور استقاء گردہ۔ نبض ست اور کمزور۔ ایسا محسوس ہو کہ دل رک یا ٹھہر گیا ہے۔

ڈیجی ٹیس 30 چار گھنٹے بعد



☆ دائیں گردہ کے اوپری حصے میں درد جو کہ آگے اور پیچھے کی جانب پھیلے۔

اوسی مم کینم (Ocimum Can)

30 چار گھنٹے بعد

☆ خونی پیشاب کے ساتھ دائیں گردہ کے اطراف میں مسلسل درد۔ گردہ کے ورم سوزش اور درد کے ساتھ ساتھ نمونیہ بھی ہو یا پھیپھڑوں کا نزلہ یا استقاء ہو۔

فاسفورس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x اور کالی میور 6x بھی مفید ادویات

ہیں۔

## مثانہ کی سوزش

### Cystitis

مثانہ کے مقام پر سخت خراش، دبانے سے تکلیف، گرانی اور درد ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے شنجی درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیپ یا خون آمیز مادہ خارج ہوتا ہے۔ پیڑو میں بھاری پن ہوتا ہے۔ پیشاب گہرے رنگ کا اور بدبو دار ہوتا ہے۔ شدید ورم مثانہ ہو تو بخار بھی ہو جاتا ہے۔ مٹی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار یہ سوزش رحم، پیشاب کی نالی اور گردوں تک پہنچ جاتی ہے۔ مثانہ کی شدید ورم یا سوزش کی تکلیف شاذ و نادر ہوتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ مثانہ کی سب سے بہترین دوا۔ پیشاب کی نالی میں شدید جلن پیشاب قطرہ قطرہ آئے۔ کیسترس 30 چار گھنٹے بعد

☆ پیشاب جلد جلد آئے۔ آخری قطرہ سے جلن ہو۔ پیشاب میں خون کی آمیزش ہو۔ ایک وقت میں چند قطرے ہی نکال سکے۔ پیاس نہ ہو۔

ایس ملنیکا 30 چار گھنٹے بعد

☆ پیشاب کرنے کی مسلسل کوشش۔ زور لگانا پڑے۔ جب پیشاب کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو درد نیچے کی جانب ران کی طرف بڑھے۔

پیرا براوا (Pareira brava) Q یا

6 چار گھنٹے بعد

☆ گاڑھا، کچڑ کی طرح خون اور البیومن ملا پیشاب۔ مثانہ میں سوزش اور کمزوری۔  
نیر - بستم 5-10 قطرے، چار گھنٹے بعد

☆ معاون دوا۔

میڈورینم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x کالی میور 6x اور کالی فاس 6x  
بھی مفید دوائیں ہیں۔

## مثانہ اور پیشاب کی نالی کی سوزش

### Affections of Bladder and Urethra

(See also Cystitis)

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ پیشاب کرنے کی مسلسل خواہش۔ پیشاب کم مقدار میں دودھیا اور گرم۔

للیئم نگرینم (Lilium tig) 30 یا 200، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ جلن دار درد۔ پیشاب قطرہ قطرہ آئے۔

کیسترس 30، تین گھنٹے بعد

☆ مثانہ کی سوزش۔ پیشاب گزارنا مشکل ہو جائے۔

کونیم میک 200، 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ مثانہ سے خون کا اخراج۔

رہس ایرویشکا 30، چار گھنٹے بعد

☆ جلن دار درد۔ آرام سے تکلیف بڑھ جائے۔ کھلی ہوا میں چلنے سے بہتر ہو۔

نیر - بستم 7-8 قطرے، چار گھنٹے بعد

☆ اعصابی پٹھوں کی سختی کے ساتھ مٹانہ میں درد۔ کمر اکڑی ہوئی۔ کمر کے بل لیٹنے سے درد کو آرام آئے۔

سٹرائکی ہینن (Strychnin) 3x یا  
30 چار گھنٹے بعد

☆ پیشاب کرتے ہوئے حشفہ میں جلن دار درد۔ شدید پیاس۔ اکثر اوقات پانی پئے لیکن تھوڑا تھوڑا سا۔

آرسنک البم 30 چار گھنٹے بعد

☆ مٹانہ میں پتھری۔ کمر میں تیز شدید درد۔

گلکیریا رنیل 30 اور ہائیڈر نیما Q  
تین گھنٹے بعد یکے بعد دیگرے

☆ مٹانہ کا فالج۔ جب کھانے یا چھینکے تو پیشاب کے قطرے نکل جائیں۔  
کاشی کم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ  
☆ بول الدم (پیشاب میں خون آتا) جبکہ کوئی بھی طبعی علامت موجود نہ ہو۔ مٹانہ کی کمزوری۔

بیلادونا 30 چار گھنٹے بعد

☆ مٹانہ اتنا کمزور کہ پیشاب کا اخراج بھی مشکل ہو۔ یا اخراج کی طاقت نہ رہے۔  
اوپیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ مٹانہ کا نیچے کی طرف سرک جانا یا گرنا۔

پائرس امریکاٹا 30 چار گھنٹے بعد

☆ مٹانہ بھرا ہوا محسوس ہو، لگاتار ایسا محسوس ہو کہ مٹانہ میں بھرا ہوا پانی یا پیشاب باہر نکل پڑے گا۔

سیپیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

مٹانے یا حشفہ سے خون کے اخراج کی وجہ سے درد کی صورت  
میں بائو کیمک کی فیرم فاس 3x چار چار گھنٹے بعد دینا بہت  
فائدہ مند ہے۔



## بخار (سادہ)

### Fever

(See Hyper-pyrexia and other relevant chapters also)

سادہ بخار عموماً "چوبیس سے باہر گھنٹے تک رہتا ہے۔ اگرچہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ وقت تک ہو سکتا ہے۔ عام طور پر اس بخار کے زیادہ برے اثرات نہیں ہوتے البتہ مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ بخار لرزہ یا کپکپی سے چڑھتا ہے۔ منہ خشک ہو جاتا ہے اور پیاس بہت لگتی ہے۔ نبض بھری ہوئی اور تیز چلتی ہے۔ جسم گرم اور جلد خشک ہو جاتی ہے۔ پیشاب مقدار میں کم اور رنگ دار آتا ہے۔ زبان سرخ ہوتی ہے یا سفیدی جمی ہوئی۔ بعض اوقات جسم خاص طور پر کمر میں درد بھی ہوتا ہے۔ بخار اترنے سے پہلے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ سادہ بخار عام طور پر موسم کی اچانک تبدیلی، بھیک جانے یا مرطوب جگہ رہنے سے ہوتا ہے۔ خراب غذا کھانے، چوٹ لگ جانے اور جسمانی اور دماغی تھکاوٹ سے بھی بخار ہو جاتا ہے۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ بخار کی صرف ٹھنڈی کیفیت میں پیاس۔

کیسکیم 30 دو گھنٹے بعد

☆ گرمی یا لو لگ جانے (Sunstroke) کی وجہ سے بخار۔

گلوٹائن 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ خشک ٹھنڈی ہوا لگ جانے کی وجہ سے بخار کا پہلا مرحلہ۔

اکونائٹ 30 یا 200 دو گھنٹے بعد

☆ چڑچڑاہٹ، سستی، بے حال۔ پلوں کے بھاری پن کے ساتھ بخار۔ کچھ بھی کام کرنے کو توجہ نہ چاہیے۔ ذہنی اور جسمانی تھکن۔

سلفورامید (Sulforamid) 30 چار

گھنٹے بعد

☆ زبان کی نوک سرخ، جسم میں شدید درد۔ شدید بے چینی۔ بھیک جانے کی وجہ سے بخار ہو جانا۔ حرکت کرنے سے بہتر محسوس کرے۔

روہس ٹاکس 30 یا 200 تین گھنٹے بعد



☆ جلن کا احساس۔ وقفے وقفے سے گھونٹ گھونٹ پانی پینے کی خواہش۔ شدید کرب اور بے چینی۔

☆ آرسنک الیم 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد مزاج میں تبدیلی پیدا ہوتی رہے۔ بے چینی کے ساتھ تیز بخار۔ کھلی ہوا میں بہتر محسوس کرے۔

☆ پلساٹیل 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد

☆ پیشاب کی نالی کی تکلیف یا زخم کی وجہ سے بخار۔ جلدی جلدی پیشاب کی حاجت ہو۔

☆ کیسترس 30 'چار گھنٹے بعد

☆ لمبے وقت کے بعد بڑی مقدار میں پانی پئے۔ شدید پیاس۔ تمام جسم میں درد۔ قبض۔ حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہو اور آرام کرنے سے کم ہو۔

☆ برائی اونیا 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد

☆ ناشتے کے فوراً بعد متلی۔ ہاتھوں میں جلن کا احساس سر درد۔ جسم میں درد۔ منہ کا ذائقہ خراب۔ صبح کے وقت ذائقہ زیادہ خراب ہو۔ ٹھنڈ کے ساتھ بخار۔ رات کے وقت طبیعت زیادہ خراب ہو۔

امورا رہوٹکا

☆ 30 (Amoora rohutika) 'چار

گھنٹے بعد

☆ پیاس ندارد۔ زبان صاف۔ بخار بے قاعدہ۔ متلی اور تے۔

☆ اپی کاک 30 'دو گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ ٹونسل یا گلے کے غدودوں کے درم کی وجہ سے بخار۔ تیز بخار کے ساتھ سرخ چہرہ۔

☆ بیلاڈونا 30 'تین گھنٹے بعد

☆ پٹنگ بخار۔ تیز بخار۔ نبض اور نمپرچر کے درمیان عدم توازن اور غیر متناسب۔

☆ پائیروجینم 200 یا 1M 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ پیاس ختم۔ خاموشی سے لیٹے رہنے کی خواہش۔ غڈحال اور ست۔ گدی سے اٹھنے والا سر درد۔ پیشاب کرنے کے بعد بہتر محسوس کرے۔

☆ جیلی میم 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد

☆ تمام جسم میں دکھن جیسے کسی نے مارا پیٹا ہو۔ خراش اور چھین کا سا احساس۔ کسی چوٹ

☆ جلن کا احساس۔ وقفے وقفے سے گھونٹ گھونٹ پانی پینے کی خواہش۔ شدید کرب اور بے چینی۔

☆ آرسنک الیم 30 یا 200 تین گھنٹے بعد مزاج میں تبدیلی پیدا ہوتی رہے۔ بے چینی کے ساتھ تیز بخار۔ کھلی ہوا میں بہتر محسوس کرے۔

☆ ہلماٹیل 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ پیشاب کی ٹالی کی تکلیف یا زخم کی وجہ سے بخار۔ جلدی جلدی پیشاب کی حاجت ہو۔

☆ کیسٹرس 30 چار گھنٹے بعد

☆ لمبے وقت کے بعد بڑی مقدار میں پانی پئے۔ شدید پیاس۔ تمام جسم میں درد۔ قبض۔ حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہو اور آرام کرنے سے کم ہو۔

☆ برائی اونیا 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ ناشتے کے فوراً بعد مٹلی۔ ہاتھوں میں جلن کا احساس سر درد۔ جسم میں درد۔ منہ کا زائقہ خراب۔ صبح کے وقت ذائقہ زیادہ خراب ہو۔ ٹھنڈ کے ساتھ بخار۔ رات کے وقت طبیعت زیادہ خراب ہو۔

☆ امورا روٹیکا

☆ (Amoora rohutika) 30 چار

☆ گھنٹے بعد

☆ پیاس ندارد۔ زبان صاف۔ بخار بے قاعدہ۔ مٹلی اور تے۔

☆ الپی کاک 30 دو گھنٹے بعد تین مرتبہ

☆ ٹونسل یا گلے کے غدودوں کے درم کی وجہ سے بخار۔ تیز بخار کے ساتھ سرخ چہرہ۔

☆ بیلاڈونا 30 تین گھنٹے بعد

☆ سٹیک بخار۔ تیز بخار۔ نبض اور نرسپنگ کے درمیان عدم توازن اور غیر متناسب۔

☆ پائیرو جینم 200 یا 1M 10 منٹ بعد

☆ تین مرتبہ

☆ پیاس ختم۔ خاموشی سے لیٹے رہنے کی خواہش۔ نڈھال اور ست۔ گدی سے اٹھنے والا سر درد۔ پیشاب کرنے کے بعد بہتر محسوس کرے۔

☆ بیلی میم 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ تمام جسم میں دکھن جیسے کسی نے مارا بیٹا ہو۔ خراش اور جھجھکاؤ کا احساس۔ کسی چوٹ

لگ جانے کی وجہ سے بخار۔

آرینیکا 30 یا 200 'آدھا گھنٹہ بعد' تین

مرتبہ

☆ سردی کے ساتھ بخار۔ زبان پر سفیدی جمی ہوئی۔ سر درد جس کو دبانے سے آرام آئے۔ ٹھنڈے پانی کی پیاس۔ بخار کے بعد بہت کمزوری۔ صبح 8 تا 10 اور دوپہر 2 تا 4 بجے تکلیف بڑھے۔

سیسا ہینیا بون

(Caesa Penlabon) 30 'چار گھنٹے

بعد

☆ پٹکھا کرانا یا ہوا لینا پسند کرے۔ گرمی کے مرحلے میں پیاس نثار۔ ٹھنڈے محسوس کرنے کے دوران ٹھنڈے پانی کی خواہش۔

کاربووٹیج 30 'آدھا گھنٹہ بعد' تین مرتبہ

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x اور کالی سلف 6x یکے بعد دیگر دو گھنٹے بعد چھ مرتبہ دینا بہت فائدہ مند ہے۔ بائیو کیمی نیشن نمبر 11 بھی مفید دوا ہے جو ہر دو گھنٹے بعد دینے سے بہتر نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

## ملیریا/بخار

### Malaria Fever

ملیریا بخار ایک قسم کے کرم کے زہر کے جسم میں سرایت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس بخار میں پہلے جاڑا چڑھتا ہے اور قریباً "چوبیس گھنٹے بعد بخار ہو جاتا ہے۔ سردی کا اثر پشت سے شروع ہو کر تمام جسم میں محسوس ہوتا ہے۔ کبھی اچانک سردی لگتی ہے۔ کھپکی ہوتی ہے اور دانت تک بجنے لگتے ہیں۔ اور مونے کپڑے اوڑھنے کے باوجود جاڑا رفع نہیں ہوتا ہے۔ شدید سردی کے احساس کا یہ مرحلہ اکثر ایک ڈیڑھ گھنٹے کا ہوتا ہے جس میں منہ خشک ہو جاتا ہے شدید پیاس لگتی ہے۔ لیکن اجتماع خون کی وجہ سے بعض دفعہ سردی کا یہ درجہ چار پانچ گھنٹے تک رہتا ہے۔ جب بخار اور سردی کی کئی باریاں آچکتی ہیں اور جسم میں سمیت کم ہو جاتی ہے تو سردی کا درجہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ ملیریا بخار کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔



مرض کے دوسرے درجے میں سردی کم ہونے سے مریض کو قدرے سکون ہوتا ہے لیکن اس کے فوراً بعد گرمی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اور تمام جسم گرم ہو جاتا ہے۔ گرمی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور مریض کپڑے اتار دیتا ہے۔ نبض بھری ہوئی اور تیز ہو جاتی ہے۔ بھوک مرجاتی ہے زبان اور منہ خشک ہوتا ہے اور شدید پیاس لگتی ہے۔ جی مٹلاتا ہے اور تے ہوتی ہے۔ پیشاب کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے اور مقدار میں کم ہوتا ہے۔ گرمی کے اس درجے میں بخار شدید ہوتا ہے اور درجہ حرارت 104 یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ گرمی کا یہ مرحلہ تین چار گھنٹے تک رہتا ہے اور گرمی کم ہونے لگتی ہے تو پسینے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔

شدید بخار کی کیفیت میں کرم لیبریا کے زہر کا اثر کم ہو جاتا ہے اور پہلے پیشانی اور چہرے پر پسینہ آتا ہے اور پھر تمام جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ اس طرح علامات بدلنے لگتی ہیں اور بخار بالکل اتر جاتا ہے۔ بعض کمزور مریضوں کو پسینے کے درجے میں خیند آجاتی ہے اور سو کر اٹھنے کے بعد وہ مکمل آرام محسوس کرتے ہیں۔

اکثر مریضوں میں مذکورہ تینوں درجوں کی علامات بڑی واضح ہوتی ہیں لیکن کچھ کو سردی کے بغیر بھی بخار ہو جاتا ہے۔ گرمی اور پسینے کے بغیر بخار اتر جاتا ہے۔ بعض مریض سخت بے چین ہوتے ہیں بعض بالکل خاموش پڑے رہتے ہیں۔ بعض کو سخت قبض ہو جاتا ہے اور بعض کو پاخانے آتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ مریض خاموشی سے لیٹا رہتا چاہے۔ ذرا سی بھی حرکت اور معمولی محنت سے کھٹا یا بدبو دار پسینہ آجائے۔ چڑچڑاہٹ۔ پاخانہ قبض کے ساتھ ہو۔ سینے اور تلی کے مقام پر چھین والا درد ہو۔ ٹھنڈ محسوس کرے مگر بہت زیادہ پیاس ہو۔ بیرونی طور پر ٹھنڈا۔ لمبے وقفے کے بعد ایک وقت میں زیادہ مقدار میں پانی پئے۔

برائی اونیا 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ ٹھنڈ محسوس کرنے سے پہلے پیاس محسوس کرے۔ ہر مرتبہ پانی پینے کے بعد ٹھنڈ محسوس کرے۔ ٹھنڈ کا احساس کمرے شروع ہو کر تمام جسم میں پھیل جائے۔ ٹھنڈ کے بعد گرمی محسوس کرے لیکن پیاس اور ٹھنڈا پسینہ نہ ہو۔

کیسی کم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد



☆ تکلیف کے بے قاعدہ دورے۔ گرمی محسوس کرنے کے دوران جسم بدبودار اور گرم پسینے سے شرابور ہو جائے۔

سورینم 200 یا 1M 10 منٹ بعد تین

مرتبہ

☆ بخار ہر دوسرے روز یا ہر ہفتے ہو جائے۔ ٹھنڈ سے پہلے پیاس لگے لیکن جیسے ہی ٹھنڈ محسوس کرنے لگے پیاس نثار۔ گرمی محسوس کرنے کے دورانی وقفے میں پیاس نثار جو پسینے کے دوران پھر ابھر آئے۔ حرکت کرنے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ گرمائش سے تکلیف میں افادہ ہو۔

چائنا 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ جب کسی دوا کی واضح علامات نظر نہ آرہی ہوں۔ (دورے بھی واضح نہ ہوں) تو اپنی کاک 30 کی چند خوراکیں علامات ظاہر کر دیں گی۔ (خصوصاً بیماری کو دبائے جانے کی صورت میں) کونین کے اثرات بد اور بیماری کے عود کر آنے کے اثرات بھی ضائع کرے گی۔ متلی، تنگی نفس اور تھکے کی علامات مرض کے تمام مراحل میں پائی جائیں۔ زبان صاف ہو۔

اپنی کاک 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ پیاس کے ساتھ کپکپی۔ پاؤں ٹھنڈے اور نم آلود۔ بخار کے بعد بہت شدید گرمی جس سے مریض بے حس ہو جائے اور کثرت سے پسینہ آئے۔ مزمن اور بگڑے ہوئے کیس۔ بیماری کے دورے بے قاعدگی سے پڑیں۔ کبھی گرمی اور کبھی ٹھنڈ کا احساس ہو۔ پسینہ کبھی جسم کے کسی حصے پر اور کبھی دوسرے حصے پر جگہ بدلتا رہے۔

سپیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ بیماری کے بدلتے ہوئے دورے۔ شام کے چار بجے بغیر پیاس کے ٹھنڈ کا احساس۔ بائیں جانب زیادہ پسینہ۔ بستر میں بہت گرمی محسوس کرے۔ کپڑا اتار دینے کی خواہش کرے۔ گرمی محسوس کرنے کے دوران پیاس لگے۔ ہونٹوں پر زبان پھیرے صرف پانی کے ساتھ۔ جب پسینہ آئے تو پیاس لگے۔

پلسائٹا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ ہڈیوں میں شدید درد جیسے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ بہت زیادہ پیاس۔ گرمی، ٹھنڈ اور پسینے کی ہر کیفیت میں پانی پینے سے متلی اور تھکے بڑھے۔ بعض دفعہ ٹھنڈ ختم ہونے کے ساتھ ہی متلی اور تھکے ہونے لگے۔ پسینہ آنے کے بعد بستر محسوس کرے لیکن سر درد کم نہ ہو۔ ذائقہ کڑوا۔ زبان پر پیلی سی میل جمی ہوئی۔

یوپیٹوریم پرفولیم 30 یا 200 چار گھنٹے

بعد

بست کثرت سے ہینڈ آنے کے بعد بیماری کی تمام علامات میں افادہ ہو سوائے سردی کے۔ شدید پیاس ٹھکن والے سردی کے ساتھ ٹھنڈ سے پہلے اور گرمی لگنے کے دوران۔ دن کے دس گیارہ بجے کے دوران دیر تک قائم رہنے والی سردی یہاں تک کہ ناخن اور ہونٹ تک ٹھنڈ کی شدت سے نیلے پڑ جائیں اور بست زیادہ کچکی بھی ہو۔

نیرم میور 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' چھ

مرتبہ

☆ شدید بے چینی۔ مسلسل پہلو بدلتا رہے۔ ٹھنڈ کا احساس ران میں شروع ہو اور کندھوں کے درمیان یا ایک کندھے کے جوڑ میں یا کمر کے کسی تھوڑے سے حصے میں جو کہ ریزہ کے اندر دوڑے۔ خشک تھکا دینے والی کھانسی ٹھنڈ کے احساس سے ایک گھنٹہ پہلے شروع ہو اور سردی لگنے تک کے عرصے میں جاری رہے۔ گرمی اور ٹھنڈ کا شدید احساس۔ جلد پر پتی یا دھا پڑ پڑ جائیں۔ پسینے کے دوران اور گرمائش سے بہتر ہو۔

رہس ٹاکس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ گرمی اور پسینے کا دورانیہ لمبا ہو جائے اور تھکا دے۔ گدی میں درد۔ پیٹھے اکڑ جائیں۔ اعصابی طاقت کمزور پڑ جائے۔ پیاس قریباً "ندارد۔ تمام حالتوں میں پیاس نہ لگے۔ زبردست کچکی۔ سردی کی لہر کمر اور ریزہ میں اوپر نیچے کو جائے۔ مریض چاہے کہ اسے کوئی پکڑ کر رکھے۔ مریض خاموشی سے لیٹ جانا چاہے اور سوتا چاہے۔ اوگھنے کی سی کیفیت ہو۔ ہینڈ ندارد۔ پیشاب کرنے کے بعد بہتر محسوس کرے۔

جیلی میم 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد'

☆ نبض اور بخار میں تناسب کا فرق۔ بے چینی۔ ٹھنڈ کا احساس کمر میں شروع ہو۔ بخار تیزی سے بڑھے۔ کثرت ہینڈ کے ساتھ سخت گرمی کا احساس۔ ہینڈ آنے کے باوجود بخار کم نہ ہو۔

پائیدو جینم 200 یا 1M '10 منٹ بعد'

تین مرتبہ

☆ یکے بعد دیگر ٹھنڈ اور گرمی کے دورے۔ شدید ٹھنڈ جو دیر تک جاری رہے۔ تمام کیفیات میں پیاس۔ ہینڈ کثرت سے آئے اور ٹھکن ہو جائے۔ کمر اور ریزہ میں درد۔ ٹھنڈ محسوس کرنے کے دورانیہ میں کمر درد زیادہ ہو۔ زبان صاف۔

چائنا سلف 1x اور اس سے اوپر کی

طاقتیں 'چار گھنٹے بعد' چھ مرتبہ

☆ دن رات سردی لگتی رہے۔ بڑی ہڈیوں میں درد کے ساتھ سخت لھنڈ محسوس کرے۔

ارینیا ڈیاڈما 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ گرمی، سردی اور پسینے کے دوروں میں بے قاعدگی۔ سردی نہ ہونے کے برابر۔ عام طور پر پینہ بھی نہیں آتا۔ سخت قسم کی بے چینی اور نہ بچنے والی پیاس۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوڑی مقدار میں پانی پئے۔ پینہ آنے کے بعد اور گرمائش سے بہتر ہو۔

آرسنک البم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ تکلیف کے باقاعدہ دورے۔ گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے انہیں اوقات میں۔ گرمی کے دوران گرم مشروب کی پیاس۔ چیرنے والے درد یا ٹانگوں میں یا تمام جسم میں سُن ہونے کا احساس گرمی کے دوران۔ آنکھیں سرخ۔

سینڈرون 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ پسینے کے بعد لھنڈ کا احساس۔ برف کی طرح لھنڈا۔ ایک پاؤں لھنڈا اور دوسرا گرم۔ گرمی کے مرحلے کے دوران گرم مشروبات کی خواہش۔ لھنڈی چیز پینے کے بعد تے ہو جائے۔ چار سے آٹھ بجے کے دوران تکلیف میں اضافہ ہو۔

لائیکوپوڈیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ لھنڈ پیاس کے ساتھ۔ گرمائش اور حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ بخار (گرمی) میں پیاس نہ ہونے کے برابر۔ پینہ کبھی کم کبھی زیادہ گرمی کے ساتھ۔

ایس ملنیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ بے قاعدہ گرمی، سردی اور پسینے کے دورے۔ لھنڈ کا احساس اور پیاس۔ گرمی یا بخار بغیر پیاس کے۔ گرمی کے دوران میں بجائے پانی پینے کے مریض ہوا لیتا چاہے۔ کبل سے ڈھانپنے کے باوجود ٹانگیں لھنڈی رہیں۔ کھٹا اور بدبودار بہت زیادہ پینہ۔

کاربووج 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ رات کے وقت بخار زیادہ۔ زبان پر سفیدی۔ مصالحہ دار اور اچار اور چٹ پٹی چیزوں کی خواہش۔ مریض سوتا چاہے۔ کسی وقت گیس کی شکایت کے ساتھ لھنڈ بھی محسوس کرے۔

انٹم کروڈم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ



☆ معاون دوا کے طور پر۔ مزمن یا پرانے کیس میں۔ جبکہ علامات واضح نہ ہوں۔ کچھ کے ساتھ ٹھنڈ۔ گرمی اور پیاس کے بغیر۔ ہتھیلیاں اور ٹکڑوں میں گرمی اور جلن۔

سلفر 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

ہائپو کیمک کی کالی فاس 6x نیڑم میور 12x اور نیڑم سلف

12x بھی مفید ادویات ہیں۔

دیگر اہم ادویات : فلورک ایسڈ، آرنیکا، کیلیڈیم، گلیریا

کارب، کاشی کم، کیمومیل، چیلی ڈونیم، سالمکس، فیرم آرس،

سانکا، آیوڈیم، سزامونیم، ورائزم الیم، وائے تھیا وغیرہ۔





# تپ محرقہ / میعاد بخار

## Typhoid fever

(See fever also)

تپ محرقہ کی میعاد عموماً "اکیس دن گنی جاتی ہے۔ اس بخار میں انتڑیاں زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ جسم پر خشکاش کی مانند سفید دانے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ دانے زیادہ تر پیٹ، پشت اور چھاتی پر نظر آتے ہیں۔ انتڑیوں میں سوزش ہو جاتی ہے۔ بدبودار پاخانے آتے ہیں۔ دہانے سے شکم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ مریض سخت کمزوری محسوس کرتا ہے۔ یہ بخار زیادہ تر موسم خزاں میں ہوتا ہے۔ اس مرض کے زمانہ خصانت میں مریض ست و کابل رہتا ہے۔ کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ کمر میں خفیف سا درد ہوتا ہے۔ سانس میں بدبو اور زبان سفید ہوتی ہے۔ مرض کے پہلے ہفتے میں بخار روز بروز تیز ہوتا جاتا ہے۔ پیاس زیادہ لگتی ہے۔ شکم بڑھ جاتا ہے۔ بڑی انتڑیوں کے مقام کو دہانے سے انگلیوں کے نیچے گزر گڑا ہٹ کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ چھٹے روز جسم پر سفید رنگ کے باریک باریک دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔ مرض کے دوسرے ہفتے میں بخار تیز ہو جاتا ہے پاخانے زیادہ آتے ہیں۔ مریض سخت کمزوری محسوس کرتا ہے۔ تیسرے ہفتے میں کمزوری انتہا درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ ہوش و حواس تک متاثر ہو جاتے ہیں۔ عموماً "پیشاب رک جاتا ہے۔ پاخانہ خود بخود نکل جاتا ہے۔ البتہ بخار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور عام طور پر اکیس دن کے بعد اتر جاتا ہے۔ اگر تپ محرقہ کی صحیح تشخیص اور علاج نہ کیا جائے تو شدید کمزوری اور نقاہت کے سبب موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا مریض کے لواحقین اور معالجین کو خصوصی توجہ دینی چاہئے اور ذرہ برابر بھی لاپرواہی سے علاج میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے۔

ثانی فائدہ کے حملے کے ابتدائی یا پہلے مرحلے کے لئے

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ اگرچہ مریض کو ٹھنڈ لگ رہی ہو لیکن بند اور گرم کمرے میں رہنا بھی برداشت نہ کر سکے۔ زبان سفید ہو۔ پیاس نہ ارد۔ آسانی سے اور معمولی بات پر رونا شروع کر دے۔ جیض میں بے قاعدگی ہو (یہ دوا عموماً خواتین کے لئے ہے)

ہلکا ٹیلا 30 چار گھنٹے بعد

☆ مریض بہت زیادہ افسردہ اور رنجیدہ ہو۔ تھیلین یا خراش سی محسوس کر رہا ہوں۔ مدہوشی

اور غفلت میں ہو۔ بات کرنے کرتے سو جائے۔ بستر سخت محسوس ہو۔ بے حس اور بے پروا سا ہو۔

آرنیکا 6 یا 30، تین گھنٹے بعد

☆ بہت زیادہ اعصابی اور پھوس کی لاغری۔ مریض خاموش پڑا رہنا چاہے۔ اونگھ سی ہو۔ پٹھے مریض کے مطابق کام نہ کریں۔ پیاس نہ ہونے کے برابر بالکل ہی نہیں۔ پاخانہ معمول کے مطابق البتہ پیشاب کثرت سے آئے۔ پلکیں جھکی ہوئی۔

جیلی میم 6 یا 30، تین گھنٹے بعد

☆ چہرہ سرخ اور چمکتا ہوا۔ تیز بخار۔ ٹھنڈ محسوس کرے۔ کپڑا اوڑھنا پسند کرے۔ کمزور اور حساس اور چڑچڑا ہو۔ (عام طور پر مردوں کے لئے)

نکس دامیکا 6 یا 30، چار گھنٹے بعد

☆ مریض بہت کمزوری محسوس کرے۔ لاغر ہو۔ سر درد ہو۔ کمر اور ہاتھ پاؤں میں بھی درد ہو۔ حرکت کرنے سے تکلیف میں اضافہ۔ زبان پر سفیدی جمی ہو۔ ہونٹ خشک اور پھٹے ہوئے۔ پیاس نثار یا پیاس ہو تو لمبے وقفے کے بعد کافی مقدار میں پانی پئے۔ قبض ہو۔ منتشر فہم جس میں کاروبار کے خواب آئیں۔ قلت پیشاب۔ پیشاب کی رنگت گہرے سبز رنگ کی۔

برائی ادوینا الہم 6 یا 30، تین گھنٹے بعد

☆ سخت تھکا ماندہ مریض۔ جسم میں خراشدار دکھن۔ مریض بات کرتے کرتے سو جائے۔ مذبذب الحواس سا۔ نشے کی حالت کا سا تاثر دے۔ میل کے ساتھ زبان پر سفیدی کی واضح قسم کی لکیریں۔ شروع میں سرخ اور فوراً ہی بھورے رنگ میں تبدیل ہو جائیں۔ کنارے سرخ ہوں۔ پتلے پاخانے۔ مریض ایسا محسوس کرے کہ جسم کے اعضاء منتشر ہو گئے ہیں۔ انھیں آپس میں ملانے کے لئے مریض ادھر ادھر کی کروٹیں بدلے۔ پیشاب قلیل مقدار میں گہرے رنگ کا اور بدبودار۔

ہیپسیا Q یا 30، تین گھنٹے بعد

☆ لا تعلق اور نیم پاگل مریض۔ بے حسی کی حالت۔ بے سدھ اور سیدھا لیٹا رہے۔ بات کرنا پسند نہ کرے۔ بغیر درد کے پاخانے۔ پیٹ میں کھچاؤ کے ساتھ پانی کی طرے پٹے سفید اور پیلے رنگ کے پاخانے۔ مرد ہو۔ (عام طور پر شادی شدہ مردوں کی دوا)

ایسڈ فاس 6 یا 30، چار گھنٹے بعد

☆ پاخانے آئیں۔ زبان گتے کی طرح خشک۔ زبان کی نوک سرخ ہو غنودگی، بے حسی اور

لاغری اور بڑبڑاہٹ۔ بے چینی۔ حرکت کرنے سے بستر محسوس کرے۔ مریض کو نہیں بدست  
اور ایک حالت میں نہ رہے۔

رہس ٹاکس 6 یا 30 تین گھنٹے بعد

## مہلک کیسوں کے لئے

☆ کمزوری کی وجہ سے مریض بستر میں مسلسل کرو نہیں بدلتا رہتا ہے۔ افسردہ غمگین اور رونی  
طبیعت رہتی ہے۔ نچلا جڑا کر جاتا ہے۔ زبان بہت زیادہ سکڑی ہوئی سی محسوس ہوتی ہے۔  
نبض کمزور اور ٹوٹ ٹوٹ کر چلتی ہے۔ ہر تیسری نبض میں وقفہ آتا ہے۔ غیر ارادی خون  
ملے پاخانے ہوتے ہیں۔

ایسڈ میور 30 تین گھنٹے بعد

☆ مریض غفلت اور مدہوشی کے عالم میں رہتا ہے۔ بڑبڑاتا ہے۔ بڑی حد تک بے حس و  
حرکت ہو جاتا ہے۔ سوتے ہوئے منہ کھلا رہتا ہے۔ زبان خشک اور سرخ گہری رنگت کی  
ہوتی ہے۔ کپکپی ہوتی ہے اور نچلے جڑے کو پکڑتا پڑتا ہے۔ پاخانہ بدبودار ہوتا ہے۔ اگر خون  
آجائے تو گہرے رنگ کا کھلا کھلا سا ہوتا ہے۔ بندھا ہوا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کٹا ہوا بھوسا  
ہو۔ گلے اور چھاتی کی کوئی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے۔ نیند بے قاعدہ ہوتی ہے۔

لیکے کس 30 تین گھنٹے بعد

☆ مریض بیماری سے بالکل نڈھال ہو چکا ہوتا ہے۔ مایوسی اور لاغری ہو جاتی ہے۔ خون پٹنا  
ہوا ہوتا ہے۔ مفلوج یا ادھرنگ کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ طبیعت انتہائی ست اور بے  
حس ہوتی ہے۔ چہرے پر مردنی اور ہیلاہٹ چھا جاتی ہے۔ چہرہ لٹکا ہوا اور لٹنڈا ہوتا ہے۔  
منہ ناک یا مقعد سے خون بھی خارج ہو سکتا ہے۔ معدے میں کھچاؤ اور تھوہ ہوتا ہے۔  
معدے میں ہوا بھر جاتی ہے اور گڑگڑاہٹ ہوتی ہے۔ غیر ارادی طور پر پاخانے لگ جاتے  
ہیں۔ سینے میں بلغم کی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے۔ بلغم سے سینہ بھر جاتا ہے۔ دوران خون کمزور ہو  
جاتا ہے۔ شریانوں میں اجتماع خون ہو جاتا ہے۔ چہرے کی رنگت نیلی پڑ جاتی ہے۔ ہونٹ  
اور زبان بھی نیلے ہو جاتے ہیں۔ لٹنڈے پسے آتے ہیں۔ زیادہ آکسیجن حاصل کرنے کے  
لئے مسلسل ہوا میں رہنا چاہتا ہے۔

کاربووٹیج 30 (کاربووٹیج کے بعد چائنا

بستر کام کرتی ہے) آدھے گھنٹے بعد

☆ تمام خارج ہونے والی رطوبات اور مادے بدبودار ہوتے ہیں۔ نبض کی حرکت درج  
حرارت کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ زبان سرخ ہو جیسا کہ کچا گوشت ہو۔ آگ کی سی



رنگت کی سرخ زبان ہوتی ہے۔

پائرو جینم 6 یا 30، آدھے گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ صحت بالکل گر چکی ہوتی ہے۔ شدید قسم کی لاغری اور نفاہت ہو جاتی ہے۔ قوت حیات انتہائی کمزور ہو جاتی ہے۔ بے چینی اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اعضا اور سر مسلسل حرکت کرنے یا ملنے لگتے ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے گردن لڑھک جاتی ہے۔ زبان خشک اور سرخ ہوتی ہے یا پھٹی ہوئی کالی سی رنگت کی اور اکڑی ہوئی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ذرا ذرا سی مقدار میں پانی پینے کی پیاس لگتی ہے۔ معدے میں جلن ہوتی ہے۔ پانی کی طرح پتلے بھورے رنگ کے پاخانے آتے ہیں، جس میں خون بھی شامل ہو سکتا ہے۔ آدھی رات کے وقت تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔

آرسنک البم 30، آدھے گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x اور کالی فاس 6x اور کالی میور 12x بھی مفید ادویات ہیں۔





## نمونہ

### Pneumonia

تکلیف کے شروع میں لرزہ کے ساتھ بخار چڑھتا ہے اور قریباً "آٹھ نو دن تک بخار ہوتا ہے۔ پسلیوں اور بغل کے پاس ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے۔ اس مرض میں ہیسٹروں میں درم ہو جاتا ہے۔ اکثر ایک ہیسٹر متاثر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار دونوں ہیسٹروں میں درم آجاتی ہے اس کا ڈبل نمونہ کہا جاتا ہے۔ بائیں ہیسٹرے کی نسبت دائیں طرف کے ہیسٹرے کا نمونہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہیسٹرے متاثر ہونے کی وجہ سے اصل حالت کی نسبت سانس دوگنی بلکہ گھٹی تیزی سے آتا ہے۔ خشک کھانسی ہو جاتی ہے اور کھانستے ہوئے سینے میں درد ہوتا ہے۔ اگر نمونہ کے ساتھ پلورسی بھی ہو تو درد کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور کھانسی تر ہو جاتی ہے۔ اور زردی یا سبزی مائل بلغم اور خون کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ متورم ہیسٹرے کی جانب والا رخسار زیادہ سرخ ہوتا ہے۔ زبان خشک کانٹے دار اور کھردری ہو جاتی ہے۔ مریض بہت زیادہ نقاہت محسوس کرتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ ہیسٹروں کے بہت زیادہ ٹھوس ہو جانے کی وجہ سے سانس لینے میں دقت ہو۔ شدید تنگی و نفس ہو۔

لائیکو پوڈیم 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ بہت زیادہ صفرا بننے کی وجہ سے۔ چیچک کے بعد مزمن کھانسی یا کالی کھانسی۔

چیلی ڈونیم 6 یا 30 تین گھنٹے بعد

☆ جب ہیسٹرے ٹھوس ہو جائیں۔

آپوڈیم 30 تین گھنٹے بعد

☆ سرد خشک ہوا لگ جانے کی وجہ سے تیز بخار کے ساتھ۔ بلغم چمکیلا سرخ۔ بے چینی اور اضطراب۔

اکونائٹ 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ زنگ کے سے رنگ کا بلغم۔ جب زخم سے خشک رطوبت کا اخراج ہونے لگے۔ شدید پیاس اور قبض ہو۔ حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

برائی ادویا الیم 30 یا 200 چار گھنٹے

بعد تین مرتبہ

☆ صحت یاب ہونے کے بعد بھی ہچسپروٹے پر کوئی دھبا باقی رہ جانے کی صورت میں پیاس  
نہاورد۔ مریض کھلی ٹھنڈی ہوا میں بہتر محسوس کرے۔

ہلکا ٹیلا 30' چار گھنٹے بعد "تین مرتبہ  
☆ جب ہچسپروٹوں کی نالی کی ٹھنڈ یا سوزش نمونیہ میں تبدیل ہو جائے۔ سینے میں سخت  
کمزوری کا احساس یا زبان پر سفیدی جمی ہو۔

انٹرم ٹارٹ 30 یا 200' 10 منٹ بعد  
تین مرتبہ

☆ سینے میں سخت کمزوری محسوس ہو۔ بلغم کا ذائقہ میٹھا سا ہو اور اس پر کھیاں کچی چلی  
آئیں۔

سینم ٹیلیکم 30 یا 200' تین گھنٹے بعد  
☆ چھپچاپا بدبودار کثیر مقدار میں بلغم آئے۔ پیپ کی طرح کا جس میں خون کی دھاری سی بھی  
ہو۔ سینے میں ٹھنڈک۔ سینے میں پھرنے اور چبھنے والے درد ہوں۔ صبح 3 تا 4 بجے تکلیف  
میں اضافہ ہو۔

کالی کارب 30 یا 200' چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ جب ہچسپروٹوں کی بافتوں کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے۔ مریض تازہ ہوا کی خواہش  
کرے۔ اگرچہ جسم ٹھنڈا ہو اس کے باوجود پچھلے کی ہوا لینا پسند کرے۔  
کاربووٹیج 30 یا 200' تین گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ ہچسپروٹوں کی نالی کا نمونیہ۔ خشکی کھانسی کے ساتھ ۲۔ زبان صاف ہو۔  
اپنی کاک 30' تین گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x اور کالی فاس 6x بھی مفید

ادویات ہیں۔



# تپدق

## Tuberculosis

تپدق کے اسباب میں ٹیوبرکل جراثیم کے علاوہ گردوغبار اور مٹی کے جرم بھیسروں تک پہنچنا، نمونیا، برونکائٹس، ناکانی اور خراب غذا، گندہ ماحول اور مہروٹی اثرات شامل ہوتے ہیں۔ اس مرض کی علامات محنت کے بعد سانس پھول جانا، کھانسی، خون کی آمیزش، تیز نبض، بخار اور کمزوری ہیں۔ مرض کے شروع میں ہلکی سی خشک کھانسی ہوتی ہے۔ نسل کی ہڈی کے نیچے اور اوپر درد محسوس ہوتا ہے۔ بد ہضمی اور قبض ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن بڑھ جاتی اور نبض تیز ہو جاتی ہے۔ خشک کھانسی کے بعد بلغم آنے لگتا ہے، جس میں خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے یا کھانسی کے ساتھ خاصا خون بھی خارج ہوتا ہے۔ تپدق کے بلغم کو ٹیسٹ کرنے کے لئے پانی میں ڈال کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بلغم تیرتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے۔ اگر بلغم نہ نشیں ہو جائے تو یہ تپدق کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن تھوک کا معائنہ کرانے سے سل کے جراثیم پائے جانے کی صورت میں صحیح تصدیق ہو سکتی ہے۔ تپدق کے تین مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے اور دوسرے مرحلے میں جبکہ مریض کو ہلکا بخار، کھانسی اور بلغم وغیرہ کی علامات پائی جائیں تو اس مرض کا علاج "نبتا" آسان ہوتا ہے۔ البتہ اگر لاپرواہی برتی جائے اور مرض تیسرے مرحلے میں داخل ہو جائے تو علاج دیر طلب اور مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس مرحلے میں بھیسرے بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہوتے ہیں۔ بھوک بالکل مرجاتی ہے۔ رات کو بخار تیز ہو جاتا ہے۔

بلغم میں پیپ اور خون آنے لگتا ہے۔ پسینے سے مریض شرابور ہو جاتا ہے۔ چھاتی اور پیٹ پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ دست آنے لگتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں پر درم آجاتی ہے۔ مریض انتہا درجے کمزور ہو جاتا ہے۔ صحیح تشخیص اور علاج نہ ہونے کی صورت میں موت واقع ہو جاتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ اچھا کھانے پینے کے باوجود وزن کم ہوتا جائے اور مریض لاغر ہو۔

آیوڈیم 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ بھیسروں کے پردے کی سوزش۔ چھیننے والے درد پلکوں کے اوپر استقا اور سوجن۔ مریض رات کو تین بجے زیادہ تکلیف محسوس کرے۔

کالی کارب 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

- ☆ ہیمہروں کے پھوڑے اور دنبل کی وجہ سے کھانتے ہوئے تیز اور ٹیکھی ہو آئے۔  
 کیسی کم 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ سل یعنی ہیمہروں سے خون آئے۔ مریض برف کی طرح ٹھنڈی چیزوں کی خواہش کرے۔

فاسفورس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی کالی فاس 6x نیڑم فاس 6x اور میگنیا فاس 6x بھی مفید ادویات ہیں۔

دیگر اہم ادویات : سلفر، کلکیریا کارب، ٹوبر کو لینم، سلیسیا، ڈروسرا، تھیرئیڈیان، آرسنک آیوڈیم، برومیم، مرک سال، برٹا کارب، سپیا سافائٹم، بیسی لینم وغیرہ۔

## لال بخار

### Scarlet fever

(See fever also)

یہ متعدی قسم کا بخار ہوتا ہے۔ اس میں گلے میں سوجن ہو جاتی ہے اور بخار ہونے کے دو تین دن بعد جسم پر سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ عموماً یہ بخار بچوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں ہاتھ پاؤں اور سر میں خاص طور پر زیادہ درد ہوتا ہے۔ طبیعت میں سخت بے چینی ہوتی ہے۔ بچوں میں ہڈیان اور تشنج بھی ہو جاتا ہے۔ سانس لینے اور نکلنے میں گلے کے درم کی وجہ سے دقت ہوتی ہے۔ پانچویں چھٹے دن بخار اتر جاتا ہے اور دھبے مرجھا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ جسم سے بھوسی کی مانند بور جھڑنے لگتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ لال بخار کی سب سے اعلیٰ دوا۔  
 بیلاڈونا 30 تین گھنٹے بعد
- ☆ لال بخار کے ساتھ کبھی ایک جانب اور کبھی دوسری جانب درد ہو۔  
 لیک کنائٹم 30 یا 200 تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ



☆ بخار کے ساتھ سخت بے چینی۔ زبان کی نوک سرخ اور خشک ہو۔

رہس ٹاکس 30 تین گھنٹے بعد

☆ صحیح طور پر دانے نہ نکلے ہوں اور بخار مسلک قسم کے لال بخار میں تبدیل ہو رہا ہو۔ جس سے دماغ کے فالج کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ جسم سرخ ہو جائے۔ گلے کی سوجن کے ساتھ مسلک پن۔

امونیا کارب 30 تین گھنٹے بعد

☆ ضدی اور مزمن کیسوں کے لئے معاون دوا۔

سورنیم 200 تین گھنٹے بعد تین مرتبہ

☆ خون کی سمیت کے کیس۔ نبض تیز اور ڈھیلی۔ شدید پڑمردگی یا نڈھال پن۔

میورک ایسڈ 30 تین گھنٹے بعد

لال بخار کے لئے جس میں جلد گرم خشک ہو بائو کیمک کی

فیرم فاس 6x تین گھنٹے بعد دینا مفید ہے۔

## ڈینگو (ہڈ توڑ) بخار

### Dengue Fever

یہ بخار عموماً "یکایک چڑھ جاتا ہے۔ اس میں جسم کی ہڈیوں اور جوڑوں میں سخت درد ہوتا ہے۔ درد ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ مریض نہایت کمزور اور بے چین ہو جاتا ہے۔ تیسرے روز تمام جسم پر سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات بخار تیز ہو کر 105 درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ دو روز کے بعد دھبے غائب ہو جاتے ہیں اور بخار اتر جاتا ہے۔ دو چار دن مریض اچھا رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر بخار چڑھ جاتا ہے اور پھر سے پہلی جیسی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس طرح بخار کے دو تین دورے پڑ کر قریباً "آٹھ دن کے اندر مریض شفا یاب ہو جاتا ہے لیکن اس دوران مریض بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ پٹھوں کے درد اور بے چینی کے ساتھ بخار۔ حرکت سے آرام محسوس ہو۔

رہس ٹاکس 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ کمر میں کبھی نیچے کی جانب اور کبھی اوپر ٹھنڈک کا احساس۔ اعصابی سوزش اور جھکن۔

طبیعت ست۔ سر بھاری۔

جیلی میم 30 تین گھنٹے بعد

☆ ہڈیوں کی گہرائی تک شدید درد کے ساتھ بخار۔ پسینہ آنے سے بہتر ہو۔  
 ☆ یوپیٹوریم پرفولیم 30' تین گھنٹے بعد  
 ☆ اونچے درجے کا بخار۔ شدید بے چینی اور تھکن۔ نہ بچنے والی پیاس۔ جلدی جلدی پانی کے گھونٹ پئے۔

☆ آرسنک البم 30' تین گھنٹے بعد  
 ☆ صفرا کی زیادتی۔ گھٹنے بڑھنے والا بخار۔ ٹھنڈ اور گرمی محسوس کرنے کے دوران اور پہلے پیاس محسوس کرے۔ تے کے بعد بہتر محسوس کرے۔

☆ ٹائٹس (Nyctanthus) Q یا  
 30' تین گھنٹے بعد  
 ☆ پھاڑنے اور پھیلنے والا سردرد۔ تمام جسم میں درد۔ شدید پیاس۔ پاخانہ قبض کے ساتھ۔ حرکت کرنے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

برائی اونیا 30 یا 200' تین گھنٹے بعد  
 بائیو کبی نیشن نمبر 11 چار گھنٹے بعد دینا بھی مفید ہے۔

## پیپ یا زہریلے مادے سے آنے والا بخار

### Septicaemia

(Blood Poisoning)

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ کسی زہریلے مادے یا گلے سڑنے کی وجہ سے بخار۔ جس میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ذرا ذرا سا پانی پینے کی خواہش ہو۔ شدید بے چینی اور فکر مندی ہو۔ جلن کا احساس ہو اور پیپ دار مادہ خارج ہو۔

☆ آرسنک البم 30' تین گھنٹے بعد  
 ☆ کسی آپریشن کے بعد زہریلے مادے یا پیپ کی وجہ سے بخار آ جائے۔ جسم سے حیاتی مادے خارج ہو جائیں۔ جسم ٹھنڈا ہو اور ہوا کی خواہش کرے۔  
 کاربووج 30' تین گھنٹے بعد

☆ شدید قسم کی لاغری اور کمزوری ہو۔ خاص طور پر کسی لمبے عرصے کے بخار جیسے ٹائی فائڈ وغیرہ میں۔ پٹھے ورم آلود ہوں۔ بے چینی ہو۔

پیشیا 6 یا 30 ' چار گھنٹے بعد۔

☆ خراش وغیرہ کی وجہ سے بخار آجائے۔ بستر بہت سخت محسوس ہو۔ شدید بے چینی اور خراش دار درمیں ہوں۔

آرنیکا 200 یا 1M ' چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ جب چونٹوں کی وجہ سے رگیں اور نیس نیلی پڑ جائیں اور بخار 105 درجے تک چلا جائے۔ بچے کی پیدائش کے بعد رحم سے زخم پھیلنا شروع ہو جائے۔

اپچی نیسا Q یا 30 ' دو گھنٹے بعد

☆ پیپ یا زہریلے مادہ کی وجہ سے بخار آئے۔ نبض تیز ہو۔ نمبر پچر کے تناسب سے نبض زیادہ تیز چلے۔ رطوبات کا اخراج زیادہ اور تیز ہو۔

پارو جینم 200 ' 10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ مریض ذرا سا بھی چھوئے جانے سے حساس ہو۔ کپڑوں تک کا لگنا برداشت نہ کر سکے۔ سونے کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو۔ خراش دار اور گوشت یا نسج کو چیرنے والے زخم ہوں۔ گوشت خور پھوڑا۔ نیس گلنے سڑنے لگیں اور تیز اونچے درجے کا بخار ہو۔

لیکے سس 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

بایو کیمک کی کالی فاس 6x بھی مفید دوا ہے۔





## پرسوت کا بخار

### Peurperal Fever

پرسوت کا بخار زچگی کے دوران یا اسقاط حمل کے بعد خون میں عفونی مادہ جذب ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس بخار کا ایک زچہ سے دوسری زچہ کو لگ جانے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اگر آنول ٹھیک طور سے علیحدہ نہ کی جاسکے یا خون کے لو تھڑے جنین رحم میں سڑ جائیں یا اوزاروں یا دایہ کی انگلیاں لگ جانے سے رحم میں زخم ہو جائیں تو پرسوت کا بخار ہو جایا کرتا ہے۔ اس مرض میں بچے کی پیدائش سے تین چار دن کے بعد زچہ کو ہلکی سردی کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے اور بخار کا درجہ 103 سے 105 تک پہنچ جاتا ہے۔ نبض کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ شکم پھول جاتا ہے اور رحم کے مقام پر درد ہوتا ہے۔ سر میں درد ہوتا ہے۔ چہرہ تھما جاتا ہے۔ آنکھوں میں چمک سی آجاتی ہے۔ شدید پیاس لگتی ہے۔ چھاتیوں میں دودھ نہیں بنتا۔ رحم سے تھوڑی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ بعض اوقات زچہ اپنے بچے اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ بخار کی ابتدا میں جبکہ بخار تیز ہو۔ بہت گھبراہٹ اور بے چینی ہو۔ شدید پیاس۔ مریض بے چینی میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتی ہے۔ جلد اور جسم خشک ہو۔

اکونائٹ 3x یا 30 ہر ایک گھنٹہ بعد

☆ مریض کے کمر اور اعضاء میں دردیں۔ عضلات دکھے ہوئے۔ بے ہوشی اور بڑبڑاہٹ۔ شدید بے چینی خاص طور پر آدھی رات کے بعد۔ زبان کے کونے پر نکونی شکل کا نشان۔ مریض ڈرے کہ اسے دوا میں زہر نہ دے دیا جائے۔

رہس ٹاکس 3x یا 30 دو گھنٹے بعد

☆ زبان اور منہ خشک۔ پاخانہ سخت اور خشک۔ قبض۔ نفاس (بچے کی پیدائش کے بعد پندرہ سے چالیس روز تک اندام نہانی سے خارج ہونے والا خون) بند ہو چکا ہو۔ سینے میں دباؤ اور گولی لگنے کی سی دردیں۔ پستان اکڑے ہوئے ہوں۔ شدید سر درد متلی اور شدید پیاس ہو۔ حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

برائی اونیا 3x یا 30 دو گھنٹے بعد



☆ مریض کی جلد حرارت سے جلتے۔ سمیت خون کا خدشہ ہو۔

پائی رو جینم 30 یا 200 'صبح و شام  
(صرف ایک دن)

☆ آنول کا بدبودار مواد خارج ہو رہا ہو۔ سخت بے چینی اور بے آرامی۔ چہرہ تھمٹایا ہوا۔ سر  
میں اجتماع خون۔ آنکھ کی پتلیاں پھیلی ہوئی۔

بیلادونا 3x یا 30 'ایک یا آدھا گھنٹہ

بعد

☆ مریض کو تشنج اور کپکپی ہو۔ نفاس رک گیا ہو یا خون کے چھوٹے چھوٹے لوتھڑے خارج  
ہو رہے ہوں۔ پستانوں میں ڈنک مارنے کی سی درد۔

سی سی فوگا 1x یا 'Q دن میں دو تین

مرتبہ

☆ جسمانی بے چینی کی نسبت دل زیادہ بے چین ہو۔ جسم تھکا ماندہ۔ کروٹیں بدلے۔ سخت  
قسم کی نفاہت اور لاغری ہو۔ آنکھیں بوجھل۔ زبان کے درمیان میں بھوری سی لکیر ہو۔  
بدبودار تنفس۔ جسم سے خارج ہونے والے مادے (پیشاب پاخانہ) نہایت بدبودار۔ تپ  
محرکہ کی سی علامات پائی جائیں۔

پیشیا 3x یا 'Q ایک گھنٹے بعد



# جلدی امراض

## Skin Disorders

(See Eczema, Psoriasis, Scabies, Abscess and boils etc)

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ کھانے کی شدید اور لگاتار خواہش جس کے نتیجے میں جلد سے خون آنے لگے۔  
آرم نرائفلیم 30' چھ گھنٹے بعد
- ☆ چونوں میں پیپ پڑ جائے۔ مریض چھونے سے اور ٹھنڈ سے بہت حساس ہو۔  
ببیر سلف 30' چھ گھنٹے بعد
- ☆ جلدی شکایات کے ساتھ جسم اور فضلے میں سخت بدبو ہو۔  
پارو جینم 200' 10 منٹ بعد، تین مرتبہ
- ☆ ناقابل برداشت کھلی۔ کھلانے سے آرام آئے لیکن جلن شروع ہو جائے۔  
سلفر 30 یا 0/5' چار گھنٹے بعد
- ☆ جلد پھٹ جائے۔ اگیزیے سے پانی رے۔ قبض ہو۔  
گریفائٹس 30 یا 0/5' چار گھنٹے بعد
- بایو کیمک کی بایو کبی نیشن نمبر 20 چار گھنٹے بعد دینا مفید ہے۔

H/DR. S. M. ZAFFAR  
B.Sc. D.H.M.S. R.H.M.P.  
Ex-Lecturer G.H.M. College

# سرخ باد

## Erysipelas

سرخ باد جلد کے اوپر زنجیر دار بکٹریا کی وجہ سے پیدا ہونے والی سوزشی دانے ہوتے ہیں۔ اس کی خاص علامات بخار۔ ٹھنڈ، سر درد، تپ اور گرم جلد ہوتا ہیں۔ مرض کی علامات جلد کے نیچے نشوز (نسبج) میں سوجن یا استسقا سے ظاہر ہوتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ جب پھنسیاں پھوڑے رسولی میں تبدیل ہو جائیں۔ اور زخم نہ بھرے۔ پھنسیوں پھوڑوں اور زخم میں بڑی مقدار میں پیپ پڑ جائے۔

ہیپوزینیم (Hipozaeninum) 30  
چار گھنٹے بعد

☆ ایسے مریض جو نرم خو مگر چڑچڑے ہوں۔ آسانی سے رو دیں۔ ہمدردی اور کھلی ہوا کے آرزومند ہوں۔ پیاس ندارد۔ گرمی سے تکلیف بڑھ جائے۔

ہلسائٹلا 30 چار گھنٹے بعد

☆ پھنسیاں سوجی ہوئی۔ تمام جسم پر خراش اور رگڑ کا سا احساس۔ بستر بھی بہت سخت محسوس ہو۔

آرنیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ جب پھنسیاں پھوڑے، رسولی یا ناسور میں تبدیل ہو جائیں۔ خراشدار رطوبت۔ پھنسیوں میں جلن۔ گرمی سے بہتر محسوس کریں۔ پریشانی، بے چینی اور پشیمانی۔

آرسنک البم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ ناسوری سرخ باد۔ ٹھنڈ سے بہتر محسوس ہو۔

ہشیا 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ بیدار شفاف رطوبت کے ساتھ سرخ باد۔ رات کے وقت بخار۔ پاخانہ سخت اور قبض کے ساتھ۔

گریفائٹس 30 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ جب پھنسیاں اچانک غائب ہو جائیں۔ کھچاؤ اور تباؤ اکڑاؤ کے دورے شروع ہو جائیں۔

کوپرم میٹلیکم 30 چار گھنٹے بعد

☆ سوجن اور استقا کے ساتھ علامات۔ جلد چمکدار اور زرد۔ چھن اور جلن دار درد۔ پلکیں سوچی ہوئی۔ ٹھنڈ سے اچھا محسوس کرے۔ گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

ایس ملنیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ ہموار پھنسیاں۔ چمکدار سرخ۔ جلد سخت گرم اور خشک۔ تپکن والا درد۔

بیلارڈونا 30 تین گھنٹے بعد

☆ ارغوانی، دھبوں والی پھنسی۔ سونے کے بعد تکلیف میں اضافہ۔ بکواسی، وہی اور حاسد قسم کا مریض۔ گلے پر معمولی سا چھوا جانا بھی برداشت نہ کر سکے۔

لیکے سس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ ٹھنڈی خشک ہوا لگ جانے سے اچانک پھنسیاں ہو جائیں۔ تیز بخار۔ شدید بے چینی۔ موت واقع ہونے کا خطرہ۔

اکونائٹ 30 یا 200 دو گھنٹے بعد

☆ بہت زیادہ حساس حتیٰ کہ ذرا سا چھوا جانا تک برداشت نہ کرے۔ ہوا کا جھونکا اور شور بھی برداشت نہ کرے۔ کسی بات پر قائم نہ رہے اور غصہ بہت زیادہ۔

ببیر سلف 30 چار گھنٹے بعد

☆ گہری تپکن۔ خارش ناقابل برداشت۔ ایسا محسوس کرے کہ چہرے پر کیڑے رینگ رہے ہیں۔ کھانسی اور پھنسیاں یکے بعد دیگر۔

کروٹون ٹیگنم (Croton-tig) 30 یا

200 چھ گھنٹے بعد

☆ پھنسیاں جن میں ایسا محسوس کہ چوہا جلد کے نیچے کتر رہا ہے۔

سکالے کار 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ چھالے جیسی پھنسیاں۔ ٹھنڈ کے ساتھ جلن اور بخار۔ بے چینی۔ چہرے پر پھنسیاں جلن کے ساتھ۔ مرطوب اور ٹھنڈ میں تکلیف بڑھے۔ اجابت کے بعد بہتر محسوس کرے۔

رہس ٹاکس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ چہرے پر بار بار پھنسیاں ہوں۔ بدبودار رطوبت سے جلد اور پٹھے الگ الگ ہو جائیں۔ غیر معمولی طور پر جلدی جلدی علامات بڑھیں۔

کروٹلس ہیرائیدز 30 یا 200 چار

گھنٹے بعد تین مرتبہ

☆ علامات غنودگی یا نیم بے ہوشی کے ساتھ۔ باریک اور واضح سرخ لکیر زبان کے بالکل



درمیان میں۔

ورائرم ورائڈ 30 چار گھنٹے بعد

☆ ویکسی نیشن کے بعد کی پھنسیاں۔ کھلے ہوئے حصوں پر بہت زیادہ پسینہ۔

تھو جا 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ چہرے پر آبلوں کے ساتھ پھنسیاں۔ شدید جلن۔ ذرا سا چھونے سے بھی جلن کی شدت میں اضافہ ہو جائے۔

کیستھرس 30 تین گھنٹے بعد

☆ جب تمام منتخب دوائیں ناکام ہو جائیں۔ جلن کا احساس، گرمائش سے تکلیف بڑھ

جائے۔ مریض بھوک محسوس کرے۔ خاص طور پر 10-11 بجے دن میں۔ پانی پڑنے یا دھونے سے تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔

سلفر 200 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x کالی فاس 6x اور کالی سلفر 6x ہر

تین گھنٹے بعد دینا بہت فائدہ مند ہے۔

## مہاسے/چہرے کے دانے، پھنسیاں

### Acne/Pimples

سوزش والے دانے، چھالے، آبلے، کیڑی، چربی دار دانے، جو چہرے، چھاتی اور کمر پر نکل آئیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ جلد میں نمی سی ہو۔ پھنسیاں، ہاضمہ کمزور ہو۔ ریاخ بنتی ہو۔ پٹکے یا ہوا سے اچھا محسوس کرے۔

کاربووٹیج 30 یا 200 ہر چھ گھنٹے بعد

☆ مزمن کیس۔ انڈا کھانے سے بڑھ جائے اور سرد موسم میں تکلیف میں اضافہ ہو۔

سٹریپٹو کوکسین 200 یا 1M ہفتہ وار

تین مرتبہ

☆ ناک کے دانے۔ جو مرطوب موسم میں بہتر ہوں۔

کاشی کم 30 ہر چھ گھنٹے بعد

☆ سب سے سردار اور اہم دوا۔ پھنسیاں/مہاسے ماہواری کے دوران زیادہ ہو جائیں۔ چہلی دار چیزیں چینی، کافی اور گوشت کھانے سے بڑھ جائیں۔

☆ سورنیم 200 یا M ہفتہ وار، تین مرتبہ مہاسے جن کی جڑیں سخت اکڑی ہوں۔ جن کے کونے یا چوٹی پر آبلے ہوں۔ رات کو پینہ آتا ہو۔

☆ آرسنک آیوڈیم 3x یا 6x ہر چار گھنٹے بعد

☆ سطح یا جلد صاف کرنے کے لئے۔

☆ باربرس ایکوی فولیم Q سات یا آٹھ قطرے، ہر چار گھنٹے بعد

☆ بلوغت کی عمر میں مہاسے جس میں جلن ہو۔

☆ ایسٹریا زرب (Asterias rub) 30 ہر چہ گھنٹے بعد

☆ گلابی دانے، پھنسیاں جن کے آس پاس تکلیف یا درد ہو۔ ماہواری کے دوران زیادہ ہو جائیں۔

☆ ایو جینیا جے (Augenia J) 5 Q سے 10 قطرے، ہر چار گھنٹے بعد

☆ دق کے مریض کے مہاسے۔

☆ ٹوبرکولینم 200 K یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ گلاب کے سے رنگ کی پھنسیاں، پیلے، چکنی جلد کے، ٹھنڈے لوگ۔

☆ سلیسیا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ اگر ایسٹریا زرب ناکام ہو جائے اور آبلہ دار دانے ہوں۔

☆ کالی بروماڈ 30 ہر چہ گھنٹے بعد

☆ پھنسیاں۔ قبض جس میں بکری کی بیگنوں جیسا پاخانہ ہو اور سمندر میں نہانے سے اضافہ ہو جائے۔

☆ گنیشیا میور 30 ہر چہ گھنٹے بعد

☆ پھنسیاں جیسے پسو نے کاٹ لیا ہو۔ بوائیاں ہوں۔ انگلیوں کی سوجن درد بھری سوزش۔  
ایگری کس مس 30 یا 200 ہر چھ گھنٹے بعد

☆ مہاسے کے رجحان کو روکنے اور خون صاف کرنے کے لئے۔  
ایگنیشیا Q 5 تا 10 قطرے ہر چار گھنٹے بعد

☆ جب مذکورہ بالا دوائیں مفید ثابت نہ ہو رہی ہوں تو علامات کے مطابق متعلقہ دوا کے ساتھ۔

سلفر 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ  
بائیو کیمک کی کلکیریا فاس 6x خصوصاً "جوان لڑکیوں کے لئے  
جن کی ماہواری میں بے قاعدگی ہو اور جسمانی طور پر کمزور ہوں  
بہت مفید ہے۔

## گرمی دانے

### Prickly Heat

بعض اوقات خاص طور پر گرمی کے موسم میں تمام جسم پر باریک باریک سرخی مائل دانے نکل آتے ہیں۔ جن میں سخت خارش اور کھجلی ہوتی ہے۔ جو پینہ آنے سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مریض بار بار کھجلاتا ہے اور جلد تک چھیل لیتا ہے۔ عام طور پر ٹھنڈی ہوا سے اور ٹھنڈی چیز لگانے سے مریض کو سکون ملتا ہے۔ یہ مرض صفائی نہ رکھنے، میلے کپڑے پہننے اور غسل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ پیشاب میں جلن، دانے یا پتی جلن اور سوجن کے ساتھ۔  
کیسٹرس 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ خارش کے ساتھ دانے۔ رات کے وقت تکلیف بڑھے۔ گرمائش کے احساس اور پینہ سے تکلیف میں اضافہ ہو۔  
مرکبوس 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ آبلے، خراشدار احساس، سوجن یا یہ تکلیفات یکے بعد دیگر ہوں۔ آبلے بہت زیادہ مقدار میں۔  
آرنیکا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد



- ☆ صرف جسم کے ڈھکے ہوئے حصوں پر دانے ہوں۔
- ☆ تھو جا 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ خشک اور چھلکے والے دانے، جن میں شدید جلن ہو۔ دیکھنے میں گندے سے لگیں۔ بستر کی گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔
- ☆ سورنم 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ شدید خارش والے گرمی دانے۔ عام طور پر گرم موسم میں ہونے والے گرمی دانے۔
- ☆ سائزی جیم Q یا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ شدید جلن اور کھجلی والے دانے۔ پاخانہ قبض سے ہو۔
- ☆ گریفائٹس 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ کھجلی۔ جو بار بار ابھر کر آئے۔
- ☆ سپیا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ گرم اور سرخ دانے اور پتی۔ سر کی جانب خون کا اجتماع۔
- ☆ بیلا ڈونا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ خشک دانے۔ شدید پیاس اور قبض۔
- ☆ نیٹرم میور 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ پیلی سی رنگت کے دانے جن کے گرد چھوٹے چھوٹے آبلے ہوں۔
- ☆ لکے س 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ خارش کے ساتھ دانے۔ گرمائش سے تکلیف بڑھے۔ پاخانہ بہت زیادہ سخت اور قبض کے ساتھ۔
- ☆ ایومنا 30 یا 0/5 یا 50 میلی مل تک طاقت، چار گھنٹے بعد
- ☆ دانوں میں کانٹے سے چھبیں اور جلن ہو۔ پیاس ندارد۔ گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔
- ☆ ایس ملنیکا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ تانبے کے سے یا سرخ رنگ کے دانے۔ ٹھنڈے پڑنے پر نیلے رنگ کے سے ہو جائیں۔ رات کے وقت زیادہ خارش ہو۔
- ☆ سفیلیم 30 10 منٹ بعد، تین مرتبہ
- ☆ اس قدر زیادہ دانے جیسے فصل اگ آئی ہو۔ ایک دانے کو آرام آئے تو دوسرا نکل آئے۔ دانے بہت آہستہ آہستہ نکلیں۔
- ☆ سلفر 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ بائیو کیمک کی نیٹرم میور 12x بھی گرمی دانوں کے لئے بہترین دوا ہے۔



# داد/چنبیل

Eczema

یہ ایک جلدی بیماری ہے۔ اس میں باریک باریک گلابی رنگ کے ابھار جلد پر نمایاں ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں اور آپس میں ملکر ایک جال سا بنا دیتے ہیں۔ ان ابھاروں کے پگھلوں پر چھلکوں کی تمیں بنتی جاتی ہیں۔ چھلکے چمکدار سفید ہوتے ہیں اور آسانی سے اڑ جاتے ہیں۔ نیچے سے سرخ کھال نکل آتی ہے جس میں سے خون نکل آتا ہے۔ اس میں شدید خارش بھی ہوتی ہے۔ بازوؤں ہاتھوں کے جوڑوں اور دوسرے جوڑوں پر یہ مرض زیادہ ہوتا ہے بعض اوقات تمام جسم پر پھیل جاتا ہے۔ یہ مرض گرم ملکوں کی نسبت سرد ممالک میں زیادہ ہوتا ہے۔

آتشک وغیرہ، دماغی محنت، ناقص غذا، کثرت سے شراب پینا، گندہ رہنا اور ہاضمے کی خرابی اس مرض کے عام اسباب ہیں۔

## علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ داد میں سرخی، جلن اور فکر مندی۔ نہ بچنے والی پیاس۔

آرسنک البم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ ڈاڑھی کا ایگزیم۔ پانی جیسا اور چھپچھا مادہ یا رطوبت۔ جلن۔ دھونے سے تکلیف بڑھ جائے۔

آرسنک آیوڈیم 30 'تین گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ

☆ شدید آبلے۔ جس پر چھلکا آجائے۔

روہس ٹاکس 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ ہتھیلیوں میں ایگزیم، چھالے۔ جلن اور داد۔

ر۔ ٹن بلب 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ بالوں کی جڑوں میں سوزش اور سرخی۔ نمک کھانے سے اور سمندر کے کنارے تکلیف  
بڑھ جائے۔

نیزم میو 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ اگلیوں اور پاؤں کے انگوٹھوں پر چپک کے سے دانے یا آبلے جس سے ناخن اتر جائیں۔  
بوریکس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد تین

مرتبہ

☆ کنہیوں اور گھٹنوں کے جوڑوں کے اندر داد۔ سانس میں بے قاعدگی۔ مریض روئے۔

مرکیورس سال 30 یا 200 چار گھنٹے

بعد تین مرتبہ

☆ پرانا داد۔ جلن اور درد۔ بستر کی گرمائش سے رات کو تکلیف بڑھے۔

سلفر 30 یا 200 چار گھنٹے بعد تین

مرتبہ

☆ داد یا چنبل میں پھن ہو جائے۔ چمچی رطوبت خارج ہو۔ پاخانہ قبض کے ساتھ۔

گریفائٹس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ بالوں کے کناروں پر چپک کے سے دانے۔

ہائیڈراسٹس کنائنم 30 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ مرکیورس سال کے بعد۔ آبلہ دار داد۔ حساس مریض۔ گرمائش سے بہتر۔ ٹھنڈک سے  
تکلیف میں افادہ۔

بہر سلف 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ سر کانوں، چہرے اور جسم پر داد۔ جسم پر موٹے چھلکے ہوں۔ خراشیں۔ کبھی کہیں اور  
کبھی کہیں جلن اور داد۔

شیننی میگرا 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ کوئے کی سوزش اور بیکٹیریا جراثیم کی سوزش۔

سلفیورک ایسڈ 30 ' چار گھنٹے بعد ' تین مرتبہ

☆ نظام انہضام ' جگر اور پیشاب میں بد نظمی کی وجہ سے جلد موٹی ہو جائے اور اکڑی ہوئی ی۔

لائیکوپوڈیم 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد ' تین مرتبہ

☆ خشک چھلکے دار آبلے۔ چہرے اور کھوپڑی پر بہت زیادہ۔ بستر کی گرمی سے تکلیف میں افادہ ہو۔ پتلی بو والی کھال ادھیڑنے اور جلد چھیلنے والی رطوبت۔ گندہ نظر آئے۔

سورینم 200 ' 10 منٹ بعد ' تین مرتبہ

☆ زردی مائل پیپ کے ساتھ۔ گرمی سے تکلیف بڑھے اور ٹھنڈ اور کھلی ہوا سے افادہ ہو۔

پلساٹیل 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد ' تین مرتبہ

جلدی امراض میں مرض کے بھڑک اٹھنے سے گریز کرنے کے لئے بڑی

احتیاط سے دوا کا انتخاب کرنا چاہئے۔ لئذا میلی مل طاقت (Millesimal) طاقتیں بار بار استعمال کرانا مناسب ہوتا ہے۔

بائیو کیمک کی کالی میور 12x کالی سلف 6x نیزم میور 12x اور نیزم فاس 6x ہر چار گھنٹے بعد دینا بھی بہت فائدہ مند ہے۔



## آبلے / چھالے (جلدی)

### Blisters (Skin)

اس مرض میں جسم پر گول بیضوی شکل کے آبلے نمایاں ہو جاتے ہیں جن میں آبی رطوبت بھری ہوتی ہے۔ اس رطوبت کا رنگ شروع میں میلا سا اور بعد ازاں زردی مائل ہو جاتا ہے۔ آبلے پھٹ کر رطوبت نکل جاتی ہے اور آبلوں کی جگہ باریک کھریڑ آ جاتی ہے۔ آبلوں میں جلن اور درد زیادہ نہیں ہوتی البتہ مریض کمزوری بہت محسوس کرتا ہے۔ عام طور پر یہ مرض زیادہ مسلک نہیں ہوتا ہے اور بروقت اور صحیح علاج سے جلدی صحت یابی ہو جاتی ہے۔ آتشک کے مریض والدین کے بچوں کو اکثر یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ نقص ہاضمہ، صفائی نہ رکھنا، سورج کی تپش میں رہنا وغیرہ بھی اس مرض کے اسباب ہو سکتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ ایسے آبلے جن کے ارد گرد کی جلد بہت سرخ ہو جائے اور ان میں شدید سوزش ہو۔  
روہس ٹائکس 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ کیزے یا چیونٹی وغیرہ کے کاٹنے سے آبلے پڑ جائیں اور پیاس مر جائے۔  
ایس ملفیکا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ بخار کے دوران یا بعد کے آبلے خاص طور پر ہونٹوں کے گرد۔  
نیزم میور 6x یا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ بہت زیادہ چلنے سے چھالے پڑ جائیں۔ آگ کے جھلنے سے آبلے پڑ جائیں یا دھوپ کی شدت سے چھالے پڑیں۔  
کیتھرس 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ ٹائی فائیڈ بخار کے چھالے۔ دانتوں کی گندی رطوبت۔ زخم کی گندی رطوبت۔  
پیشیا 6 یا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ انگلیوں کے اوپر چھالے۔ بڑے آبلے جو خون آب (کیلوس) سے بھرے ہوں۔  
ایلمنٹس 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ آبلے جن کے اندر سفید پیپ پڑ جائے۔ چھوٹے تک سے تکلیف ہو۔ بہت زیادہ حساس۔  
سیر سلفر 30 چار گھنٹے بعد



☆ ٹائی فائڈ بخار کے کھرنڈ والے آبلے۔

ایسڈ فاس 30، چار گھنٹے بعد

چمالوں/آبلوں کے لئے بایو کیمک کی سیلیا 6x اور 12x  
بھی بہت مفید ہے۔

## بسہری/بلٹوہا/انگل بھیرا

Whitelow

(See abscess and boils also)

انگلی کے کونے پر جلد کے اندر اور بعض اوقات ناخن کے نیچے جو پھنسی ہوتی ہے اور اس میں سوجن اور درد ہوتا ہے اسے انگل بیڑھا کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا سخت گومڑ کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ جو جلد ہی سرخ اور نرم آلود ہو جاتا ہے۔ اس میں پیپ پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے شدید قسم کی دکھن جلن اور درد ہوتا ہے۔ اس مرض کے اسباب 'آتشک'، 'جلندار پھنسیاں'، 'خنازیر'، 'دادیا چنبل' کے مواد کا ناخن میں سرایت کر جانا وغیرہ ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ حادثہ کیسوں کے لئے جبکہ پھنسی کو تحلیل کرنا ہو۔

مرشکا سیب (Myristica Seb) Q یا

3x، دو گھنٹے بعد

☆ گہرے سرخ رنگ کی یا نیلی جگہ جس میں گہرا درد ہو۔

لیکے کس 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ اعصاب کو ہوا لگ جانے کے بعد جبکہ انگل بیڑھا میں شدید درد ہو۔

۱۔ سلم سیپا 30، تین گھنٹے بعد

☆ ٹھنڈی چیزیں لگانے سے آرام اور گرمائش سے تکلیف اور درد میں اضافہ ہو۔ ایسا

محسوس ہو کہ متاثرہ جگہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔

فلورک ایسڈ 30 یا 200، تین گھنٹے

بعد، تین مرتبہ

- ☆ شدید چکن والے درد۔ پھنسی کو پکانے کے لئے ماکہ مواد نکل جائے۔  
بیبیر سلف 3x دو گھنٹے بعد
- ☆ جب ناخن میں چوٹ لگنے کی وجہ سے سوجن اور درد ہو اور متاثرہ جگہ لھنڈی ہو۔  
لھنڈی چیزیں لگانے سے آرام آئے۔
- ☆ لیڈم پال 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد  
پکنے اور پیپ پڑنے کے پہلے مرطے کے لئے۔ گرمائش سے تکلیف بڑھتی ہو۔  
مرکبوس سال 30 'تین گھنٹے بعد
- ☆ جب شدید درد کے ساتھ متاثرہ جگہ پر بہت سی پھنسیاں بن جائیں۔ یا انکور آجائے۔  
ناٹرک ایسڈ 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ جب پھنسی نیچے گہرائی تک ہو اور اس میں چیرنے اور پھاڑنے والا درد ہو۔ متاثرہ جگہ  
پکانے کے لئے۔
- ☆ سلیسیا 30 'تین گھنٹے بعد
- ☆ متاثرہ جگہ سیاہ ہو۔ اس میں جلندار درد ہو۔ گرمی اور گرم چیزیں لگانے سے آرام  
آئے۔
- ☆ آرسنک الیم 30 اور کاربونیج 30 یکے  
بعد دیگر دو گھنٹے بعد
- ☆ ہائیو کیمک کی سلیسیا 12x بھی بہترین دوا ہے۔



مے

## Warts

یہ ایک جلدی مرض ہے۔ جو مخصوص وائرس کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چہرے یا ہاتھ وغیرہ پر چھوٹے چھوٹے ابھار، نوکیلے دانے یعنی مے نکل آتے ہیں۔ عموماً یہ سکول جانے والی عمر کے دوران بچوں کو نکلتے ہیں۔ جنہیں وہ بعض دفعہ ناخن سے نوچتے ہیں۔ عام طور پر یہ بہت سے نکلتے ہیں اور الگ الگ ہوتے ہیں۔ گنجان بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی علاج نہ بھی کیا جائے تو کچھ عرصہ کے بعد یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ مسوں کے لئے اعلیٰ ترین دوا۔
- ☆ کلیریا کالسی ٹاٹا 3x چار گھنٹے بعد
- ☆ مقعد کے ارگرد چھوٹے چھوٹے مے۔
- ☆ اورم میور 3x چار گھنٹے بعد
- ☆ تمام چہرے پر مہاسے اور جسم پر پھنسیاں۔
- ☆ کینیسیا سلف 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ گھونگھٹ یا سر ذکر کے پردے کے اوپر مے۔
- ☆ سائیرس 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ دندانے دار بڑے ابھار۔ جن میں درد ہو اور آسانی سے خون نکلے۔
- ☆ ٹائٹریک ایسڈ 200 یا 1M چھ گھنٹے بعد
- ☆ لاغر پیپ کے ڈنک لگنے کے سے درد والے مے۔
- ☆ کالی سلی کیٹم 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ کانٹے دار، نوک دار ٹھوس چھپے یا تیز مے خاص طور پر چہرے انگلیوں اور ناک کی نوک پر۔
- ☆ کاشی کم 200 چھ گھنٹے بعد
- ☆ مسوں کے داغ۔ ہتھیلیوں میں۔ پیلے رنگ کے دانے۔
- ☆ فیرم پیکریم 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ نرم اور پلپے نوک دار مے جن میں سے آسانی سے خون نکل آئے۔ جبین اور کانٹے

لگنے کا سا احساس ہو۔

فلکیر یا کارب 200 یا 1M چھ گھنٹے بعد

☆ ہاتھوں کے اوپر کی طرف بڑے ہموار اور موٹے دانے چہرے اور ہاتھوں پر۔

ڈکامارا 200 یا 1M 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ پینے ہوئے۔ گوبھی کے پھول کی طرح کے۔ بڑی تعداد میں سے۔ ذرا سے بھی چھو جانے سے خون بننے لگے۔

تھو جا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ آتفک یا سوزاک کے باعث ذکر پر سے۔ خشک گوبھی کے پھول کی طرح۔

شینگی سگریا 200 یا 1M چھ گھنٹے بعد

☆ مریض نہانے سے خوف کھائے۔ مریض 9 اور 10 بجے صبح بھوک محسوس کرے۔ سخت اور درد بھرے سے۔

سلفر 200 یا 1M 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

## پتی/چھپاکی

### Urticaria/Hives

ایک جلدی مرض کا نام جس میں جلد پر سرخ رنگ کے چوڑے چوڑے دانے نکلتے ہیں۔ یہ غیر معمولی حساسیت کی دواؤں یا کچھ کھانوں یا خوراک کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ گرمی، ٹھنڈ، روشنی اور حرارت اور نفسیاتی تحریک سے بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر یہ مرض بعض چیزوں سے حساس اور غیر معمولی حساسیت والے اشخاص کو لاحق ہوتا ہے۔ شدید تو چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن مزمن برسوں تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مومو باضیہ کی خرابی، غذا میں بد پرہیزی، تیز مسالے استعمال کرنے اور کھنے پھل کھانے سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو بعض اشیاء موافق آنے سے بھی چھپاکی ہو جاتی ہے۔ مثلاً بیگن یا آم وغیرہ کے کھانے سے۔ اس مرض میں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہئے۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ دودھ پینے کے بعد ہونے والی پتی کے لئے۔

سپیا 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ نہانے کے بعد۔ گرم ہو جانے کے بعد، خارش ہو جانے سے اور نیند میں بد نظمی کی وجہ



سے پتی ہو۔

بووشا 30 دو گھنٹے بعد

☆ مزمن پتی۔ تمام جسم پر سرخ دانے پڑ جائیں، جس میں غارش ہو۔

۱۔ سٹاکس (Astacus flo) 30 تین

گھنٹے بعد

☆ ہر موسم بہار میں پتی ہو۔ گرمی سے بستر ہو۔ سخت تکلیفات کے سبب مریض کپڑے اتار کر پھینک دے۔

رہس ٹاکس 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ پتی کے سرخ چوڑے دانے غارش کے ساتھ۔ بخار بھی ہو۔ گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ گرم کپڑوں سے بھی تکلیف بڑھے۔ لھنڈ سے بستر ہو۔

ہائگروفیل سبینوزا

(Hygrophil Spinosa) 30 چار

گھنٹے بعد

☆ پکٹائی دار اور بہترین خوراک اور گوشت کھانے سے پتی ہو۔ پیاس نہ ارد۔ کھلی اور لھنڈی ہوا میں بستر محسوس ہو۔

ہلساٹیل 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ لھنڈے موسم میں۔ کپڑے اتار دینے کے بعد پتی ہو۔ گرمائش سے بستر ہو۔

ریو میکس 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ شابری کھانے سے پتی ہو۔

او کے لک ایسڈ 30 یا 200 تین گھنٹے

بعد

☆ کونین کھانے سے پتی ہو جائے۔ زیادہ تند کھانے اور لمیریا کے دہانے سے پتی ہو۔

نیزم میور 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ نشہ آور مشروبات پینے کے بعد پتی۔ لھنڈ محسوس کرنے والے مریض۔ گرمائش سے بستر محسوس ہو۔

ٹکس وامیکا 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ کھمبی (mushroom) کھانے کے بعد پتی۔

۱۔ ابلین تھیم (Absinthium) 30

تین گھنٹے بعد

☆ اسپرین اور اٹاسمین وغیرہ کھانے کے بعد پتی ہو جائے۔

ایفنی پائرین 30' تین گھنٹے بعد

☆ بغیر غارش کے پتی ہو۔

یودا ارسی (Uva Ursi) Q یا 30' چار گھنٹے بعد

☆ ٹن کے بند ڈبوں کا کھانا کھانے سے پتی ہو جائے۔ تیزابی یا کھٹے پھل، آئس کریم اور زیادہ گلے ہوئے پھل کھانے کے بعد ہونے والی پتی، جسے گرمائش سے آرام آئے۔

☆ آرسک الہم 30 یا 200' تین گھنٹے بعد  
☆ پھمروں وغیرہ کے کانٹے کے نتیجے میں پتی ہو جائے۔ بخ لھنڈے پانی سے دھونے سے آرام آئے۔

لیڈم پال 30 یا 200' تین گھنٹے بعد

☆ نمانے کے باوجود جسم سے بدبو آئے۔ سردی کے شروع میں پتی ہو۔

سورینم 200 یا 10' 1M منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ کپڑے اتارنے کے بعد شدید غارش۔ سرد مرطوب موسم کی ہوا لگنے سے پتی ہو جائے۔  
موسم کے بدلنے پر پتی ہو۔

ڈکامارا 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ اچھا تک شدید قسم کی سوجن اور جلن کے ساتھ پتی۔ گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔  
پلاس غائب ہو جائے۔

ایس ملنیکا 30 یا 200' تین گھنٹے بعد

☆ خراب پھل کھانے کے بعد پتی ہو جائے۔

کاربودیج 30 یا 200' تین گھنٹے بعد

☆ وقفے وقفے سے ہونے والے بخار کو دبانے کے نتیجے میں پتی ہو جائے۔

ایٹیریم (Elatarium) 30' تین گھنٹے

بعد

☆ سرد خشک ہوا لگ جانے سے اچھا تک پتی ہو جائے۔ شدید تشویش اور بے چینی ہو۔

اکونائٹ 30 یا 200' دو گھنٹے بعد

☆ گیس اور نزلے کی وجہ سے پتی۔ زبان پر گاڑھا سفید مادہ جما ہو۔ گرمی سے تکلیف بردہ جائے۔

انٹی مونیم کروڈم 200 '10 منٹ بعد  
تین مرتبہ

☆ جلدی جلدی پیشاب کی حاجت ہو۔ پیاس نادر۔ شدید جلن اور سوجن کے ساتھ پتی۔ کیکڑے کھانے کے بعد پتی ہو جائے۔

ارمیکا یورینس Q یا 30 'تین گھنٹے بعد  
بائیو کیمک کی کالی میور 6x اور نیزم میور 6x بھی پتی کے لئے  
بہترین ادویات ہیں۔

## چنڈی، گدی، کیل، ابھار

### Corns

بعض دفعہ پاؤں کے کسی حصے عموماً "انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کے جوڑ وغیرہ کی جلد سخت ہو جاتی ہے اور ایک ابھار سا یا چنڈی وغیرہ بن جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے چلتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تنگ جوتے پہننے، رگڑ لگنے یا دباؤ پڑنے سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ پاؤں کے انگوٹھے کی چنڈی، جو کانٹے کے بعد پھر ابھر آئے۔  
ہائیڈراسٹس کنائٹم 30 'چار گھنٹے بعد

☆ تلموؤں میں۔ زبان پر مونی سفید تہ جمی ہوئی۔  
انٹم کروڈم 200 یا 1M 'چھ گھنٹے بعد  
چھ مرتبہ

☆ گرمی چھنی ہوئی چنڈیاں۔ پاخانہ سخت۔ قبض۔  
گریفائٹس 30 'چار گھنٹے بعد

☆ پھاڑنے والے درد اور سوجن والی چنڈیاں۔  
لائیکوپوڈیم 200 '10 'تین مرتبہ

☆ جوتے کے دباؤ سے بننے والی درد کرنے والی چنڈیاں۔

سلفر 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

نرم، سوزشی اور سوجی ہوئی چنڈیوں کے لئے بائو کیمک کی

سیلیا 12x یا 30x بھی بہت مفید دوا ہے۔

چنڈیوں پر تھو جا Q oc لگانے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔

## بوائیاں

### Chilbalains

الگیوں، پاؤں کے انگوٹھوں اور ایزویوں میں سوزشی سوجن اور درد کی کیفیت کو بوائیاں کہا

جاتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ الگیوں، انگوٹھوں اور ایزویوں میں جلن۔ گرمائش سے تکلیف بڑھے۔ ٹھنڈی اور کھلی ہوا میں بہتر محسوس ہو۔

ہلکا سا 30، چار گھنٹے بعد

☆ سخت درد محسوس ہو۔ ٹھنڈے اور سرد موسم میں تکلیف بڑھ جائے۔

اگاریکس ایم 30، چار گھنٹے بعد

☆ جلد سرخ اور سوجی ہوئی۔ جلن اور سوزش ہو۔ بے چینی ہو۔

روہس ٹاکس 30، چار گھنٹے بعد

بائو کیمک کی کلیریا فاس 6x اور کلیریا فلور 12x چار گھنٹے

بعد دینا بہت فائدہ مند ہے۔

رہس ٹاکس Q کو قیصرین میں ایک اور نو کے تناسب سے ملا کر

متاثرہ حصے پر لگانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔





# خشک خارش

## Itching

(See Scabies and pruritus also)

خارش یا کھجلی نہایت موذی مرض ہے۔ اس مرض میں جسم پر شدید خارش ہوتی ہے۔ جلد خشک اور کھردری ہو جاتی ہے۔ کبھی اس مرض میں دانے نکلتے ہیں اور ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ کبھی دانوں کے بغیر خشک کھجلی ہوتی ہے۔ مریض کھجلا کھجلا کر جلد چھیل لیتا ہے۔ نیند خراب ہو جاتی ہے بستر کی گرمی سے خارش بڑھتی ہے۔ بعض حصوں پر کھربڑ دار دانے بھی نکل آتے ہیں۔ پیروں سے بدبودار مہینہ آتا ہے۔

غلیظ میلا کھپلا رہتا، کئی کئی دن غسل نہ کرتا، صفائی نہ رکھتا، جگر کے فعل کا درست نہ ہونا، ہاضمے کے عمل میں نقص ہونا، خون کی خرابی اور مستورات کی ماہواری میں بےقاعدگی وغیرہ خارش کے عام اسباب ہیں۔ یہ ایک متعدی مرض ہے اور ایک مریض سے دوسرے کو لگتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ گھر میں اگر کسی ایک شخص کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو دوسرے لوگ بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہتے۔

### علامات، ذوا اور طاقت، دورانیہ

☆ خیموں میں خارش۔ چلنے اور چھونے سے خارش بڑھ جائے۔

کروٹن ننگیم 30 یا 200 چار گھنٹے

بعد

☆ دانوں کے بغیر تمام جسم میں خارش۔

ڈولی کوس 30 چار گھنٹے بعد

☆ جلد گندی۔ اکثر اوقات جسم پر تیل سا نمایاں رہے۔ لیکن بعض اوقات خشک بھی ہو جائے۔ ہمیشہ حتیٰ کہ نہانے کے بعد بھی جسم سے بو آتی رہے۔ درم کے ساتھ خارش۔

سورنیم 200 یا 0/6 یا اس سے اوپر

تک کی طاقت، چھ گھنٹے بعد

☆ ٹاک، کان اور حشفہ میں خارش۔ بازوؤں پر چھپاکی سی یا سرخی مائل دانے پڑ جائیں اور خارش ہو۔

سلفر 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ کپڑے اتارنے کے بعد خارش۔ کھانے سے سکون محسوس ہو۔ لیکن نتیجتاً جلن ہو جائے۔

سلفر 30 چار گھنٹے بعد

☆ گرم پانی سے نہانے سے خارش بہتر ہو۔ رات کے وقت خارش زیادہ ہو۔  
سفیلیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ ہتی یا سرخ باریک دانے نکل آئیں۔ خارش اور جلن گرمائش سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

رہس ٹاکس 30 چار گھنٹے بعد

☆ شدید اور دیر تک رہنے والی خارش۔ رات کے وقت اور جب اس کے بارے میں خیال کیا جائے تو زیادہ ہو جائے۔

میڈورینم 200 یا 1M 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

بائیو کیمک کمی نیشن نمبر 20 بھی خارش کے لئے مفید ہے۔

چار چار گھنٹے بعد دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔



## چھوت دار یا تر خارش / کھجلی

### Scabies

اس مرض میں جسم پر باریک باریک دانے نکلتے ہیں۔ جلد خشک اور کھردری ہو جاتی ہے۔ جسم میں شدید قسم کی خارش کھجلی اور جلن ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ کھجلی اتنی شدید ہوتی ہے کہ کھجاتے کھجاتے جلد پھل جاتی ہے اور خون نکل آتا ہے چونکہ یہ مرض متعدی ہوتا ہے لہذا صحت مند لوگوں کو کھجلی والے مریض سے پرہیز کرنا چاہئے۔ ہاضمے میں نقص 'خون کی خرابی' صفائی نہ رکھنا، جگر کا فعل درست نہ ہونا، خواتین میں ماہواری میں بے قاعدگی وغیرہ اس بیماری کے عام اسباب ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ آبلے دار دانوں کی بہترین دوا۔ کھجلی اور جلن۔ کھانے کے بعد سوچن ہو جائے۔  
سلفر 2x یا 6 چار گھنٹے بعد

☆ اعضاء تناسل کی کھجلی۔ جلد اور بازوؤں کا سن ہو جانا۔

امبرا گریسیا 30 چار گھنٹے بعد

☆ سے ' درد بھرے آبلے والے دانے۔ چھونے سے بہت حساس۔ مریض ٹھنڈا محسوس کرے۔

بیبر سلف 30 چار گھنٹے بعد

☆ گھٹنوں کے جوڑوں میں آبلے والے دانے۔ جلن اور کھجلی والے دانے۔ گرمائش سے بہتر ہوں۔

آرسنک الیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ کھجلی 'شد کی طرح کی رطوبت نکلتے۔ پاخانہ قبض کے ساتھ ہو۔

گریفائش 30 چار گھنٹے بعد

☆ باریک سرخ دانے۔ کھجلی۔ ٹھنڈا اور آرام کرنے کے بعد تکلیف بڑھے۔

رہس ٹاکس 30 چار گھنٹے بعد

☆ آبلے دار دانے۔ خاص طور پر کمینوں کے جوڑوں کے اوپر رات کے وقت اور گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

سلفر 30 اور مرکبوس سال 30 ایک دوسرے کے بعد دیا جاسکتا ہے

☆ مزمن کیسوں کے لئے۔ ورم اور کھجلی۔ معاون دوا۔

سورنیم 0/6 یا اس سے اوپر کی طاقتیں، چار گھنٹے بعد

☆ جلد کی تھوں کے اندر سوجن کے ساتھ کھجلی۔ چلتے یا کھانتے ہوئے غیر ارادی طور پر پیشاب نکل جائے۔ مرطوب موسم میں بستر ہو۔

کاشی کم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ شدید قسم کی کھجلی۔ کھجاتے کھجاتے خون نکل آئے۔ بستر کی گرمی سے کھجلی بڑھ جائے۔

میزیریم 30 چار گھنٹے بعد

☆ کھانے کی نالی میں جلن ہو۔ مزمن قسم کی خارش جو ہر موسم بہار میں لوٹ آئے۔

ایسڈ سلف 30 چار گھنٹے بعد

☆ نیلی سی رنگت کے دانے۔ مریض سونے کے بعد زیادہ کھجلی محسوس کرے۔

لکے کس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

بیرونی استعمال کے لئے سلفر Q کو تیل یا نیرزویٹ سالیوشن میں

ملا کر لگایا جائے۔ مریض کے کپڑے روزانہ چار پانچ دن تک

تیز گرم پانی میں دھونے چاہئیں۔





# پھنسیوں اور پیپ والی خارش / کھجلی

## Psoriasis

اس مرض کی ابتدا میں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان یا جوڑوں پر خارش یا کھجلی ہوتی ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد مخروطی پھسیاں نکل آتی ہیں اور جلد ہی ان میں پیپ پڑ جاتی ہے اور ان دانوں کے سوکھنے پر کھرنڈ بندھ جاتے ہیں۔ تمام جسم خارش سے متاثر ہو جانے پر شدید کھجلی ہوتی ہے۔ مریض تمام جسم کو کھجاتا ہے۔ جس سے دانے اور بڑھ جاتے ہیں اور بعض دفعہ کھجاتے کھجاتے جلد چھل جاتی ہے۔ بے چینی کی وجہ سے نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ مریض سخت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کھجلی کے علاج کے لئے بہترین دوا علاج شروع کرنے اور متعلقہ دوا سے پہلے دینے کے واسطے۔ خصوصاً "ڈھلکے ہوئے کندھوں والے مریض کے لئے۔ ایسا مریض جو نماٹا پسند نہ کرے۔ گہری سوچ میں گم رہے۔

☆ ایسے افراد جو سردی اور دوسرے موسموں کی تبدیلی سے بہت زیادہ حساس ہوں۔ گرمائش کی خواہش کریں۔

بہتر سلف 200 یا 1M 10 منٹ بعد  
تین مرتبہ

☆ جلن کا احساس۔ ٹھنڈی چیزیں لگانے سے مرض میں اضافہ ہو اور گرمائش سے افادہ ہو۔  
آرسنک البم 0/7 یا اس سے اوپر کی طاقتیں، چھ گھنٹے بعد

☆ مزمن اور ضدی (نھیک نہ ہونے والی) خارش کے لئے۔ معاون دوا کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔  
کاریک ٹون 1M یا 10M ماہانہ، تین مرتبہ

☆ ایسے مزمین کیسوں کے لئے جن میں منتخب ادویات بھی بے اثر ثابت ہوئی ہوں۔ جلن اور کھجلی ہو۔

ریڈیم برومائڈ 200 یا اس سے اوپر کی  
طاقتیں، پندرہویں روز، تین مرتبہ

☆ ایسے مریض جن میں بروقت فیصلہ کرنے کی کمی ہو۔ بہت محتاط ہوں اور قبض ہو۔ معمولی سی چوٹ بھی پک جائے۔

گریفائٹس 200 یا 1M 10 منٹ بعد  
تین مرتبہ

☆ خارش پھیلنے۔ چھلکے والی اور کھال ادھیڑنے والی ہو۔

ہائیڈروکوتاکل 200 چھ گھنٹے بعد

ہر قسم کی خارش کے لئے بائیو کیمک کی نیزم میور 12x اور  
نیزم سلف 12x چار گھنٹے بعد دینا مفید ہے۔ چھلکے بننے کی  
صورت میں کلکیریا فلور 12x اور کالی سلف بھی مفید ادویات  
ہیں۔

دیگر اہم ادویات : نائٹریک ایسڈ، سورنیم، سفیلیم، سیپیا۔

## شدید کھجلی

### Barber's Itch

(See other Skin ailments also)

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ چھلکے والی پھنسیاں۔ دانوں کے نیچے پیپ۔ گرمی اور گرم چیزیں لگانے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

لائیکو پوڈیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ پھن جس میں سے خون بے۔ حساس جلد۔ خشک اور کھردری جلد۔  
پٹرو لینم 30 چار گھنٹے بعد

☆ جب کھلی کے ساتھ ساتھ درد بھی ہو۔

سورینم 200 '10 منٹ بعد' تین مرتبہ

☆ چھلے کی طرح کے گول چھالے جن میں بہت کھلی ہو اور متاثرہ حصے سے بدبو بھی آئے۔  
نیلوریم 6 یا 30 'تین گھنٹے بعد'

☆ جب منہ دھونے یا نہانے سے شکایت بڑھ جائے۔  
سلفر 30 یا 200 '10 منٹ بعد' تین مرتبہ

مرتبہ

☆ مریض محسوس کرے جیسے اس کے بال کھڑے ہو گئے ہیں۔  
سلفر آیوڈیم 3x یا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ چچپا (ایسدار) اخراج۔ ذرا سی چوٹ سے بھی پیپ جاری ہو جائے۔ غیر متاثرہ جلد سخت ہو۔  
گریفائٹس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ شیو کرنے کے بعد تکلیف بڑھ جائے۔ زخم سے خارج ہونے والے مادے کا لیسن کے رنگ کا کھنڈ بن جائے۔  
سکوٹا (Cicuta V.) 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ ضدی قسم کے یا پرانے کیس کے لئے۔ جس میں بہت زیادہ جلن اور کھلی ہو اور متاثرہ جگہ پر سوجن اور سرخی ہو گئی ہو۔  
ریڈیم برومائڈ 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ کچھ لبو اور پیپ شروع ہونے کے بعد پھر سے پھنسی پھنسنے لگے۔ متاثرہ جگہ نیلی پیلی سی ہونی شروع ہو جائے۔  
لیکے س 30 یا 200 '10 منٹ بعد'

تین مرتبہ

☆ چھالے دار مہنیوں کے ساتھ سخت قسم کی کھلی اور جلن۔ مرطوب بارشوں اور ٹھنڈے موسم میں تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔  
زہس ٹاکس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

## پیپ والے پھوڑے / سادہ پھوڑے گوشت خور پھوڑے

Abscesses and Boils including Carbuncles etc

عام سی سوزش بڑھ کر پھوڑے کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ جس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ گویا پھوڑے کی شکل بننے کے تین مراحل ہیں: پہلا یہ کہ سوزش شروع ہو۔ دوسرے مرحلے میں وہ پھوڑے کی شکل اختیار کر لے اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں پیپ پڑ جائے۔ ان تینوں مرحلوں کے لئے ذیل میں علامات کے مطابق ادویات تجویز کی گئی ہیں۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

(سرخی اور سوزش کے بڑھنے کا مرحلہ)

☆ بہت زیادہ چمکدار سرخ، جلن دار، جس میں بخار ہو جائے اور جلد گرم ہو۔ گرم کرے میں شام اور رات کو تکلیف بڑھ جائے۔

اکونائٹ 6 یا 30، ہر دو گھنٹے بعد

☆ جب ہیبر سلف ناکام ہو جائے اور درد ناقابل برداشت ہو۔

کیمومیل 30 تا 200، ہر تین گھنٹے بعد

☆ پیپ پڑنے کے دورانے کو کم کرنے کے لئے۔ یہ بعض اوقات نشتر کا سا کام کرتی ہے۔ انگلیوں اور ان کی ہڈیوں کے کناروں میں پیپ پڑ جائے۔

ماڑ۔ شیکاسیب (Myristica Seb)

3x یا 1x ہر دو گھنٹے بعد

☆ چھوٹے سوجے ہوئے اور دکھن والے پھوڑے۔ بڑی تعداد میں اور گرمی کے موسم کے پھنسی پھوڑے۔

آرنیکا 30 یا 200، ہر چار گھنٹے بعد

☆ ایسا پھوڑا جس میں بڑی جلدی پس پڑ گئی ہو۔ غدد والے پھوڑے میں پیپ پڑ جانے میں جس میں شدید قسم کا درد ہو اور بستر کی گرمی سے تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہو۔

مرکیورس سال 30 یا ہیلڈونا 30 کے

بعد دیگر، ہر تین گھنٹے بعد



☆ حاد قسم کی پیپ میں خون والے پھوڑے کے لئے۔ جس میں تیزی سے پیپ پڑ جائے (پستان کے پھوڑے، جگر اور غدود والے پھوڑے کے لئے)

بیلادونا 30' ہر دو گھنٹے بعد

☆ شروع میں جبکہ کچھ حصہ سرخ اور چمکدار ہو اور اس میں ڈنک مارنے والا درد ہو اور ذرا سی حرکت سے بھی تکلیف بڑھ جاتی ہو۔

برائی ادینا 30' ہر چار گھنٹے بعد

☆ پیپ پڑنے کے ابتدائی مرحلے میں خراش دار رطوبت والے پھوڑے جو گلنے سڑنے لگے ہوں۔ خون آلود پیپ کے ساتھ جس میں ٹھنڈے تیز ڈنک والا سادرد ہو۔ پس میں پرانے پیپ کی سی بو آئے۔ مریض اگرچہ سردی سی محسوس کرتا ہو لیکن سرد موسم میں بہتر محسوس کرے۔

بیپر سلف 30' ہر چار گھنٹے بعد

☆ پیپ پڑنے کے عمل کو تیز کرنے کے لئے۔

بیپر سلف 2x یا 3x' ہر دو گھنٹے بعد

☆ پیپ پڑنے کے عمل کو روکنے کے لئے۔

بیپر سلف 1M یا 10M' ہر دس منٹ کے بعد 'تین مرتبہ

احتیاط/نوٹ : ٹائسلز میں پیپ پڑنے کے دوران میں چھوٹی طاقت میں بیپر سلف نہیں دینی چاہئے۔

(دوسرا مرحلہ جبکہ پیپ پڑ چکی ہو)

☆ جبکہ پس پتلی اور چپکنے والی ہو۔ ہاتھ پاؤں یا کسی عضو کے موڑ پر ابھار۔ چڈے/جائگے میں پھوڑے۔ گردن یا کان کے پیچھے پھوڑے۔

گرفائنش 30 تا 200' ہر چار گھنٹے

بعد

☆ جبکہ پیپ بنتا جاری رہے اور پھوڑے کو آرام نہ آئے اور پیپ کو پکاتا ہو۔ مریض سردی محسوس کرتا ہو اور گرم خشک موسم میں بہتر محسوس کرتا ہو۔

سلیسیا 6x یا 6' ہر تین گھنٹے بعد

☆ گوشت خور پھوڑے اور ایسے پھوڑے جس میں شدید جلن ہو اور تیز یا اونچے درجے کا بخار ہو۔

این قمر سینم (Anthracinum)

200 یا 1M ہر 10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ سیلیا کے بعد اندمال زخم یا انگور بنانے کے لئے (زخم بھرنے سے باریک باریک دانوں کا ایک گچھا بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ خشک ہو جاتا ہے۔)

فلورک ایسڈ 30 ہر چار گھنٹے بعد

☆ جب پیپ گاڑھی اور پیلی ہو اور اس میں سرخی اور جلن نہ ہو۔

کیلنڈولا (Calendula) 30 ہر تین

گھنٹے بعد

☆ دق کے مرض میں بار بار جلتا ہونے والے مریض کے پس پڑنے کی تکلیف میں۔

کلیریا کارب 200 ہر چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ جب سیلیا ناکام ہو جائے اور پیپ پڑنا بند نہ ہو۔ کھلی ہوا میں اچھا محسوس کرے اور موسم کی تبدیلی پر تکلیف بڑھ جائے۔

کلیریا سلف 6x یا 30 ہر تین گھنٹے

بعد

☆ جلد کے نیچے پیپ پڑ جائے اور گرمی اور گرم چیز لگانے سے تکلیف بڑھ جائے۔

لائکو پوڈیم 30 تا 200 ہر چار گھنٹے

بعد، تین مرتبہ

☆ بار بار پیپ پڑنے اور بخار ہونے کے لئے اور اس عمل کو روکنے کے لئے کہ تکلیف لوٹ کر نہ آئے۔

پائیرو جینیم (Pyrogenium) 200 یا

1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ تھوڑی سی پس، نیلے پھوڑے جبکہ پیپ پتی اور میلی ہو اور اس میں بدبو ہو۔ جلن والا درد ہو جس کو چھونے سے بھی شدید تکلیف ہو۔

لیکے س 30 یا 200 ہر 10 منٹ

بعد، تین مرتبہ

☆ خون صاف کرنے کے لئے جبکہ سوزش کی وجہ سے ہلکا بخار ہو۔

لیڈم پال 200 یا 1M یا ایکی لیسیا  
(Echinacea) 1x یا 30 ہر چار  
گھنٹے بعد

☆ جب پیپ کالی سی ہو۔ پتلی پانی سی اور بدبودار ہو۔

کالی فاس 6x یا 30 ہر تین گھنٹے بعد

☆ خون آلود سبزی مائل پیلی پس جس میں شدید درد ہو۔

ٹائٹریک ایسڈ 200 یا 1M ہر 10 منٹ  
بعد، تین مرتبہ

☆ پھوڑے یا بھری (بس گانٹھ) جو کہ سوئی چھینے سے ہو جائیں۔

لیڈم پال 200 یا 1M ہر 10 منٹ بعد  
تین مرتبہ

☆ السر جو کہ آہستہ آہستہ پکے۔ جلن دار درد۔ پتلی پیپ پانی سی۔ بدبودار جس میں خون  
بھی شامل ہو۔ بھوری یا پیلی سی جس کے گلے سڑنے کا امکان ہو۔ ہوا سے یا پٹکھا جھلنے سے  
آرام ملتا ہو۔

کالٹوٹج 30 یا 200 ہر تین گھنٹے بعد

☆ چٹا، جانگہ جس میں خون کی آمیزش والی پیپ، پیلی یا سبزی مائل ہو تکلیف اچھا کھانا  
کھانے کے بعد زیادہ بڑھ جائے اور گرمی سے بھی اضافہ ہو۔ البتہ ٹھنڈی اور کھلی ہوا سے  
افاقہ محسوس ہو۔

ہلسائیلا 30 ہر چار گھنٹے بعد

☆ بدبودار پیپ نچلے درجے کی اور بخار متعلقہ جگر ہو۔ جس میں شدید قسم کی جلن ہو اور  
مریض سخت بے چین ہو۔

آرنیکا البم 30 یا 200 ہر چار گھنٹے بعد

☆ غدد میں پس پڑنے کے عمل کے دوران۔ پس مقدار میں بہت زیادہ ہو۔ خراش دار  
رطوبت پتلی پانی سی۔

رہس ٹاکس 6 یا 30 ہر چار گھنٹے بعد

☆ سوزش اور شدید درد کے ساتھ گلے سڑنے والا پھوڑا جس سے قریبی غدد سوج جائیں  
اور پھوڑا سخت اور شدید درد والا ہو۔ خصوصاً "بغل کے نیچے ہونے والے پھوڑے کے  
لئے۔

ٹرنٹولا (Tarentula) 200 یا 1M



ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ پس نہایت اذیت بخش درد کے ساتھ، سوزش مزمن سڑنے گلنے والا پھوڑا، جوڑوں خصوصاً بائیں کولھے کے جوڑ پر جس میں پیپ پڑ گئی ہو۔

سٹرامونیم 200 یا 1M ہر 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ سوزاکی اور دق کے مریضوں کے پھوڑوں کے لئے۔

کالی آئیوڈین 200 یا 1M ہفتہ وار

تین مرتبہ

☆ ہڈیوں میں پس پڑنے کے لئے۔

کاربو ایٹی سیس 30 یا 200

(Carbo ani) ہر چار گھنٹے بعد، چھ

مرتبہ

☆ جل جانے کے بد اثرات کے لئے جس میں خون کی آمیزش کی پیپ ہو جس کی رنگت پیلی، سبزی مائل، سبز اور خراش دار رطوبت پتلی پانی سی ہو۔

کاشی کم 30 یا 200 ہر چار گھنٹے بعد

☆ کمر پر گلنے سڑنے والے پھوڑے اور مریض شوگر کی تکلیف میں بھی جھلا ہو۔ مٹی اور تے ہو۔ کئی جگہ سے پیپ بہتی ہو۔

کاربولک ایسڈ 200 ہر 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ کان کے بیرونی حصے میں پھوڑے جو گرمی کے موسم میں زیادہ تکلیف دہ ہوں۔

ماربیلینم (Morbillinum) 200 ہر

10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ مزمن کیسوں میں جس میں مسلسل پیپ بہتی ہو اور مریض روز بروز لاغر ہو رہا ہو اور بخار متعلقہ جگہ بھی ہو۔

دوسری متعلقہ دوا کے ساتھ سلفر 200

ایک خوراک

☆ کان کے بیرونی حصے میں بار بار ہونے والے پھوڑے جس میں چیچک کی ہسٹری پائی جائے۔

فاسٹورس 200 یا 1M ہر تین گھنٹے بعد



چھ مرتبہ

☆ بغل کے پھوڑے 'سوچے ہوئے غدود۔

کالی آیوڈیم 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین

مرتبہ

☆ جھوٹے شدید درد والے پھوڑے جن میں سبزی مائل پس ہو جو آہستہ آہستہ پکے۔

پکڑک ایسڈ 30 یا سکیلے کار 30 یا

200 'ہر 10 منٹ بعد' تین مرتبہ

☆ پھوڑے 'لال دانے' باریک کرم اور خون زہریلا 'قبض کا پاخانہ۔

گن پاؤڈر 3x یا 30 'ہر چار گھنٹے بعد

ٹشو اور زخم کے اندمال یا بھرنے کے لئے بائو کیملک کی گلییریا سلف 12x بھی بڑی مفید

ہے۔

☆ پھوڑے پھنسی کی علامات کے مطابق مجوزہ دوا کے ساتھ ساتھ ان پر لگانے کی چند ادویات سے بھی بستر مناجج برآمد ہوتے ہیں۔ جو زخم پر انگور لاتے ہیں یا انھیں خشک کرتے اور بیرونی مضر اثرات سے بچاتے ہیں۔

☆ پھوڑے یا ان کے نتیجے میں بننے والے زخموں کے بھرنے کے لئے کیلنڈولا ایکسٹر Q اور ایکی نیسیا ایکسٹر Q کا محلول یا مرہم نہایت مفید ہے دن میں تین مرتبہ لگانے سے جلد صحت یابی ہوتی ہے۔

☆ ناقابل برداشت شدید درد کو بیکون پہنچانے کے لئے آرنیکا مونٹ Q اور کاسیا سوف Q کا

لیپ کرنا بہت فائدہ مند ہے۔

☆ پھوڑے پکانے اور پھاڑنے کے لئے پلساٹیل Q ڈسکوری Q اور برائی اونیا Q کی دوا متاثرہ حصے پر لگانے کے لئے مفید ہے۔ پھوڑے دبانے کے لئے گلییریا کاسٹیکم IX کا لیپ کرنا بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔



# جسم کی بو

## Body Odour

(See bad breath also)

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

- ☆ ہاتھ پاؤں اور بظلوں اور چٹوں میں بودار ہینہ۔ سردی محسوس کرنے والا مریض۔  
سلیسیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ پسینے کی وجہ سے جسم میں بو خصوصاً "ماتھے پر بہت ہینہ آئے۔"  
گلکیریا کارب 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ تیز جسم کی بو۔ یسدار اور ہچچپا ہینہ جس سے کپڑوں پر بھی دھبے پڑ جائیں اور کسی طور پر پسینے کی شکایت دور نہ ہو۔  
مرکبوس سال 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ غیر صحت مند جلد۔ نہانا پسند نہ کرے۔  
سلفر 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ حساس جلد کے ساتھ جسم سے پتیر کی سی بو آئے۔  
ہیپر سلف 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ معاون دوا۔  
سورنیم 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ



# جلد میں کسی چیز کے کُھب جانے کی تکلیف

Foreign Body (Skin)

## علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کسی چیز کے جسم میں داخل ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی ہو اور اس کو نکالنا مقصود ہو۔

ہیبیر سلف 200 یا 1M '10 منٹ بعد'

تین مرتبہ

☆ کسی چیز کو جسم میں داخل ہوئے دیر ہونے کی صورت ر۔

سلیسیا 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد' چھ

مرتبہ

☆ لوہے کی کیل وغیرہ نکالنے کے لئے۔

لیڈم پال 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد' چھ

مرتبہ

## فائی لیریا پیدا کرنے والے کرم کے باعث مرض لاحق ہونا

Filariasis

فائی لیریا پیدا کرنے والے کرموں کی موجودگی کی وجہ سے بیماری کی ایسی حالت جب یہ کرم جلد کے اندر کھب رہے ہوں اور ان کی وجہ سے سوجن اور جلن ہو رہی ہو۔ ابتداً ان کی موجودگی فوطوں کے اعضاء کے درد اور درم سے ظاہر ہوتی ہے۔ ران کی ہڈی اور چٹوں کے رطوبتی یا لمنی غدودوں کی سوجن عام علامت ہے۔ چنانچہ ذیل میں علامات کے مطابق متعلقہ دواؤں کی تفصیل درج ہے۔

## علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ شریف، نرم خو۔ مریض علامات بتاتے ہوئے رونے لگے۔ مزاج یا موڈ تبدیل ہوتا رہے۔

منہ خشک ہونے کے باوجود پیاس ندارد۔ ٹھنڈی چیزوں کی خواہش کرے۔ بعداً گرم مزاج

ہو۔

ہمسائلا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ ریاجی بد ہضمی۔ ہر وقت جلدی میں ہو۔ میٹھے اور گرم کھانوں کی خواہش کرے۔ ٹھنڈ

محسوس کرنے والا مریض۔ گرمی سے تکلیف بڑھے۔

لائیکو پوڈیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ ہر قسم کا مقامی استسقا۔ خاص طور پر ریٹے والی بانٹوں کے جمع ہونے کا۔ لمبے وقفے کے بعد بہت مقدار میں پانی پئے۔ شدید پیاس۔ گرم مریض۔ حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

برائی ادینا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ پاخانے میں آؤں، ٹانگوں کا استسقا جو کہ سخت ہو جائیں۔ نم منہ کے ساتھ پیاس۔ کثیر پینے۔ جس سے کوئی آرام نہ آئے۔ پیپ پڑنے کا رجحان پایا جائے۔

مرکیورس سال 30 یا 200، چار گھنٹے

بعد

☆ حال ہی میں شروع ہونے والے کیس۔ لمٹ غدد کا ورم بار بار ہو۔ ریزہ کی ہڈی یا حرام مغز کی ورم۔ تھکن سے تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔

رہس ٹاکس 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ گیس کی تکلیفوں کی شکایت کے ساتھ سردی کا احساس۔ مٹھائیوں کی خواہش کرے۔ جلدی بیماریوں میں جٹلا۔ مقامی یا تمام جسم پر جلن۔ ٹھنڈ سے بہتر محسوس کرے۔

سلفر 30 یا 200، ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ جلن کا احساس۔ پیاس ندارد۔ زبان سے متعلق استسقاء (سوجن) گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

ایس ملینکا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ خیموں کی تھیلی یا ریزہ میں پانی آجائے۔ مردانہ اعضاء مخصوصہ کی شکایات۔ طوفان سے تکلیف بڑھے۔

رہو ڈینڈرون (Rhododendron)

200 یا 1M ہفتہ وار

بائیو کیمک کی گلیکیریا 12x ہر چار گھنٹے بعد دینا بھی فائدہ مند

ہے۔





# چکے

## Herpes Zoster

یہ ایک عصبی مرض ہوتا ہے۔ عام طور پر اس مرض کے دانے اور چکے گلے، سینے اور پیٹ کے ایک ہی جانب ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کمر سے زیر ناف تک بھی ہوتے ہیں اکثر اوقات یہ ران پر ہوتے ہیں۔ دانے پڑنے سے پہلے اس مقام پر سوزش ہوتی ہے اور پھر سرخ ہو کر وہ جگہ پھول جاتی ہے۔ اس مرض کے دانے اور پھنسیاں کچھوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور ان کے گرد ایک دائرہ سا بن جاتا ہے۔ اس کا ایک یا دو انچ کا دائرہ سا بن جاتا ہے۔ اسی کو چکے پڑنا کہا جاتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ دائیں جانب چکے۔ جس کے بعد گیس کی بد نغمی ہو جائے۔

آئرس وریکارل (Iris Ver) 30 چار  
گھنٹے بعد

☆ کمر پر چکے۔ ٹھنڈ سے حساس۔

سٹس کیناؤنس (Cistus Can)  
30 چار گھنٹے بعد

☆ پکتوں کے بعد چہرے کے اعصابی درد۔

کالمیا (Kalmia lat) 30 چار گھنٹے  
بعد

☆ سوزاک دبائے جانے کی وجہ سے چکے۔ چھلنے کے بعد جلن ہو جائے۔

تھو جا 200 تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ گالوں میں چھن اور درد۔ چہرے پر جلن سی محسوس ہو۔ گالوں میں سوزش۔ مسوڑھوں سے لے کر کانوں تک کانٹے، کھرپنے اور کھودنے والا درد اور حساسیت۔

یوفوربیا (Euphorbia) 30 چار گھنٹے  
بعد

☆ جلن اور تیزی سے پھیلنے والے درد کے ساتھ۔ شدید بے چینی اور فکر مندی۔

آرسنک البم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ گیس یا ہوا کی بد نظمی۔ تمباکو یا ٹھنڈی چیزیں پینے کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو۔ شام کے وقت تکلیف میں اضافہ ہو۔ ہلکی سی دہتی ہوئی چھینے والی تکلیف۔

ہلساٹلا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ اندھیرے سے خوف آئے۔ شدید قسم کے چکے۔ گرم اشیاء پینے سے تکلیف بڑھ جائے۔

سرامونیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ دائیں جانب چکے۔ شدید جلن کے ساتھ۔

کیسترس 30 چار گھنٹے بعد

☆ فرج کے ہونٹ پر دانے/داد/چکے۔

ٹیر۔ بستہ (Terebinth) 30 چار گھنٹے

بعد

☆ دائیں جانب چکے جو پیٹ کے پار بڑھ رہے ہوں۔ جلن کم کرنے اور نئے چکے پڑنے سے بچنے کے لئے۔

مرک سال 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ جلد کی سرنخی کے ساتھ سخت جلن اور درد۔ آبلے اور پیپ دار پھنسیاں بن رہی ہوں۔ بخنسیوں، مسوں اور گومڑوں کو سکھانے اور ان کی کھال اتارنے کے لئے۔

کروٹن گنم (Croton teg) 30

چار گھنٹے بعد

☆ پاخانہ قبض کے ساتھ۔ چمچا مادہ خارج ہو خاص طور پر بائیں جانب کے ایسے پکتوں کے لئے۔

گریفائٹس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ نشہ آور چیزیں کھانے پینے کی وجہ سے پسلیوں کے بیچ اعصابی درد۔ شدید قسم کا درد۔ جلن اور چھین۔ چھوٹے اور حرکت کرنے سے تکلیف بڑھے۔

ر۔ نین بلب 30 چار گھنٹے بعد

☆ عورتوں اور شراب کا رسیا۔ بیٹھے رہنے کا عادی۔ نظام انضام میں بد نظمی کی وجہ سے۔

نکس دامیکا 30 چار گھنٹے بعد

☆ چہرے پر موسم بہار اور خزاں میں ارغوانی رنگ کی پھنسیاں۔

لیکے سس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ پیپ پڑتی ہوئی پھنسیاں اور چکے۔ تیز درد کے ساتھ۔

زخم میٹلیکم 30 'چار گھنٹے بعد

☆ بخنسیوں پر بھورے کھرنڈ اور چھلکے۔ چھلنے کے بعد جلن۔ درد اور چھین۔

میزیریم 30 'چار گھنٹے بعد

☆ پھنسیاں بڑی سوجی ہوئی۔ جلن اور چھین۔ ٹھنڈی چیز لگانے سے آرام آئے۔

ایس ملنیکا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ بخار، بے چینی، جلن، چھین کے ساتھ پکتوں کے لئے سب سے اعلیٰ دوا۔

رہس ٹاکس 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد

بایو کیمک کی کالی میور 6x اور نیزم میور 12x بہترین ادویات

ہیں۔



# زہریلا گلہڑ / غدود درقیہ کا ناقص فعل

## Hypothyroidism

اس مرض میں تھائی رائیڈ غدود تو معمولی سا بڑھتا ہے لیکن اس کے ہارمون تھائی رائکسین کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مردوں کی نسبت عورتوں خاص طور پر جن کے بچے پیدا ہو رہے ہوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مرض مدتوں تک چلتا ہے۔ جس کی وجہ سے مریض کا وزن کم ہوتا جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اور جسم کے دوسرے اعضاء میں کچلی آجاتی ہے۔ خاص طور پر بازو آگے کی طرف کرنے سے زیادہ کانپتے ہیں۔ بد ہضمی، دست اور تے بھی آنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی بخار بھی ہو جاتا ہے اور پیشاب جلدی جلدی آنے لگتا ہے۔ آنکھیں باہر کو نکل آتی ہیں جس سے مریض گھبرایا ہوا سا نظر آتا ہے۔

اس بیماری کے اسباب نفسیاتی الجھنیں، لمبی بیماری، خوف، پریشانی، معدے کی خرابی وغیرہ سمجھے جاتے ہیں۔ کیونکہ وٹوق کے ساتھ اس مرض کا کوئی خاص سبب دریافت نہیں کیا جاسکا۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ مزمن کیسوں میں معاون دوا۔

ٹوبر کو لینم 1M پندرہویں روز تین مرتبہ

☆ خون کی کمی والا مریض۔ نرم خو اور نازک۔ اندھیرے اور بجلی کی کڑکھانے، طوفان سے خوف کھانے والا۔ نمکین اور لٹھڑی چیزیں پسند کرے۔

فاسفورس 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ جلدی غصے میں آجائے۔ غیر حاضر دماغی۔ خود اعتمادی کی کمی۔ یادداشت کمزور۔ کھانے کے بعد بہتر محسوس کرے۔

ایٹاکارڈیم 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ بہتر اور خوب کھانے کے باوجود لاغر ہوتا جائے۔

آیوڈیم 30 چار گھنٹے ہی

☆ جلدی اور آسانی سے پینہ آجائے۔ گرم طبیعت کا مریض۔ گرم مرطوب آب و ہوا میں تکلیف پڑھے۔ سمندر کے کنارے اور کسی قسم کی حرکت اور کسرت سے بہتر ہو۔

برائی اونیا 30 چار گھنٹے بعد

☆ لٹھڑ محسوس کرنے والا مریض۔ شرمیلا۔ اجنبیوں سے ملنا پسند نہ کرے۔ بچوں کی سی



عادتیں۔

برٹا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار تین مرتبہ

☆ مخالفت برداشت نہ کر سکے۔ رنجیدہ اور زودرنج۔ ٹمکین۔ افسردہ۔ چڑچڑاہٹ۔ بے چینی۔ میٹھی چیزوں کی خواہش کرے۔

تھائیرائڈین 5x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ اعصاب کا درم۔ وزن بڑھ رہا ہو۔ حمل ساقط ہو جاتا ہے۔

پائیرو جینم 200 یا 1M ہفتہ وار تین مرتبہ

☆ غیر شادی شدہ بوڑھے مرد عورت مجرد۔

کونیم میک 200 یا 1M ہفتہ وار تین مرتبہ

بائیو کیمک ادویات : کلیریا فاس 6x سیلیا 6x اور کلیریا فلور 12x چار گھنٹے بعد۔

گلہڑ / گھینگھ

Goitre

یہ مرض پہاڑی علاقوں یا جن مقامات کے پانی میں آیوڈین کی کمی ہو وہاں کے لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس مرض میں گلے کے تھائیرائڈ گلینڈ کا سائز بڑھ جاتا ہے اور گلہڑ ہو جاتا ہے۔ یعنی گردن موٹی ہو جاتی ہے۔ چھوٹا گلہڑ زیادہ تکلیف کا باعث نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بڑھ کر لنگ جائے تو بوجھ کی وجہ سے سخت تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ بعض اوقات سانس لینے میں بھی دقت ہوتی ہے اور تنگی نفس ہوتا ہے۔ گلہڑ بہت زیادہ بڑھ جانے پر اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے جو مشکل ہوتا ہے۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ معاون دوا خصوصاً "موٹے مریضوں کے لئے۔"

تھائیرائڈین 200 یا 1M پندرہویں روز چھ مرتبہ

☆ مرغی کے انڈے کے برابر جتنا بڑا کھر۔

برومیم 6 یا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ کھر کے اوپری دائیں لو کے گرد سخت سوجن دہانے والے درد کے ساتھ۔

نیزم کارب 30 'چار گھنٹے بعد

☆ بلوغت کی عمر پر جبکہ مریض کا میلان سردی لگنے کی طرف زیادہ ہو۔

کلکیریا 3x lod 'چار گھنٹے بعد

☆ جگر کی بد نظمی اور یرقان کے ساتھ بائیں جانب کے غدد متاثر ہوں۔

چیلی ڈونیم Q یا 6 'چھ گھنٹے بعد

☆ گنڈ مالا۔ رکی یا دہلی ہوئی ماہواری کی وجہ سے۔

فیرم 3x lod 'چار گھنٹے بعد

☆ دل سے متعلق علامات کے ساتھ۔ کھر کا کھچاؤ اور اکڑاؤ۔

کینکٹس (Cactus g) Q یا 6 'چار

گھنٹے بعد

☆ گنڈ مالا۔ غیر سمیت (زہر) کا کھر 'قبض' موٹا مریض۔

فیوکس 30-10 Q (Fucus Ves)

قطرے 'چار گھنٹے بعد

☆ سردی محسوس کرنے والا مریض۔ سخت اور سوجا ہوا کھر۔ نئے چاند پر مرض بڑھ جائے۔

کلکیریا کارب 200 یا 1M 'ہفتہ وار'

چھ مرتبہ

☆ گلے میں چھین کا احساس۔ دل کے قریب درد۔ سخت کھر جس میں ایسا محسوس ہو کہ

سانس کے ساتھ لی ہوئی دوا اس کے پیچ سے گزر رہی ہے۔

سپانجیا 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد

☆ گانٹھ دار کھر۔ گرمی اور سوزش سے سوجا ہوا کھر۔

فاسٹولا کا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ آہستہ آہستہ کھر کا سائز بڑھتا جائے۔ اچھی طرح کھانے کے باوجود مریض لاغر ہوتا

جائے۔ ماہواری کے دوران تکلیف میں اضافہ ہو۔ کھر میں درد اور درم۔

لوڈیم (Lodum) 30 یا 200 'چار

گھنٹے بعد

☆ غیر معمولی ٹھنڈے پن کا احساس۔ ہر بات میں مریض بہت زیادہ حساس۔ دائیں جانب کا کھڑ۔

ہیپر سلف 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

سوچے ہوئے اور سخت کھڑ کے لئے بائو کیمک کی کلکیریا فلور  
12x اور کلکیریا فاس 6x چار گھنٹے بعد دینا مفید ہے۔

## گوشت کا مردہ ہو جانا جسم کی کسی بافت کا گلنا سڑنا/فساد

### Gangrene

گنگرین سے مراد کسی عضو یا گوشت کا مردہ ہو جانا یا سڑا جانا ہے۔ گنگرین تین قسم کی یعنی خشک گنگرین، تر گنگرین اور گیس گنگرین ہوتی ہے۔ خشک گنگرین میں خون کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ فاصلے والے اعضاء کو کافی مقدار میں خون نہیں پہنچتا ہے۔ جیسے پاؤں کی انگلیاں وغیرہ۔ اعضاء خون کم ملنے کی وجہ سے بتدریج سوکھنے لگتے ہیں۔ ان کی حس اور حرکت ختم ہو جاتی ہے اور مردہ ہو کر آہستہ آہستہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ مرض عام طور پر ذیابیطس کے مریضوں اور بوڑھے لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ تر گنگرین میں متاثرہ عضو کی جلد پر آبلے اور چھالے ظاہر ہوتے ہیں۔ اچانک خون کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ گنگرین کی دوسری علامات بھی موجود ہوتی ہیں۔ گیس گنگرین کے مریضوں کے عضلات میں گیس بھر جاتی ہے جن کو دبانے سے آواز نکلتی ہے ان میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی گنگرین چوٹ لگنے اور حادثے کے بعد ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور یہ بہت پھیلتا یا بڑھتا ہے اور متاثرہ اعضاء کو کاٹنے کی نوبت آجاتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ خاص طور پر بڑھاپے میں ہتھکڑوں اور اندام نہانی کی بافتوں کا گلنا سڑنا۔ گرمائش سے بہتر محسوس کرے۔

کریازوٹ 30 چار گھنٹے بعد

☆ خون بننا بند ہو جائے۔ خون کی سمیت کی وجہ سے متاثرہ حصہ پیلا یا نیلا ہو جائے۔  
لیکے سس 30 چار گھنٹے بعد



☆ کسی مشینی چوٹ کے بعد کسی بافت کا گلنا سڑنا۔

ایسڈ سلف 30 'چار گھنٹے بعد

☆ خشک گنگرین۔ خاص طور پر پیروں اور انگوٹھوں کا گنگرین۔ متاثرہ حصہ ٹھنڈا اور بن ہو جائے۔ ٹھنڈی چیز لگانے سے بہتر ہو۔

سیکالے کار (Secale Cor) 30 یا

200 'چار گھنٹے بعد

☆ تر گنگرین۔ متاثرہ حصے سے رطوبت آسانی سے بنے۔

کروٹالس ہیرائڈس (Crotalus h)

30 'چار گھنٹے بعد

☆ ٹائی فائیڈ بخار کی سی علامات۔ ہونٹوں کا گنگرین۔

پٹیشیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ گندی رطوبت نکلے۔ قے آئے۔ زبان بھوری ہو۔ جلدی جلدی بدبودار ڈکاریں آئیں۔ شدید کھانسی۔ کوئی خوراک لینا پسند نہ کرے۔ ہونٹ کی گنگرین۔

ایسڈ میور 30 'چار گھنٹے بعد

☆ تھکن اور بے چینی۔ خشک گنگرین خاص طور پر بھجھڑوں اور اندام نہانی کی جس میں جلن اور سوزش ہو۔ گرمائش سے بہتر ہو۔

آرسنک البم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ میلی کیٹکین۔ برف کی طرح ٹھنڈا۔ متاثرہ حصے سے رطوبت خارج ہو۔ مریض تازہ ہوا اور پنکھا کرانا پسند کرے۔

کاربووٹیج 30 'چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی سیلیا 30 'چار گھنٹے بعد دینا مفید ہے۔ لگانے

کے لئے Echinacea لوشن فائدہ مند ہے۔





# ناسور/زخم

## Affections of Ulcers

(See abscess and Bolls also)

جسم کے مختلف حصوں یا اعضاء میں بعض وجوہ سے زخم یا السر ہو جاتا ہے۔ اصول طور پر تو السر اور زخم بننے کے اسباب معلوم کر کے ان کا صحیح طریقے سے علاج اور احتیاطی تدابیر کرنی چاہیں۔ تاہم السر اور زخم کی ہیئت، شکل و شباہت، رنگت، ساخت اور کیفیات اور جس مقام پر زخم/السر ہے اس کی مناسبت سے علامات کی روشنی میں متعلقہ دوا کا باقاعدہ استعمال صحت یابی کا ضامن ہوتا ہے۔ عام طور پر السر سے مراد معدے کا زخم لیا جاتا ہے جس کی علامات سوزش، جلن، ڈکاریس، کلیجہ جلنا، بدہضمی متلی تے اور فم معدہ ہیں۔ چونکہ معدے کے السر کی وجہ سے اور بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لہذا اس کا بروقت اور مناسب علاج ضروری ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ ایسا ناسور یا زخم جس کو ٹھنڈ سے آرام آئے اور گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔  
لیڈم پال 30 یا 200، چار گھنٹے بعد
- ☆ لالتوں، ایزویوں اور ناخنوں کا ناسور یا السر۔  
سلیسیا 12x یا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ ارغوانی رنگ کا اور بہت زیادہ حساس زخم یا ناسور۔ کپڑے تک کا لگنا برداشت نہ کر سکے۔  
لیکے کس 30 یا 200، چار گھنٹے بعد
- ☆ سوزاکی السر جس کی تکلیف سرد موسم میں بڑھ جائے۔  
پٹرولیم 30 یا 200، چار گھنٹے بعد
- ☆ بہت زیادہ ذکی الحس السر۔ ایسا السر جس کے کنارے اٹھے ہوئے اور سخت ہوں اور ان سے آسانی کے ساتھ خون بہنے لگے۔  
آسفونڈا 30، چار گھنٹے بعد

☆ مقعد کا ناسور جس کا نپل یا چکر سرخ اور سوزشی ہو۔ جس سے بدبودار پیپ کی نسبت خون زیادہ خارج ہو۔

کاشی کم 30 چار گھنٹے بعد

☆ معدے کا مزمن السر - جلد کے اوپر بھدا سا زخم۔

برومیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ کالے رنگ کا زخم جس سے بدبودار رطوبت خارج ہو اور اس کی سطح بھی رطوبت سے بھری ہو۔

پیشیا 30 چار گھنٹے بعد

☆ السر کا زخم بھرنے اور رطوبت کے اخراج کو روکنے کے لئے نرم تالو کے السر کے لئے۔ ٹھنڈ اور چھونے سے ذکی الحسی۔

بیر سلف 30 چار گھنٹے بعد

☆ مرکزی کے اثرات بد کی وجہ سے پیدا ہونے والے اندرونی السر کے لئے۔

ار جشم ٹاسٹرکیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ پیلے السر کے لئے۔ ٹاسٹرکیم کی گہرائی میں زخم۔ کسی ایک جگہ پر السر - ٹانگ کا پرانا السر - کلائی کے اوپر کے السر کے لئے۔

کالی بیج 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ ایسا السر جس میں ٹھنڈک سی محسوس ہو۔ ایسے السر کے لئے جس کا بہت عرصے تک ایلو پیتھک علاج کیا گیا ہو لیکن دواؤں کا اثر نہ ہوا ہو۔

مرکیورس سال 1M یا اوپچی طاقتیں  
ایک خوراک

☆ زخم کی نسجی کلن سڑن اور بگڑ جانے کے لئے۔

کریازوٹ 30 چار گھنٹے بعد

☆ بھسکروں کے السر کے لئے جس کی وجہ سے سانس اور کھانسنے کی تکلیفات میں رات کے تین چار بجے کے قریب اضافہ ہو جائے۔

کالی کارب 30 چھ گھنٹے بعد

☆ چہرے اور ہونٹ کے زخم یا السر - بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو۔

کونیم میک 200 چھ گھنٹے بعد

☆ ارغوانی رنگ کے السر جس پر کالے سے دھبے ہوں۔ ڈھیلی پتھدار پانٹوں کا السر - ناڑیوں کا عمل معطل ہو گیا ہو یا ناڑیں بے حس و حرکت ہو گئی ہوں۔

کاربوج 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ منہ کا السر - منہ میں چھالے۔ معمولی سی چوٹ پک جائے اور السر بن جائے۔

بوریکس 30 چار گھنٹے بعد

☆ بہت زیادہ سرخ السر - چمک دار السر - سیاہی مائل السر -

لیک کینٹنم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ بلغی تحلیلوں کا السر - معدے اور آنتوں کے السر کے لئے۔

سیلی سامکک ایسڈ 30 چار گھنٹے بعد

☆ بے حس قسم کا السر - فیون کھانے کی وجہ سے پیدا ہونے والے السر کے لئے۔

اوپیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ ریاحی السر اور سل یعنی ہیمپروں سے خون آئے۔

اورنی تھوکیلیم (Ornithogalum)

Q یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ ایسا زخم یا السر جس پر سفید یا پیلے رنگ کا کھرٹ یا یزی آ جائے۔ یا ارد گرد آبلے یا چھالے ہوں۔

میزیریم 30 چار گھنٹے بعد



# زہر کے اثرات

## Poisoning

(See allergies of food poisoning also)

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کلوروفارم کے زہر کے لئے۔

ایسک ایسڈ 30 یا 200' آدھے گھنٹے

بعد

☆ تارکول کی زہریلی گیس کے لئے۔

امونیم کارب 3 یا 6' آدھے گھنٹے بعد

☆ تابکاری کے بخارات اور شعاعوں کے لئے۔

فاسفورس 6 یا 30' آدھے گھنٹے بعد

☆ گلے سڑے پھل کھانے کی وجہ سے زہریلے اثرات۔ مادہ عفونت کا زہریلا پن۔  
آرسنک الیم 30' آدھے گھنٹے بعد

دیگر اہم ادویات : کاربوئیج، ورائٹم الیم، رہس ٹاکس،  
کروٹون، مگنیم اور مرک سال وغیرہ۔





# کوڑھ / جذام

## Leprosy

جذام ایک متعدی مرض ہے۔ اس مرض میں ہاتھ پاؤں اور انگلیوں وغیرہ کے جوڑوں میں درم ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے اور ان اعضاء کے پورے جھڑ کر مریض لتکڑالولہ اور پابج ہو جاتا ہے۔ شکل بگڑ کر بد صورت ہو جاتی ہے۔ جلد بد شکل اور بے حس ہو جاتی ہے۔ جسم میں طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ نظر بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جلد بے حس ہو جانے کی وجہ سے چوٹ اور جلنے تک کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ بد ہضمی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اکثر مریضوں کو ہیکسٹروں کی ٹی بی ہو جاتی ہے۔

یہ مرض ایک قسم کے کرم سے پیدا ہوتا ہے جسے میڈیکل کی زبان میں جرثومہ جذام (بیس لس لیری) کہا جاتا ہے۔ یہ کیرا زخموں میں پایا جاتا ہے۔ یہ مرض متاثرہ شخص سے صحت مند کو لگ جاتا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ گلی سزی مچھلی کھانے سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ آنشکی مریض اکثر اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جذام کے مریض سے پرہیز اور دور رہنے کی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ علاج شروع کرنے کے لئے سب سے اعلیٰ دوا۔

سلفر CM ماہانہ، تین مرتبہ

☆ جیرس اور پھن، چیچا مادہ نکلے۔ میوزک سن کر مریض رونے لگے۔

گریفائٹس 200 یا 1M پندرہویں

روز، چھ مرتبہ

☆ متاثرہ حصے ٹھنڈے ہوں۔ حس ختم ہو گئی ہو۔

سیکالے کار 200 یا 1M پندرہویں روز

چھ مرتبہ

☆ جلد موٹی پڑ جائے۔ کھربڑ آنے لگیں۔

ہائیڈرو کورتائیل 30 یا 200 چار گھنٹے

بعد

☆ سفلس کی وجہ سے۔ جلد موٹی ہونے لگے۔

تھارائیڈینیم (Thuraidinum) 200

یا 1M ہفتہ وار، چھ مرتبہ

☆ ہڈیوں کے تمام ابھاروں کے اوپر پھنسیاں ہوں۔

ہرا براوا (Hura Br) CM 'ماہانہ' تین

مرتبہ

☆ ہاتھوں اور پیروں کے سن ہونے کی شکایت کے ساتھ۔

ہو گنٹن (Hoangnan) 'Q' 7-5

قطرے، چار گھنٹے بعد

☆ گومڑی اور تپ دق کا دانہ۔ جلد کا موٹا ہونا۔ پیٹ میں گرمی کا احساس۔

کیلوٹراپس (Calotropis) 200 یا

1M ہفتہ وار، چھ مرتبہ

☆ الکلیوں اور انگوٹھوں کا جھڑنا۔ رات کے وقت پسینہ آئے۔

آرسنک آیوڈیم 30 اور اس سے اوپر

کی طاقتیں، چھ گھنٹے بعد

☆ سخت مایوسی۔ خودکشی کے رجحان کے ساتھ۔ زندگی سے بیزاری۔

اورم میسلیم 200 یا 1M 'ماہانہ' تین

مرتبہ

☆ جب خاندان میں تپ دق کی علامات پائی جائیں تو معاون دوا۔

ٹوبرکولینم 1M ہفتہ وار، چھ مرتبہ

☆ معاون دوا کے طور پر۔

بیس لینم 1M پندرہویں روز، چھ مرتبہ

بائو کیمک کی کلیریا فلور 12x اور سیلیا 30x چار چار گھنٹے

بعد دنا بھی فائدہ مند ہے۔

دیگر ادویات : اناکارڈیم or آرسنک البم۔ الیرس

(Elaris) کریولس ہار (Cratulas hor) سفیلیم وغیرہ۔



# پھل بھری / جسم پر پیدائشی سفید داغ

## Leucoderma Vitiligo

(Whitish discoloration of the Skin)

اس مرض میں عموماً "چہرے اور ہاتھوں کی جلد پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں۔ جسم کے دوسرے حصوں پر جا بجا داغ پڑتے ہیں۔ ابتدا میں یہ داغ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ بڑھ اور پھیل جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ مرض موروثی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل آتشک اور عصبی کمزوری بھی اس مرض کے اسباب ہو سکتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ پھل بھری کی اعلیٰ دوا۔

آرسنک سلفیورائٹم 3x چار گھنٹے بعد

☆ معاون دوا۔

ٹوبرکولینم 1M پندرہویں روز، چھ مرتبہ

ان کے علاوہ آرم، ٹیلیکم، بیسی لینم، ہائیڈروکورتائل، لائیگوپوڈیم،

نیزم میور، ٹائٹریک ایسڈ، سیپیا اور تھو جاس OC بھی مفید ادویات

ہیں۔



## جلنا

## Burns

## علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ اگر جلا ہوا حصہ یا جلد ناسور یا زخم بننے کی طرف مائل ہو۔  
 سلیسیا 30 یا سلفر 30، تین گھنٹے بعد،  
 تین مرتبہ
- ☆ ریڈیم ایکسٹریکٹ سے جلنا۔

فاسفورس 200 یا کیڈمیم آیوڈیم  
 (Cadmium Iodum) چار گھنٹے  
 بعد، تین مرتبہ

- ☆ دھوپ اور گرمی سے جھلس جانا۔ خون کا اجتماع سر کی جانب ہو جائے۔ چہرہ تھمتا جائے۔  
 بیلاڈونا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ گرم پانی یا گرم تیل سے جل جانا جبکہ آبلے نہ بنے ہوں۔

آرمیکا یورنس (Urtica Urens) 30  
 دو گھنٹے بعد

- ☆ جب جلنے کی وجہ سے شدید تشویش ہو اور موت واقع ہونے کا ڈر ہو۔ جلا ہوا حصہ گرم  
 اور سوجا ہوا ہو اور بخار بھی ہو۔

اکوناٹ 30 یا 200، 15 منٹ بعد، چھ  
 مرتبہ

- ☆ ہر قسم کے جلے ہوئے کے لئے۔
- کیسترس 30، چار گھنٹے بعد

- ☆ اگر جلی ہوئی جگہ میں پیپ پڑنا شروع ہو جائے اور جلا ہوا حصہ بہت حساس ہو جائے۔  
 سیبر سلف 200، 10 منٹ بعد، تین

مرتبہ  
 بیرونی طور پر لگانے کے لئے کیسترس لوشن۔ اگر زخم بن  
 جائے تو کیلنڈولا لوشن لگایا جائے۔





## کیڑے اور جانوروں کا کاٹنا

(Bites of animals, insects etc)

جب تک کوئی مخصوص علاج شروع نہ کیا جائے اس وقت تک درج ذیل ادویات میں سے علامات کے مطابق کوئی سی دوا دینا فائدہ مند ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ مکھی کے کاٹنے کی صورت میں۔

ایس ملنیکا 30، تین گھنٹے بعد  
اس کے علاوہ متاثرہ جگہ پر ارٹیکا یو  
لوشن (Urtica U) لگانے سے بہت  
فائدہ ہوتا ہے۔

☆ مچھر کے کاٹنے کے لئے۔

شینفی میگریا 30، تین گھنٹے بعد

☆ بھڑکے کاٹنے پر۔

آرنیکا 200، آدھے گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ جو تک کے کاٹنے کے لئے۔

پیو لکس ارٹینس (Pulex Irritans)  
30، دو گھنٹے بعد

☆ ناگ، سانپ یا جان لیوا قسم کے کیڑوں کے کاٹنے کے لئے۔ Q Hoangnan اور  
Golondrina Q کے دس قطرے پندرہ پندرہ منٹ کے بعد چھ مرتبہ دینا بھی مفید ہے  
علاوہ ازیں Q Lycopus بھی بہت اچھی دوا ہے۔ 200 Cedron ہر ایک دو گھنٹے بعد  
دینے سے بھی اچھے نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

بپلاڈونا 200 اور مرکبوس سال 200  
کے بعد دیگر، تہال کے طور پر 10 منٹ  
بعد

☆ مٹی (یہ ایک بہت چھوٹا سا چھری طرح کا کیرا ہوتا ہے) کے کانٹے کے لئے۔

سیپتھرس 200 ' پندرہ منٹ بعد ' تین

مرتبہ

☆ چوہے یا بچھو کے کانٹے کے لئے۔

لیڈم پال 200 ' آدھے گھنٹے بعد ' تین

مرتبہ

☆ کتے یا اسی قسم کے کسی اور جانور کے کانٹے کے لئے۔

لانسین (Lyssin) 200 ' 10 منٹ

بعد ' تین مرتبہ

ماترہ جگہ پر ایکی نو سیا لوشن (Echinocea) لگانا بھی بہت

مفید ہے۔



# بستر کے زخم

## Bed sores

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ جب مٹاڑہ جسم کے حصے زخمی ہو جائیں اور ان سے مادہ رسنے لگے۔  
کروٹیل ہائڈراسٹس (Crotalus h) 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، چھ مرتبہ
- ☆ ابتدائی دنوں میں جبکہ بستر پر لیٹے ہوئے رگڑ یا خراش سی محسوس ہونے لگے یا زخم بننے شروع ہو جائیں۔  
آرنیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ پرانے کیسوں میں جب بستر کے زخم گھنے سڑنے لگیں یا ناسور بن جائیں۔  
سلفر 30 یا 200 10 منٹ بعد، تین مرتبہ
- ☆ ٹائی فائڈ کے بخار کے کیس کے لئے یا جب بیماری بہت طویل ہو جائے۔  
پیشیا Q یا 6 تین گھنٹے بعد
- ☆ پرانے کیسوں میں جبکہ پتلی، خونی اور بدبودار پس لگا تار خارج ہونے لگے۔  
سلیسیا 12x یا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ خون میں زہر کی آمیزش کی وجہ سے یا زخم بگڑ جانے کی وجہ سے مادہ خارج ہونے لگے۔  
ایسی صورت میں Echinocoea لوشن کو بیرونی جلد پر ملا بھی جاسکتا ہے۔  
ایکی لوسیا Q یا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ جب بستر کے زخم بہت زیادہ درد کرنے لگیں۔ مریض ان کو چھوا جانا تک برداشت نہ کر سکے اور بہت زیادہ حساس ہو جائے۔  
ہیبیر سلف 30 یا 200 10 منٹ بعد، تین مرتبہ
- ☆ جب زخموں کے کنارے نیلے سے ہو جائیں۔ چھونے سے شدید تکلیف ہو۔ کچا لہو خارج ہونے لگے۔  
لیکے سس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، چھ مرتبہ

☆ تپ دق کے مریضوں کے لئے معاون دوا۔

ٹویر کو لینم 200 K 10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

بائیو کیملک کی کلکیریا فاس 6x ہر چار گھنٹے بعد دینا بھی بڑا مفید ہے۔

بیرونی استعمال کے لئے : کیلنڈولا لوشن کو زخم صاف کرنے کے لئے اور کیلنڈولا مرہم زخموں پر لگانے کے لئے استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔

## زخم کے نشان کے پاس ریشہ دار ابھار

Keloids

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ زخم کے نشانات اور ابھار رفع کرنے کی سب سے اعلیٰ دوا۔

تھیوسینا مائن 3x (Thiosinamine)

چار گھنٹے بعد

☆ زخموں کے نشانات کے پاس ابھاروں کی وجہ سے اپنی بد صورتی کے احساس کی وجہ سے زندگی سے بیزار ہو اور خودکشی کے خیالات ذہن میں آنے لگیں۔

اورم میلکیم 200 یا 1M ہفتہ وار

تین مرتبہ

☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والے مریضوں کے لئے۔ زخم کے نشانات اور ابھار رفع کرنے کی بہترین دوا۔

سلیسیا 200 یا 1M ہفتہ وار، چھ مرتبہ



☆ جب زخم کے نشانات کے قریب ابھاروں میں درد بھی ہو تو معاون دوا کے طور پر۔  
ٹائٹریک ایسڈ 200 یا بڑی طاقت

☆ جب زخم کے نشانات کے قریب کے ابھاروں میں گہری پھن ہو۔ مریض کو قبض کے  
ساتھ اجابت ہو۔  
گریفائٹس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ پرانے زخم اور جلے ہوئے نشانات کے قریب ابھاروں کے لئے۔  
کاشی کم 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ نشانات کے ابھار سرخ ہوں۔ جلن ہو۔ گرمائش سے تکلیف بڑھ جائے۔ بہت زیادہ ہیند  
آئے۔  
فلورک ایسڈ 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ جب کہ دق کی علامات بھی موجود ہوں یا خاندان میں دق کی علامات پائی جائیں۔  
ٹوبرکولینم 1M پندرہویں روز چھ مرتبہ  
ہائیو کیملک کی کلکیریا فلور 12x بھی مفید دوا ہے۔



# چوٹیں / زخم

## Injury

(Trauma, cuts, wounds etc)

عام زندگی میں ہر شخص کو کوئی نہ کوئی چوٹ آجاتی ہے یا کوئی زخم لگ جاتا ہے۔ مثلاً "انگلی کٹ جانا" خراش آجانا، ٹھوکر لگ جانا، پاؤں مڑ جانا، کسی طرح ہاتھ پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ دب کر چوٹ آجانا، ہڈی پر چوٹ آجانا وغیرہ معمولات کی بات ہے۔ ان چوٹوں اور زخموں کا بروقت اور صحیح علاج کر لینے سے ان کے بڑھ جانے سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بچا جاسکتا ہے۔ بصورت دیگر بعض چوٹیں اور زخم ناسور بن جاتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ آنکھ کے اگلے صاف پردے قرئیہ کی چوٹ۔

ادویم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ چوٹوں کی سب سے اعلیٰ دوا۔ نرم حصوں کے خراشدار درد اور سوجن وغیرہ کے لئے۔ یہ دوا چوٹ کی وجہ سے بے ہوشی کے لئے بھی مفید ہے۔

آرینکا 200 یا 1M 'تین گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ چوٹ کی پٹی سے خون باہر تک بننے کی صورت میں۔

سٹرانٹیم کارب

30 (Strontium Carb) 'چار گھنٹے

بعد

☆ چوٹ کے بعد آنکھ کا موتیا بند۔

کونیم 30 یا 200 'پندرہویں روز' تین

مرتبہ

☆ موج یا زیادہ دباؤ پڑنے کی وجہ سے چوٹ دتر۔ بندھی۔ پٹھوں اور ریشہ دار بافتوں کی چوٹ کے لئے۔

رہس ٹاکس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ جب چوٹ لگنے کے بعد مریض کا جسم صدمے سے ٹھنڈا پڑ جائے اور وہ بے ہوش ہو جائے۔

کمفر 5 Q قطرے، پندرہ منٹ بعد،  
تین مرتبہ

☆ خراشیں، رگڑیں، چوٹ کی وجہ سے زخم۔

کیلنڈولا 30، چار گھنٹے بعد

☆ قرنیہ زخمی ہو جائے۔ سوزش ہو جائے، ککے یا چوٹ سے۔ کسی تیز چیز سے کٹ کر زخم بن جائے۔

☆ کیرٹوں کے کانٹے، ناخن چبھ جانے یا اکڑ جانے سے کھسکیاں چبھ جانے سے زخم بن جائیں۔ ٹیسٹس سے بچنے کے لئے۔

لیڈم پال 200 یا 1M 10 منٹ بعد،  
تین مرتبہ

☆ ہڈی اور ہڈی کے غلاف کی چوٹ۔ کلائی اور ٹخنے کی موج۔ گھریلو خاتون کے گھٹنے کی چوٹ کے لئے۔

روٹا 30 یا 200، چھ گھنٹے بعد

☆ دروازے یا مشین وغیرہ میں انگلیاں دب جائیں۔ اعصاب اور پٹھوں اور کمر یا ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ کے لئے۔

ہائبریکم 200 یا 1M 10 منٹ بعد،  
تین مرتبہ

☆ موج، خراش، چھل جانے، رگڑ وغیرہ اور بانٹوں کی گہری چوٹ کے لئے۔

بیلز (Bellis) P 6 یا 30، چار گھنٹے

بعد

☆ جب چھوٹے زخموں سے زیادہ خون بہے۔ خون چمکدار اور سرخ ہو۔ جیسے دانت نکلنے کے بعد آتا ہے۔

فاسفورس 30 یا 200 10 منٹ بعد،  
تین مرتبہ

☆ زخم بھرنے کے بجائے کالے پڑ جائیں۔

☆ کاربوئیج 30: چار گھنٹے بعد  
سر پر کسی چیز کے گرنے سے، سر کے بل کھڑے ہونے کے نتیجے میں چوٹ آنے اور سر کی چوٹ کے برے اثرات کے لئے۔

☆ نیرم سلف 200 یا 1M: 10 منٹ بعد  
تین مرتبہ  
☆ خون میں زہر پھیل جائے۔ گندے خون، پیپ یا زہریلے مادہ کی وجہ سے بخار اور بے چینی۔

☆ پائرو جینم 200 یا 1M: 10 منٹ بعد  
تین مرتبہ  
☆ ایسے زخم جن میں شدید درد ہو اور وہ بھر نہ رہے ہوں۔

☆ ٹائٹریک ایسڈ 30: چار گھنٹے بعد  
☆ عمل جراحی سے کسی عضو کے کاٹنے کے بعد۔ ٹنڈ (کٹے ہوئے عضو کے کنارے) کا بے حس ہو جانے وغیرہ کے لئے۔

☆ الیم سیپا 30 یا 200: چار گھنٹے بعد  
☆ جب کمفر Q کام نہ کرے اور جسم ٹھنڈا رہے۔ مریض پنکھا کرانا چاہے۔

☆ کاربوئیج 30 یا 200: 15 منٹ بعد  
تین مرتبہ  
☆ جب کاربوئیج بھی موثر نہ ہو اور جسم ٹھنڈا رہے۔

☆ ورائٹم الیم 30 یا 200: 15 منٹ بعد  
تین مرتبہ

بائیو کیمک کی گلیکیریا فاس 6x اور کالی فاس 6x بھی مفید  
دوائیں ہیں۔

بیرونی استعمال کے لئے : زخم سے خون روکنے کے لئے  
فیرم فاس 1x چھڑکنی چاہئے اور کیلنڈولا مرہم یا لوشن سے پٹی  
کرنی چاہئے۔





# داد

## Ringworms

یہ ایک جلدی مرض ہے۔ اس مرض میں باریک باریک دانے اکٹھے ہو کر کچے سے بن جاتے ہیں۔ بعد میں ان کے پھوٹ جانے سے تھوڑی سی آبی رطوبت نکلتی ہے۔ مرض کے آنکھوں دسویں روز داد خشک ہو جاتا ہے اور اس پر سے بھوسی کے چھلکے سے جھڑتے ہیں۔ چونکہ ابتدائی پختے کھل ہو کر گول چھلوں کی مانند ہو جاتے ہیں اسی لئے اس مرض کو رنگ دارم کہا جاتا ہے۔ جس میں شدید خارش اور جلن ہوتی ہے۔ اس مرض کا عام سبب صفائی نہ رکھنا اور خون میں نقص پیدا ہو جانا ہے۔ ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ داد کی بہترین دوا۔

بیس لینیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

☆ شدید کھجلی۔ مریض اس قدر کھجائے کہ خون بننے لگے، جس سے کچھ افادہ ہو۔ متاثرہ جگہوں سے بدبو آئے۔

سورینیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ بدبودار پسینے کے ساتھ داد۔ گرم مرطوب موسم میں تکلیف پڑھے۔

ڈلکا مارا 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ پسینے اور جسم میں سے لسن کی سی تیزبو آئے۔

نیلوریم 30 چار گھنٹے بعد

☆ کھوپڑی کے اوپر داد۔ بال کے کچے اتریں اور گرنے لگیں۔ جلد خشک اور کھردردی ہو جائے۔ شدید بے چینی اور نہ بچنے والی پیاس۔

آرسنک البم 30 چار گھنٹے بعد

☆ نمانا پسند نہ کرے۔ بھوک اڑ جائے۔ بد ہضمی اور ڈکاریں اور ساتھ ہی تیزابیت ہو۔

سلفر 200 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ جسم کے اوپری حصے پر کہیں کہیں دھبے پڑ جائیں۔ چہرے پر داد ہو جائے۔ گرمائش اور گرم چیزیں لگانے سے بہتر آئی ہو۔

سیپیا 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ  
بائیو کیمک کی نیزم میور 12x یا 30x ہر چار گھنٹے بعد دینا بھی  
مفید ہے۔

دیگر اہم ادویات : ہائیڈراسٹس کین، کلیمیس، نوبرکولینم،  
نیزم کارب، کلیریا کارب، کرائز و ایسڈ وغیرہ۔

## موتیا سیتلا / کاکڑا لاکڑا

### Chicken Pox

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ بچک کے چھالوں میں جلن۔ زبان کی نوک سرخ۔ بے چینی۔
- ☆ پریشانی کے ساتھ تیز بخار۔ چہرہ سرخ متمایا ہوا۔
- ☆ اکونائٹ 30 یا 200 دو گھنٹے بعد
- ☆ جب بخار اتر جائے اور آبلے خشک ہونا شروع ہو جائیں۔
- ☆ مرک سال 30 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ بغیر پیاس کے بخار۔ اگرچہ حلق خشک ہو۔ کھلی اور ٹھنڈی ہوا کی خواہش ہو۔
- ☆ ہلساٹلا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ سر درد کے ساتھ بخار۔ چمکتا ہوا سرخ چہرہ۔ سر کی طرف خون کا اجتماع۔
- ☆ بیلاڈونا 30 تین گھنٹے بعد
- ☆ احتیاطی دوا۔

ویرو لینم (Variolinum) 30 '10

منٹ بعد، تین مرتبہ

بائیو کیمک کی کالی میور 6x اور فیرم فاس 6x یکے بعد دیگرے  
دو دو گھنٹے بعد دینا بھی مفید ہے۔



# خسرہ / کھسرہ

## Measles

خسرہ کا مرض ایک وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ یہ نہایت باریک جراثیم ہوتے ہیں۔ یہ ایک متعدی مرض ہوتا ہے اور اس کا زہر ایک مریض سے دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ یہ مرض ایک مرتبہ ہونے کے بعد قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اس لئے عام طور پر دوسری مرتبہ نہیں ہوتا۔ یہ بیماری عموماً "بچوں کو ہوا کرتی ہے۔ اس مرض کے شروع میں شدید بخار ہوتا ہے اور تیسرے چوتھے روز جسم پر سرخ رنگ کے دانے نکل آتے ہیں اور کبھی کبھار اعضاء تنفس میں سوزش پیدا کر دیتے ہیں۔ ابتدا میں دانے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں اور پھر گردن، سینے اور پھر تمام جسم پر نکل آتے ہیں۔ زیادہ دانے نکلنا بہتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرض کی گرمی باہر نکل آئی ہے۔ دو تین دن تک دانے نکلنے کے بعد بخار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دانے مرجھانے شروع ہو جاتے ہیں۔ دانوں کی رنگت بھوری سی ہونے لگتی ہے اور ان کے اوپر سے بھوسی یا چھلکے اترنے لگتے ہیں اور جسم پر سخت خارش محسوس ہوتی ہے۔ مرض کے مندل ہونے کے دوران اسہال آنا اچھی علامت سمجھی جاتی ہے لیکن زیادہ دست آنے کی صورت میں علاج کرانا ضروری ہوتا ہے۔ خسرہ کے بعد چند دوسرے امراض ابھر آنے کا خدشہ ہوتا ہے مثلاً "بد ہضمی، کھانسی، دست، خارش، گلے کے غدود کا ورم، کانوں کا بہنا وغیرہ۔ ان بیماریوں کا علاج کرنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ امراض پیچیدہ صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس مرض میں مریض کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہئے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ مانع مرض دوا۔

ماربیلینم (Morbillinum) 10'200

منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ آنکھیں سوجی ہوئی، جس میں جلن ہو اور آنسو بہیں۔ پیاس نہارد، تیز بخار، اوڑھا ہوا کپڑا اتار پھینکے۔ ٹھنڈ سے بہتر ہو۔

ایس ملفیکا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ چچک کے ساتھ آنکھوں اور کانوں سے بیدار چپکنے والا مادہ خارج ہو۔

کالی بالی کروم 30، چار گھنٹے بعد



☆ نزلے کے ساتھ تیز بخار۔ آنکھ کا پردہ سرخ۔ خشک کھانسی۔ سرخ دانوں میں جلن ہو۔ بے چینی اور فکر مندی۔

☆ اکونائٹ 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد  
☆ زبان پر سفیدی جمی ہوئی۔ سینے میں خرخراہٹ۔ ڈھیلی کھانسی ریشہ نکالنا مشکل ہو۔ سانس لینے میں دقت ہو۔

☆ انٹم ٹارٹ 30 یا 200 '10 منٹ بعد'  
تین مرتبہ  
☆ سینے میں خرخراہٹ کے ساتھ کھردری کھانسی ہو۔ ٹھنڈ اور چھینٹنے سے بہت زیادہ حساس۔

☆ ہبیر سلف 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد  
☆ آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہے۔ منہ خشک لیکن پیاس ندارد۔ کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں بہتر محسوس کرے۔

☆ ہلساٹیل 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ  
☆ سینے میں بھاری پن اور کھچاؤ۔ بائیں جانب لیٹ نہ سکے۔ تھکا دینے والی خشک کھانسی تے کر دینے کی خواہش کے ساتھ۔ برف کی طرح ٹھنڈی چیزوں کی خواہش کرے۔

☆ فاسفورس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ  
☆ بڑی مقدار میں پانی پینے کی پیاس۔ خشک اور تکلیف دہ کھانسی جس سے سینے میں جھپن والا درد ہو۔ اونگھ اور غنودگی۔ زبان میل آلود۔ ہونٹ خشک۔ پاخانے قبض کے ساتھ۔ حرکت کرنے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

☆ برائی اونیا 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد'  
☆ بے چینی کے ساتھ بخار۔ زبان کی نوک تینوں طرف سے سرخ۔ حرکت کرنے سے بہتر محسوس کرے۔

☆ رہس ٹاکس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
☆ شدید تپکن والا سرد درد اور ٹاک سے بے ضرر پانی بہے۔ آنکھیں چندھیا گئیں اور گرم جلن والے آنسو نکلیں۔

☆ نیوفرنیا 30 'چار گھنٹے بعد'



☆ چہرہ سرخ چمکدار جس سے چٹکن ظاہر ہو۔ جلد خشک اور گرم۔ خون کا سر کی جانب اجتماع۔ گلا درم آلود۔

بیلاڈونا 30' تین گھنٹے بعد

☆ کبھی ٹھنڈ لگے اور کبھی گرمی۔ بے چینی۔ غنودگی۔ پاگل سا ہوا جائے۔ پیشاب کرنے کے بعد بہتر ہو۔

جیلی میم 30' چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x اور کالی فاس 6x بھی قائمہ مند ادویات ہیں۔



# چچک

## Small Pox

یہ ایک متعدی مرض ہے۔ اس کی ابتدا میں بخار ہوتا ہے۔ چہرہ سرخ اور تھمتا جاتا ہے۔ کمر اور سر میں شدید درد ہوتا ہے۔ تے آتی ہے۔ تیسرے چوتھے روز باریک دانے نکل آتے ہیں اور جلد سرخ ہو جاتی ہے۔ شروع میں دانے گردن، چہرے اور کلائیوں پر نکلتے ہیں پھر جسم پر اور آخر میں ٹانگوں پر دانے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہوا کی نالی اور گلے اور منہ کے اندر تک دانے ہوتے ہیں۔ یہ دانے روز بروز بڑھتے رہتے ہیں اور ان میں زردی مائل رطوبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دانوں کی وجہ سے چہرے اور پپٹوں پر ورم آجاتی ہے۔ دانے نکلنے سے آٹھویں روز کے بعد مرجھانے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے تین چار روز بعد ان پر کھرنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کھرنڈ اتر جانے کے بعد جلد پر بھورے رنگ کے داغ سے رہ جاتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک متعدی مرض ہے اس لئے اس سے احتیاطی تدابیر کے طور پر گھر کے دوسرے بچوں کو علیحدہ رکھنا چاہئے۔ مریض کی ضرورت کی ہر چیز علیحدہ کر دینی چاہئے۔ صفائی کا خاص اہتمام کرنا چاہئے۔ مریض کے کھرنڈ کو ہوا میں اڑنے سے روکنا چاہئے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ چچک کی احتیاطی دوا۔

میلنڈرینم 200 ایک خوراک

☆ دانے نہ نکل سکنے یا ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے مریض سخت پریشان ہو۔ مریض غمیلہ ہو جائے اور ہڈیاں بکنے لگے۔ مریض باہر بھاگ جانے کی خواہش کرے۔

ہائوسکس (Hyoscyamus) 30 یا

200 تین گھنٹے بعد

☆ غنودگی، اونگھ اور سستی اور لاغری کے ساتھ چچک کا ابتدائی مرحلہ۔ حلی تے اور بخار ہو۔

جیلی میم 30 چار گھنٹے بعد

☆ جب ٹائی فائڈ کے بخار کی سی علامات ظاہر ہوں۔ زبان کی نوک پر سرخی ہو۔ طبیعت میں سخت بے چینی ہو۔

رہس ٹاکس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ سخت بے چینی کے ساتھ بخار اور شدید پیاس۔ موت کا خوف اور سخت پریشان۔

اکونائٹ 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ مختلف وچیدگیوں کی وجہ سے مریض ٹوٹ پھوٹ جائے۔ پٹکھا کرانا اور ہوا لینا چاہے۔ جسم

ٹھنڈا ہو۔

کاربوئیج 30 آدھے گھنٹے بعد

☆ دانے نکل آئیں اور بخار ہو اور مریض خاموشی سے لیٹ جانا چاہے۔ ہونٹ خشک۔ زبان

پر میل جما ہو۔ پاخانہ قبض کے ساتھ ہو۔ لمبے وقفے کے بعد بڑی مقدار میں پانی پینے کی

خواہش۔

برائی اونیا البم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ جب دانوں میں پیپ پڑنی شروع ہو جائے۔ اور درد ہو۔ دانوں میں نمی ہو اور نرم ہو۔

مرکیورس سال 30 چار گھنٹے بعد

☆ چہرے اور آنکھوں کی سرخی کے ساتھ بخار۔ سر کی طرف اجتماع خون۔

یلاڈونا 30 تین گھنٹے بعد

☆ توانائی جاتی رہے۔ سخت بے چینی ہو اور جلن دار درد ہو۔ نہ بجھنے والی پیاس۔ تھوڑے

تھوڑے وقفے سے ذرا ذرا سا پانی پئے۔

آرسنک البم 30 چار گھنٹے بعد

☆ تیز بخار جلن اور گرمی کے ساتھ۔ چہرہ تھمٹایا ہوا۔ پیاس ندارد۔ ٹھنڈ سے بہتر ہو۔

ایس ملیکا 30 چار گھنٹے بعد

بایو کیمک کی فیرم فاس 6x بھی مفید دوا ہے۔



# کمر/ریڑھ کی تکلیفات

## Spine

(Affections of Slipped Disc, Backach of spondylosis etc)

کمر اور ریڑھ انسانی جسم کا ستون ہوتا ہے۔ اس میں نقص یا خلل واقع ہو جانے کی وجہ سے تمام اعضاء و اعصاب متاثر ہوتے ہیں۔ کمر اور متعلقہ اعضاء اور پٹھوں میں درد کی نوعیت اور کیفیت کی مناسبت سے متعلقہ ادویات کے استعمال سے تکالیف رفع کی جاسکتی ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کندھوں کے اوپر درد۔

کینابس اینڈیکا 200 یا 1M چار گھنٹے بعد

☆ بیٹھنے کی حالت میں دہچی یا تکیوں پر ہڈی میں درد۔

کالی بالی کروم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ درد کمر۔ نیچے سے اوپر کی جانب۔

کوئیم میک 200 یا 1M چار گھنٹے بعد

☆ چیرنے والا درد۔ تمام جسم سے ہوتا ہوا نیچے کی جانب جائے۔

سانا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ دباؤ اور چھوٹنے سے درد ہو۔

کالی کارب 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ کندھوں کے جوڑوں میں اور ان کے درمیان جھجھک۔

ٹائٹریک ایسڈ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ مقعد کی تکلیف کی علامات کے ساتھ درد جس کو سیدھے ہونے اور اکڑتے ہوئے پیچھے کو

مڑنے سے آرام آئے۔

ایسٹرمیزا 30 Cy چار گھنٹے بعد

☆ فالجی اثرات۔ کمر کا درد۔ گردوں کے مقام پر پھاڑنے والے درد۔

کاشی کم 200 یا 1M چار گھنٹے بعد



☆ گولی لگنے کا سادہ درد جو ریزہ کے موہروں سے گدی کی طرف جائے۔

فاسفورس 200 'چار گھنٹے بعد

☆ کندھوں کے درمیان درد۔

سکونا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ تیز درد۔ جیسے ریزہ اور پشت میں سوئیاں چبھ رہی ہوں۔

کروٹن ٹنگ 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ فالجی کمزوری کے ساتھ درد کمر۔

کوکولس انڈیکا 30 یا 200 'چار گھنٹے

بعد

☆ پوری ریزہ اور ٹکونیہ ہڈی کے مقام پر درد۔

نکس موسکاٹا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ جلن دار درد۔ کندھوں کے درمیان درد۔

آرسنک البم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ ٹکونیہ ہڈی میں درد۔ چوٹ کی وجہ سے دہجی میں درد۔

ہائپریمکم 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد

☆ ریزہ کے درمیان حصے میں درد۔

میورٹیک ایسڈ 30 یا 200 'چار گھنٹے

بعد

☆ گولی لگنے کا سادہ درد جو چوڑے پنوں یا کولے کی طرف جائے۔

لیک کین 200 'چار گھنٹے بعد

☆ پشت کے سروں کے اوپری حصے میں درد۔ کمر اور ٹکونیہ ہڈی کے آس پاس درد۔

سی فوگا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ شدید قسم کا درد اور تشنج جس میں پیچھے کی طرف مڑ کر جھٹکنا پڑے۔

نیفرم سلف 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد

☆ جب بیضا ہو تو دہجی میں سن ہونے کے ساتھ درد۔ ناف سے ہوتا ہوا درد کمر کی طرف جائے۔

پلائینا 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد

☆ جلن دار درد۔ ایسا محسوس ہو کہ گرم لوہے کی سلاخ ریزہ میں گھونپ دی ہو۔

الیومنا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ کمر کے مقام پر ٹکونیہ ہڈی میں درد۔ ذرا سی بھی حرکت سے تکلیف بڑھ جائے۔

برائی ادویا الیم 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد

☆ چلنے، دبانی اور سخت چیز رکھنے سے آرام محسوس ہو۔ کندھوں کے درمیان برف کی سی ٹھنڈک محسوس ہو۔

سپیا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ درد کمر۔ غصے اور برہمی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ ریڑھ میں اعصابی درد۔ بائیں کندھے

کے جوڑ میں درد جبکہ آرام کر رہا ہو۔ دائیں کندھے کے جوڑ میں کھینچنے کا سا احساس۔

کالوسنتھ 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد

☆ بائیں کندھے کے جوڑ میں درد۔ لیٹنے سے درد میں اضافہ ہو۔ گرمائش سے بہتر ہو۔

ٹوہر کو لینم 200 K یا 1M 'چار گھنٹے بعد

☆ کندھے کے جوڑوں میں درد۔

شیننی سیکریا 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد

☆ گرمائش سے درد کو آرام آئے۔ ٹھنڈ اور آرام سے تکلیف بڑھے۔

رہس ٹاکس 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد

☆ کندھوں میں گٹھیا کا درد ہو۔

سٹگونیریا C 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

ہائیو کیمک کی فلیکریا فاس 6x اور سیلیا 30x بھی مفید

ادویات ہیں۔



# درد کمر

## Backache

### کمر کے پٹھوں کا درد (Lumbargo)

(See Arthritis and Sciatica also)

کمر میں درد کی وجہ سے مریض سخت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ درد کی وجہ سے بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر رات کے وقت درد زیادہ ہوا کرتا ہے اور حرکت کرنے سے بڑھتا ہے۔

عموماً "درد کمر وجع المفاصل، کثرت جماعت، جلق، سخت مشقت، جسمانی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، ٹھنڈ لگنے، کمر کے اندرونی عضلات کی تکلیفات، نخاع کی تکلیفات اور رحم کی تکلیفات وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کمر کا درد مرطوب موسم اور ٹھنڈ میں زیادہ شدید ہو جائے اور بڑی دیر تک ٹھہرا رہے۔  
ڈلکا مارا 200 یا 10 IM منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ کمر کے نچلے حصے میں درد۔ سونے اور آرام کرنے سے بہتر ہو۔ مریض ٹھنڈی اور کھل ہوا کی خواہش کرے۔

ہلساٹیل 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ خشک اور ٹھنڈی ہوا لگ جانے سے اچانک درد شروع ہو جائے۔

ایکونائٹ 200 تین گھنٹے بعد

☆ لمبریا کے بخار کے بعد درد۔ ہڈیوں کے اندر تک درد محسوس ہو اور بہت زیادہ ٹھنڈ اور پیاس لگے۔

یوپتوریم پرفولیم

30 (Eupatorilum Perf)

200 تین گھنٹے بعد

☆ رات کے وقت درد بڑھ جائے۔ دن کے وقت اور حرکت کرنے سے بہتر محسوس ہو۔

پینے سے بھی درد میں کمی نہ آئے۔

مرکیورس سال 30 یا 200 'چھ گھنٹے  
بعد

☆ بہت زیادہ مباشرت کی وجہ سے کمر درد ہو۔

سفالٹم 30 'چار گھنٹے بعد

☆ ہوا لگنے 'زیادہ محنت کرنے' موج آنے وغیرہ کی وجہ سے کمر درد۔ شروع میں حرکت کرنے سے درد بڑھے لیکن لگاتار حرکت کرنے سے افادہ ہو۔

رہس ٹوکس 200 یا 1M 'تین گھنٹے بعد

☆ ڈکار آنے سے کمر درد کو افادہ ہو۔ ٹھنڈے مزاج کا مریض۔ خاندان کے افراد کو پسند نہ کرتا ہو۔

سیپیا 200 یا 1M '10 منٹ بعد' تین  
مرتبہ

☆ قبض اور بواسیر کی وجہ سے کمر کے نچلے حصے میں درد۔ صرف کھڑے ہونے سے درد میں کمی محسوس ہو۔

ایس کولس ہپ (Aesculus h) 30  
یا 200 'چھ گھنٹے بعد

☆ اکڑاہٹ کے ساتھ درد۔ حرکت اور ٹھنڈے سے تکلیف بڑھے۔ البتہ سکون سے لیٹنے سے افادہ ہو۔

برائی اونیا 200 یا 1M 'چھ گھنٹے بعد

☆ کسی چوٹ یا زیادہ بوجھ پڑنے کی وجہ سے کمر کا درد۔ یا رگڑ یا خراش کا درد۔

آرنیکا 200 یا 1M 'تین گھنٹے بعد

☆ آرام کے دوران اور طوفان کے وقت درد بڑھے۔ گرمائش اور کھانے سے افادہ ہو۔

رہوڈنڈرون (Rhododendron)

200 یا 1M '10 منٹ بعد' تین مرتبہ

☆ اعصابی چوٹ کی وجہ سے کمر درد۔

ہائی ہیریم (Hypericum) 30 یا

200 'چار گھنٹے بعد' چھ مرتبہ

☆ شدید قسم کا درد کمر کے نچلے حصے میں اور دہی یا ٹکونیہ ہڈی میں۔ یہاں تک کہ سیدھا ہو



کر بھی چل نہ سکے۔ مرطوب موسم اور ٹھنڈ میں بہتر محسوس کرے۔ رات کے وقت درد بڑھے۔ ٹکڑوں میں جلن ہو۔

سلفر 30 یا 200 '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ کمر کے اوپری تین مہروں میں شدید درد جو کہ کندھے کے جوڑ سے ہوتا ہوا نیچے کی طرف گرے۔ اعصابی پٹھوں کا درد۔

کالیا (Kalmia Lat) 30 یا 200

تین گھنٹے بعد

☆ پہلے بچے کی پیدائش کے وقت کمر کا درد۔ کمزوری ہو اور پسینے چھوٹیں۔ تین سے چار بجے صبح شکایت زیادہ ہو۔

کال کارب 200 '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ ایسے مریض جو زیادہ وقت بیٹھے رہتے ہوں۔ قبض ہو۔ ٹھنڈے مزاج کے ہوں۔ "بغا" سخت مزاج۔ درد حرکت اور ٹھنڈ سے بڑھے۔ خاص طور پر جب بستر پر کوٹ لینا چاہے۔ مریض کو اٹھ کر بیٹھنا پڑے تب کہیں کوٹ لے سکے۔

نکس دامیکا، چار گھنٹے بعد

☆ مونے اور پلپے لوگوں کی کمر میں درد۔ ہوا سے اور نہاتے ہوئے درد میں اضافہ ہو جائے۔

کلکیریا کارب 200 یا 1M '10 منٹ

بعد، تین مرتبہ

☆ سخت قسم کی چیز سے دبائے سے آرام محسوس ہو۔ مریض کمر کے نیچے کوئی سخت چیز رکھنا پسند کرے مثلاً "کتاب یا لکڑی کا تختہ وغیرہ۔ جب بستر پر بیٹھے یا لیٹے تو سخت چیز کمر کے نیچے رکھے۔

نیرم میور 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ کمر کا درد۔ کمر کے کسی تھوڑے سے حصے میں زیادہ۔ جو کہ آخر کار کمر کے کولھے یا ران کے اوپری حصے پر ٹھہر جائے۔ مریض لنگڑا کر چلنے لگے۔ درد کی شدت اس قدر بڑھ جائے کہ مریض کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جائے۔ دبائے اور گرمائش سے بہتر محسوس کرے۔

کالوسنتھ 200 یا 1M '10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ مٹھادی کمر کا درد۔ کمر کی ٹکونیہ ہڈی اور گردن کے قریب درد۔ ران کی جانب نیچے کو درد کی لہر جائے۔ اکڑا ہٹ اور کھپاؤ محسوس ہو۔ کندھے کے جوڑ اور دائیں کندھے میں زیادہ درد ہو۔ ریڑھ کی ہڈی بہت حساس ہو جائے۔

☆ سی سی نوگا 30، تین گھنٹے بعد  
☆ کمر کی ٹکونیہ ہڈی کے قریب زیادہ درد جو کہ نیچے کی جانب بڑھے۔ دن کے وقت زیادہ شدید ہو۔ سمندر کے کنارے بہتر محسوس ہو اور اوندھے منہ لیٹنے سے بھی افادہ ہو۔

☆ میڈورنیم 30، چار گھنٹے بعد  
☆ بیٹھے سے درد بڑھے۔ حرکت سے افادہ ہو۔ بچوں اور بیروں میں جھنجھناہٹ اور سن ہونے کا احساس۔

☆ چلی ڈونیم 30، چار گھنٹے بعد

### بائیو کیمک علاج

☆ گدی اور مہروں کے مقام پر درد۔ کمر میں کمزوری اور درد۔

☆ کلکیریا فاس 6x، تین گھنٹے بعد  
☆ کمر درد جس میں آرام سے اضافہ ہو۔ درد ٹکونی ہڈی کی جانب بڑھے۔ گرمائش سے بہتر محسوس کرے۔

☆ کلکیریا فلور 6x یا 12x، تین گھنٹے بعد  
☆ کمر درد جو کہ ٹھنڈ سے بڑھے اور گرمی سے بہتر ہو۔

☆ میکیشیا فاس 6x، تین گھنٹے بعد

### ریڑھ کے مہروں میں پیپ پڑ جانا

Cervical spondylosis

(See slipped disc etc also)

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ مہروں کے سن ہو جانے کا احساس جو رات کے وقت بڑھ جائے۔

☆ کالی آیوڈیم 200 یا 1M، تین گھنٹے بعد

☆ تین مرتبہ

☆ سر چکراتا۔ ریڑھ کی ہڈی کے کھرنے کی وجہ سے جو آنکھیں کھولنے سے اور بڑھ جائے۔

تھار انڈیان 30 چار گھنٹے بعد

☆ گدی میں درد۔ حرکت سے آرام آئے اور آرام سے تکلیف بڑھ جائے۔ برف کی طرح

سخت ٹھنڈے پانی پینے کے بعد اور ٹھنڈے اور مرطوب ماحول اور موسم میں تکلیف بڑھے۔

رہس ٹاکس 200 یا 1M چار گھنٹے بعد

☆ سب سے بہتر دوا۔ کمزوری کے ساتھ پھاڑنے والے درد۔

ایسڈ فاس 30 چار گھنٹے بعد

☆ پٹھوں اور اعصابی کمزوری کے ساتھ۔ ہاتھوں پر پسینہ خصوصاً "کنوارے افراد کے لئے۔

کونیم (Conium Mac) 200 یا

1M تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

بائیو کیمک کی ٹکیریا فلور 12x اور ٹکیریا فاس 6x بھی چار

گھنٹے بعد دینا مفید ہے۔



# اعصاب / پٹھوں کا تناؤ، کھپاؤ

## Cramps

(writers, cramps. (Sudden & violent contraction of the muscles)

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کھپاؤ کے ساتھ ہاتھ پاؤں اور جسم برف کی طرح ٹھنڈے پڑ جائیں۔ جیسا کہ ہیضہ میں ہوتا ہے۔

☆ کمفر Q یا 6' آدھے گھنٹے بعد  
☆ پیرا کوں کا ٹھنڈے پانی میں اعصابی / پٹھوں کا تناؤ۔ رات کے وقت پنڈلی کے پٹھے کا تناؤ۔  
بستر میں لاتیں پھیلاتے ہوئے۔

☆ رہس ٹاکس 30 یا 200' چار گھنٹے بعد  
☆ پھینے والا کھپاؤ۔ خاص طور پر کولے یا چوڑے کے اوپری حصے میں جبکہ کھڑا ہو۔ ٹھنڈے  
پینے آئیں۔

☆ ورائزم الیم (Verat alb) 30' چار  
گھنٹے بعد

☆ معدے میں تناؤ اور کھپاؤ۔

☆ الیس کولس (Aesculus) 30' چار  
گھنٹے بعد

☆ پنڈلی کے پٹھوں، ٹکڑوں، ہتھیلیوں کا کھپاؤ جو کہ انگلیوں اور انگوٹھوں سے شروع ہو۔  
سنخی کھپاؤ۔

☆ کوپریم میٹلیکم 30' چار گھنٹے بعد  
☆ لکھنے والوں کے ہاتھ کا تناؤ۔ ہاتھ کی سطح کے قریب جہاں ہڈیاں ہوں۔ شدید ٹھنڈے  
ہاتھ۔

☆ سامنے من 30' چار گھنٹے بعد  
☆ تھکن کی وجہ سے کھپاؤ تناؤ۔ خراش کا سا احساس جیسے کسی نے مارا بیٹا ہو۔  
آرنیکا 30 یا 200' تین گھنٹے بعد



# ہڈی ٹوٹنا، ہڈیوں کے زخم / ناسور

## Bone affections

(including injuries and carries)

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ ریڑھ کی ہڈی یا مغز کا ناسور۔

کلکیریا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار،  
تین مرتبہ

☆ ہر قسم کی ہڈیوں کی چوٹ کے آرام کے لئے۔

روٹا 30 g چار گھنٹے بعد

☆ ہڈیوں کی دق کے لئے۔

ڈرود سرا 200 یا 1M پندرہویں روز،  
تین مرتبہ

☆ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے لئے۔

مفاسٹم (Symphytum) 3x یا 6  
چار گھنٹے بعد

☆ مہروں کی ہڈی کا ناسور یا زخم کے لئے۔

اورم میٹلیکم، ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ پاؤں میں پسینے کے سبب پیپ پڑنی شروع ہو جائے۔ ناسور بننے لگے۔

سیلی سالک ایسڈ

(Acid Salicylic) 30 چار گھنٹے بعد

ہڈیوں کے ٹوٹنے اور ہڈیوں کے ناسور / زخم کے لئے بائو کیمک  
کی کلکیریا فاس 6x اور سر اور پیر سے مسلسل بننے والے شدید  
پسینے اور ہڈیوں کے زخموں وغیرہ کے لئے سیلیا 12x ہر چار  
گھنٹے بعد استعمال کرنا نہایت مفید ہے۔



## موج

### Sprains

موج سے مراد کسی جوڑ کی چوٹ ہے جس سے کوئی بندھی، تانت یا نسیں پھٹ جائیں لیکن اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور نہ ہی ٹوٹے۔ عام طور پر پاؤں پھسلنے سے ٹخنے اور کلائیوں میں موج آجاتی ہے۔ جس سے درم آجاتی ہے۔ درد ہوتا ہے اور چلنا پھرنا اور کام کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ خراشدار درد کے ساتھ موج۔

آرنیکا 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ نسلوں کے جوڑوں میں موج آجائے۔ ٹھنڈ سے درد بڑھے۔ گرمائش سے بہتر ہو۔

رہس ٹاکس 200 تین گھنٹے بعد

☆ ٹخنوں اور کلائیوں میں موج آجائے۔

روٹا 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی ٹکیریا فاس 6x اور میگنسیا فاس 6x بھی مفید

ادویات ہیں۔ 4-6 کے تناسب سے آرنیکا اور رہس ٹاکس Q

سرسوں کے تیل میں ملا کر لگانا بھی فائدہ مند ہے۔

## ریڑھ کے ستون کے مہروں کی سوزش / تکلیفات

### Spondylosis

(See cervical spondylosis also)

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ گردن کے مہروں کی سوزش اور درد کے لئے اعلیٰ ترین دوا۔ مہروں میں زخم اور سوزش۔ ایسا محسوس ہو کہ ہڈیوں کو چاقو سے کھرچا جا رہا ہے۔ عام کمزوری کے ساتھ ریڑھ کی کمزوری بھی ہو۔ محنت سے تکلیف بڑھے اور گرمائش سے کم ہو۔ رطوبات زندگی ضائع ہونے کی وجہ سے تکلیفات۔

فاسفورک ایسڈ 30 'چار گھنٹے بعد

☆ کمر کے کسی حصے کا درد اور کمزوری۔ ریڑھ میں جلن۔ درد کمر سے نیچے کولے کی طرف بڑھے۔ چلنے سے تکلیف بڑھے خاص طور سے صبح تین سے چار بجے کے دوران۔

کالی کارب 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ کمر اور ٹکونیہ ہڈی کے قریب درد۔ ذرا سی بھی حرکت سے زیادہ ہو جائے۔ سر پکرائے۔ کمر کے کسی حصے میں چبھنے والا درد اور اکڑاہٹ۔

برائی اونیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ بھاری سامان اٹھانے، زیادہ محنت کرنے اور ہڈیوں اور موج کی وجہ سے خراشدار درد۔ لینے، بھیک جانے اور ٹھنڈ سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

روٹا 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'

☆ کمر کے مقام پر درد۔ گردن اور کمر میں گولی لگنے کا سا درد۔ کوئی وزن یا بھاری چیز اٹھانے کے بعد کندھوں اور ٹکونیہ ہڈی کے درمیان درد۔ کھلی ہوا میں بہتر محسوس کرے۔

پلسائیل 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'

☆ نازک لوگوں کے لئے جو تیزی سے بڑھیں۔ جن میں خون کی کمی ہو اور جلد چکنی سی ہو۔ نمکین اور برف کی سی ٹھنڈی چیزوں کے کھانے پینے کی خواہش کریں۔ اندھیرے سے ڈریں۔ ریڑھ میں خم آگیا ہو۔ ریڑھ کے درد پشت سر اور پشت سے متعلقہ اعضاء کی طرف بڑھے۔ اٹھنے کے بعد سر پکرائے۔ کمر ٹوٹنے کا سا درد جو محنت کرنے سے بڑھے۔

فاسفورس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ کمر کے مقام پر درد۔ کمر اکڑ جائے۔ گرمی سے تکلیف بڑھے۔ غصے اور پیچھے مڑنے سے اور رات کے وقت تکلیف میں اضافہ ہو۔

کیومیلا 200 'چھ گھنٹے بعد'

☆ ریڑھ کو چوٹ لگنے کی وجہ سے درد۔ ٹکونیہ ہڈی، دہی اور سروں میں درد۔

ہائپریمک 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'

☆ کمر کمان کی طرح مڑ جائے۔ دہی میں جھٹکے اور چیرنے والے درد۔ خاص طور پر خواتین کے ماہواری کے دوران۔ پٹھوں کے تشنج اور گیس کی تکلیفات کے ساتھ سر پکرائے۔

سکوٹا 30 v 'چار گھنٹے بعد'



☆ کمر کی ہڈی میں ایسا درد کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی محسوس ہو۔ کمر کے مقام پر جلن دار درد۔ سر چکرائے۔ حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ خاص طور پر جب دبا کر آنکھ بند کی جائے۔ شور اور ہلکے جھٹکے تک سے درد میں اضافہ ہو۔

تھیرپیڈیاں 30، چار گھنٹے بعد

☆ ریڑھ کے ساتھ درد اور ٹھنڈے پن کا احساس۔ گرمائش سے درد میں افادہ ہو۔ حرکت کرنے سے سر چکرائے۔ آنکھیں کھولنے پر آگے کی طرف گر جائے۔ کھلی ہوا میں چلنے سے بہتر ہو۔

میگنیشیا فاس 12x یا 30، چار گھنٹے بعد

☆ مریض کو ایسا محسوس ہو کہ ہڈیاں کچ یا شیشے کی بنی ہوئی ہیں۔

تھوجا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ گردن کے مہروں میں درد جس میں پشت سے متعلقہ اعضاء اور اگلے اعضاء میں بھی درد ہو۔ صبح کے وقت اور ماہواری سے پہلے تکلیف میں اضافہ ہو۔

نیوکوکس (Pneumococcus)

200، چھ گھنٹے بعد

☆ کمر، کندھوں، پشت سر کے مقام پر درد۔ بہت زیادہ کام کرنے کی، ہسٹری پائی جائے یا غیر شادی شدہ عمر رسیدہ مرد عورت ہوں۔ جسم اور دماغی طور سے کمزور ہوں۔ سر چکرائے جب لیٹنے لگے یا کروٹ بدلنے لگے۔

کونیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ گردن میں اکڑاہٹ اور کھنچاؤ جس میں کھینچنے والے درد ہوں۔ گدی سخت۔ طوفان سے پہلے بیماری میں اضافہ ہو۔

رہوڈینڈرون 200 یا 1M 10 منٹ

بعد، تین مرتبہ

☆ بیٹھے ہوئے دھجی اور ٹکونیہ ہڈی میں درد ہو۔ کندھوں کے درمیان درد کی وجہ سے جھکنا مشکل ہو۔ جب اپنی نشست سے اٹھے تو سر چکرائے اور متلی ہو۔ گرمی سے بہتر ہو۔

کالی بائی کروم 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ صحت یابی سے مایوسی۔ ٹھنڈی ہوا سے تکلیف بڑھے۔ گرمائش سے بہتر ہو۔ مریض گرم موسم میں بھی موٹے اور گرم کپڑے پہنے۔

سورنیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین



مرتبہ

☆ کمر اور پشت سے متعلقہ اعضاء میں سوزش اور درد۔ ہڈیوں کی گہری ہوئی ساخت کو درست کرنے کے لئے۔ موٹے، پلپے اور ٹھنڈ محسوس کرنے والے مریضوں کے لئے۔ ریڑھ کے نچلے حصے میں چوٹ لگ گئی ہو۔ یا زیادہ وزن اٹھا لیا ہو۔ ہڈیاں کمزور اور نرم پڑ جائیں۔

کلکیریا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار

چھ مرتبہ

☆ سر میں کوئی چیز لڑھکتی ہوئی محسوس ہونے کے ساتھ سر چکرائے۔ کمر کے کسی حصے میں کمزوری اور درد۔ لیٹنے سے بہتر ہو۔ چلنے اور دبانے سے بھی افاتہ ہو۔

سپیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد تین

مرتبہ

☆ پشت سے متعلقہ اوپری حصے میں درد۔ ریڑھ بہت زیادہ حساس ہو۔ کمر اور گردن میں کھچاؤ اور اکڑاہٹ۔ حرکت کرنے، ٹھنڈ سے اور دوران حیض تکلیف میں اضافہ ہو۔

لیڈم پال 200 یا 1M 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ کمر میں سوزش، درم اور درد۔ کرسی سے اٹھنے کے بعد زیادہ ہو۔ پشت اکڑی اور کچی ہوئی ہو۔ کندھوں کے پروں میں درد۔ چیرنے پھاڑنے والے درد۔ گرمائش سے بہتر ہو۔ مرطوب اور برسات کے موسم میں بھی افاتہ ہو۔

کاشی کم 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ کمر کے کسی حصے اور ٹکونیہ ہڈی میں درد۔ گردن کے مرے چٹخیں، کندھوں اور بازوؤں میں خراشدار درد۔ چلنے اور نیند اڑنے کی وجہ سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

کوکولس انڈیکا چار گھنٹے بعد

☆ کمر کی ہڈی پر چوٹ لگنے یا ضرورت سے زیادہ جنسی افعال سرزد ہونے کی وجہ سے کمر میں درد اور سوزش۔

سٹاسٹم 30 یا 6 چار گھنٹے بعد

☆ کمر کے کسی حصے اور پشت سے متعلقہ مہروں میں درد۔ ذہنی طور پر پراگندگی۔ درد گردن کی پشت سے آگے پھیلے۔ بھیگ جانے کے بعد تکلیفات میں اضافہ ہو۔

ڈلکا مارا 200 یا 1M 10 منٹ بعد

### تین مرتبہ

☆ ریڑھ میں اعصابی درد۔ آرام کرتے ہوئے بائیں کندھے میں کھینچنے والا درد۔ دونوں کندھوں کے درمیان درد۔ بائیں جانب کے گردن کے پٹھوں میں درد ہو۔ بائیں جانب موڑتے ہوئے درد ہو اور سر چکرائے۔ غصے اور برہمی کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔  
کالوسنتھ 200 یا 1M '10 منٹ بعد'

### تین مرتبہ

☆ اعضا میں سن ہونے کا رجحان اور درد ہو۔ سالنکا کے اعصاب میں درد ہو۔ کبھی سن ہو جائیں اور کبھی درد شروع ہو جائے۔

### نفالیم 200 یا 1M 'چھ گھنٹے بعد'

☆ کمر میں درد۔ خراش سی ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ مہرے مل گئے ہیں۔ درد کمر کی وجہ سے سیدھا ہو کر چلنا مشکل ہو۔

### آرنیکا 200 یا 1M 'چھ گھنٹے بعد'

☆ پشت اور ٹکونیہ ہڈی سے متعلق مقام پر درد۔ کھلی ہوا میں چلتے ہوئے سر چکرائے۔ ٹھنڈ سے تکلیف بڑھے اور گرمائش سے کم ہو۔

### ٹکس وامیکا 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد'

☆ کمر کے کسی حصے اور دہجی میں درد۔ گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ جوڑوں میں ورم اور اکڑاہٹ ہو۔ مرکزی یا پارے کے اثرات بد۔ گرمائش سے تکلیف بڑھے۔ کھلی ہوا اور حرکت کرنے سے آفاقہ ہو۔

### کالی آیوڈیم 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ مہروں کی ساخت درست کرنے کے لئے۔ جلن دار درد ہو اور دہجی اور کمر کے کسی ایک حصے میں زیادہ ہو۔ معاون دوا کے طور پر۔

### سلفر 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ کمر کا کوئی حصہ اکڑا ہو۔ زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے درد کمر۔ پسینے میں بھیگ جانے کی وجہ سے درد اور خراش۔ مسلسل حرکت اور گرمائش سے درد میں آفاقہ ہو۔ آرام اور ٹھنڈ سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

### رہس ٹاکس 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد'

☆ پشت میں ناقابل برداشت درد۔ گردن اکڑی ہوئی۔ دن کے وقت تکلیف زیادہ ہو۔

سمندر کے کنارے بہتر ہو۔

میڈورنیم 200 یا 1M 'پندرہویں روز'  
تین مرتبہ

☆ دماغ سے لے کر دہچی تک شدید درد۔ دبانے اور چھونے سے درد بڑھے۔ ایسا محسوس ہو کہ ہوا میں چل یا تیر رہا ہو۔

لیک کنائنم 200 '10 منٹ بعد' تین  
مرتبہ

☆ دہچی پر درم ہو۔ ٹکونیہ ہڈی سرکی ہوئی محسوس ہو۔ دائیں جانب لیٹنے سے بہتر محسوس ہو۔ آگے کی طرف حرکت کرنے سے مریض کو ڈر لگے۔

سینی کولا 30 'چار گھنٹے بعد'

بایو کیمک کی ٹکلیریا فاس 6x ٹکلیریا فلور 12x اور میگنیشیا

فاس 6x بھی بہترین ادویات ہیں۔





# چینی اتر جائے، ڈھکن سرک جائے

## Slipped Disc

(See Backach, spondylosis etc also)

درد ہونے کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ مثلاً "چوٹ لگنے، زخم آنے، پٹھوں اور اعضاء کے اکڑنے، ہڈی سرک جانے، چینی اتر جانے یا ڈھکن سرک جانے، نزلے زکام اور بخار ہونے، معدہ خراب ہونے، مہروں کے ہل جانے وغیرہ سے جسم کے مختلف اعضاء میں درد اور ٹیسس ہو سکتی ہیں۔ درد کی شدت اور نوعیت بھی کم و بیش ہوتی ہے۔ مختلف اوقات اور مختلف تکلیفات میں درد کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ درودوں کی کیفیات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً "لہر دار، خراشدار، چپنے والے، منتقل ہونے والے، پھیلنے والے، چیرنے پھاڑنے والے درد۔ اسی طرح درودوں کو آرام آنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں مثلاً "بعض درد گرمائش سے کم اور ٹھنڈ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ موسموں کی مناسبت سے بھی درد کی شدت میں اضافہ و افتادہ ہوتا ہے۔ کسی خاص حالت میں بیٹھنے، اٹھنے، چلنے پھرنے اور حرکت کرنے سے بھی درد میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ چنانچہ مختلف نوعیت اور کیفیات کی مناسبت سے درودوں کی تشخیص و علاج کیا جانا چاہئے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ علاج شروع کرنے کے لئے بہترین دوا۔ ریڑھ کی ہڈی بہت زیادہ حساس ہو۔ گردن اور کمر کے پٹھے اکڑ جائیں خراشدار درد محسوس ہو۔ بستر بہت زیادہ سخت لگے۔ حرکت کرنے سے تکلیف بڑھے لیکن حرکت کرتا رہے۔

آرنیکا 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ ناقابل برداشت درد۔ مریض اس درد کو برداشت کرنے کی نسبت موت کو ترجیح دے۔

کیمو میلا 30 یا 200 آدھے گھنٹے بعد،

تین مرتبہ

☆ گدی یا کسی اور جگہ گولی لگنے کا سا درد۔ حرکت کرنے سے گردن اور کندھے پھٹتے محسوس

ہوں۔ دن کے وقت نائٹیں بھاری محسوس ہوں اور رات کو درد ہو۔

ہلساٹیل 200 تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ



☆ موٹے، پلپے اور ٹھنڈ محسوس کرنے والے مریضوں کے لئے۔ ہوا لگنے اور نہاتے ہوئے تکلیف بڑھے۔

کلکیر یا کارب 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ جلن دار، چپنے اور چیرنے والا درد۔ تمام کمر میں خراش سی اور تھکن سی محسوس ہو۔ گرمی اور ذرا سی حرکت سے بھی تکلیف میں اضافہ ہو۔ مریض چڑچڑا۔ بے چین اور مایوس ہو۔ کپڑا اوڑھنا نہ چاہے اور ہوا میں رہنا چاہے۔

ایس ملفیکا 30 یا 200 تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ ناہموار جگہ پر چلنے سے درد بڑھے، فٹ پاتھ وغیرہ پر۔ بوڑھے کنواریوں یا کنواریوں کے لئے۔

کونیم میک 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ کمر، گدی اور ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء میں درد۔ سرد خشک ہوا لگ جانے کے بعد خاص طور پر مشرقی ہوا چلنے پر۔ گرمائش سے بہتر ہو۔ ذرا سی حرکت کرنا بھی مشکل ہو۔ لمبے وقفے کے بعد بہت مقدار میں پانی پینے کی خواہش اور پیاس ہو۔

برائی اونیا الم 200 تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے منتقل ہونے والا درد جو کہ کسی ایک مرکز پر پھیل جائے۔ اس کے ساتھ سخت اکڑاؤ بھی ہو۔ ٹھنڈ سے بہتر ہو۔ حرکت اور گرمائش سے تکلیف بڑھے۔

لیڈم پال 200 تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ ہاتھ پاؤں اور اعضاء میں چیرنے پھاڑنے والا درد۔ خاص طور پر گھٹنے کے پیچھے جس میں اکڑاہٹ اور کمزوری بھی ہو۔ نچلے اعضاء میں رات کے وقت سخت بے چینی۔ ٹھنڈی ہوا، تحریک پیدا کرنے والی ادویات اور کافی پینے سے بھی افاتہ ہو۔

کاشی کم 30 یا 200 تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ ریڑھ کی ہڈی کے کھرنے یا کمزور پڑنے کی وجہ سے ایسا محسوس ہو کہ روٹی یا اون کے

گالوں کے اوپر چل رہا ہے۔ پاخانہ سخت اور قبض سے ہو۔

☆ الیومنا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ  
شک سرد ہوا لگ جانے کی وجہ سے اچانک درد شروع ہو جائے۔ ہر قسم کی حرکت اور رات کے وقت تکلیف میں اضافہ ہو۔ مریض خوف زدہ سا 'حساس اور بے چین ہو۔ اس کو پیاس بہت لگے۔

☆ اکوناٹ 200 'تین گھنٹے بعد'  
محنت کرنے یا بھیگ جانے کے بعد درد شروع ہو۔ خاص طور پر کمر کے نچلے حصے میں۔ بستر میں کروٹ بدلتے ہوئے 'تکلیف اور کمزوری میں رات کے وقت جھٹکے محسوس ہوں۔ بارش سے پہلے اور شک سردی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

☆ نکس دامیکا 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد'  
کالٹے اور چپھنے والے درد۔ بعض دفعہ دوران آرام چاقو یا چھری کی طرح چھن ہو۔ درد رانوں میں اور اوپر نیچے پھیلتا محسوس ہو۔ چلنے سے تکلیف بڑھے۔ ایسا محسوس ہو کہ کمر ٹوٹ جائے گی۔ کمر کے کسی چھوٹے حصے میں سخت قسم کی چیز کے دباؤ سے افادہ ہو۔

☆ کالی کارب 200 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ کولمے 'ریڑھ اور گردن میں شدید چیرنے اور کالٹنے والے درد۔ آرام پانے کے لئے ادھر ادھر بے چینی سے ٹپے۔ ایسا محسوس ہو کہ بستر اوپر نیچے کو اٹھ رہا ہے یا جھول رہا ہے۔ دوران آرام تکلیف میں اضافہ ہو۔

☆ بیلاڈونا 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد'  
☆ چینی کھسک یا سرک جائے۔ کمر میں شدید درد ہو۔ کھانسنے سے تکلیف اور درد میں اضافہ ہو۔

☆ امونیا کارب 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ ادھر ادھر پھرنے والا درد۔ جو کہ خاص طور پر کلائی اور انگلیوں میں محسوس ہو۔ بیٹھتے ہوئے ریڑھ کی دھجی میں درد ہو۔ ٹھنڈ سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ مریض بے چین ہو اور پہلو بدلتے۔

☆ کالی بیج 200 'تین گھنٹے بعد'  
☆ ٹھنڈ اور بھیگنے کی وجہ سے درد شروع ہو یا زیادہ سخت محنت کرنے کے بعد۔ پیچھے کی

طرف کمر کو موڑنے سے درد میں کمی واقع ہو۔ کسی چیز کو پکڑنے سے ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں میں سن ہونے کا رجحان ہو۔ آرام کے بعد اکڑاہٹ اور درد میں اضافہ ہو اور مسلسل حرکت کرنے سے افادہ ہو۔

رہس ٹاکس 200 یا 1M تین گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی فلیکس یا فاس 6x فیرم میور 6x اور سلیسیا 30x

بھی مفید ادویات ہیں۔



## وجع المفاصل (گنٹھیا، جوڑوں کی سوزش)

### Arthritis

اس (including gout, arthritis, Deformans and Rheumatism) مرض میں جوڑ متورم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سخت درد ہوتی ہے۔ جوڑوں کے آس پاس کے عضلات کمزور ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات درم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جوڑوں کی جگہ پھولی ہوئی لگتی ہے۔ تکلیف بڑھ جانے کی صورت میں جوڑ بد وضع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات جوڑوں کے جڑ جانے کی وجہ سے حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں جوڑوں کی درم ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے جوڑ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جس کے سبب بڑے جوڑوں میں درد کا دورہ ہوتا ہے۔ مریض کے لئے حرکت کرنا اور بلنا جتنا تک مشکل ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ بہت سے جوڑ متلاء مرض ہو کر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر ہاتھ پہلے متاثر ہوتے ہیں اور مرض بڑھ اور پھیل کر جسم کے دوسرے جوڑوں تک کو ناکارہ کر دیتا ہے۔ وجع المفاصل درد نقل مکانی کرتے رہتے ہیں۔ یکایک ایک جوڑ کو چھوڑ کر دوسرے اور وہاں سے تیسرے جوڑ میں درد اور درم منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض اس وقت زیادہ مملک سمجھا جاتا ہے جب یہ مرض جوڑوں سے پردہ دل یا بطون قلب میں چلا جاتا ہے۔

گنٹھیا کی وجہ سے شدید بخار بھی ہو جاتا ہے لیکن سرد درد اور ہڈیان نہیں ہوتا ہے۔ عموماً دس بارہ روز کے بعد بخار اتر جاتا ہے اور شکایات کم ہو جاتی ہیں البتہ کمزوری باقی رہتی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد مرض پھر عود کر آتا ہے اور پہلے جیسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس مرض میں ہاضمہ ہمیشہ خراب رہتا ہے۔ اگرچہ یہ مرض ایک قسم کے کپڑے سے پیدا ہوتا ہے جو کہ مریض کے خون میں پایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں بارش میں بھیگنے، ٹھنڈ لگنے، بھیگے کپڑے پہنے رکھنے، نمدار جگہ سونے اور سخت جسمانی محنت کرنے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ ٹخنوں اور پیروں کی اکڑاہٹ۔

ڈر دسرا 200 پندرہویں روز، تین مرتبہ

☆ گھٹنے کے جوڑوں میں درد۔ حرکت سے بڑھ جائے لیکن حرکت کی ابتدا میں افادہ محسوس



کرے۔ جوڑوں میں مسلسل درد۔ لیکن سیٹ سے اٹھنے پر بڑھے۔ ایزٹیوں میں درد۔ حرکت سے بڑھے۔

کاسیا سوفیرا (Cassia Sophera)

30' ہر چار گھنٹے بعد

☆ آرام کے بعد اور ہوا لگنے سے تکلیف کی شکایت بڑھے اور حرکت کرنے سے بہتر محسوس ہو۔

رہس ٹاکس 200 یا 1M' ہر چار گھنٹے

بعد

☆ جوڑوں کا درد۔ مرطوب ٹھنڈے موسم میں تکلیف بڑھ جائے۔ ہاتھ پاؤں اور کولے کے جوڑوں میں درد۔ گنٹھیا کا درد۔

نیزم سلف 30 یا 200' ہر چار گھنٹے بعد

☆ پیر کے جوڑوں میں درد کا شدید حملہ۔ سرخ چمکدار درم کے ساتھ شدید درد۔

اکونائٹ 200' دو گھنٹے بعد

☆ جب رہس ٹاکس کام کرنا بند کر دے۔ ٹھنڈے مرطوب موسم میں تکلیف بڑھے اور حرکت سے بہتر محسوس ہو۔

کلیریا کارب 200 یا 1M' چھ گھنٹے

بعد 'چھ مرتبہ

☆ اسمال رگ جانے کے بعد جوڑوں کے درد اور گنٹھیا کے لئے۔

ابورٹنم (Abrotanum) 30 یا

200' چار گھنٹے بعد 'چھ مرتبہ

☆ جوڑوں کے دردوں کی شکایت بدبودار پیشاب کے ساتھ۔

بنزوک ایسڈ (Acid-Benz) 6 یا 30'

چار گھنٹے بعد

☆ شدید درد۔ جیسے کسی خراش میں ہوتا ہے۔ یا موج آجانے سے ہوتا ہے۔ چھوٹا تک برداشت نہ کر سکے۔ اتنا حساس کہ کسی کے قریب تک آنے سے ڈرے کہ وہ اس کے متاثرہ حصے کو چھیڑ دے گا۔

آرنیکا مونٹ 200' چار گھنٹے بعد

☆ لمبی ہڈیوں میں درد جو کسی چوٹ یا گنٹھیا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔

روٹا 200 'چھ گھنٹے بعد

☆ گٹھیاوی درد بغیر ورم کے۔ جوڑوں میں درد۔ رات کے وقت تکلیف بڑھ جائے۔

آلوڈیم 30 'چار گھنٹے بعد

☆ کمزور آدمیوں میں ٹھنڈ کے ساتھ شدید درد۔ جو گرمی سے بہتر محسوس کریں یا جب کھانا کھا رہے ہوں۔ کھلی ہوا میں تکلیف بڑھ جائے۔

کیسی کم (Capsicum) 30 یا  
200 'چار گھنٹے بعد

☆ اعصابی لاغری۔ اعصاب میں تناؤ اور کھچاؤ۔

سٹرائی ہینیم (Strychninum) 3x  
یا 6x 'چار گھنٹے بعد

☆ سوزش کے ساتھ درد۔ حرکت سے بڑھ جائے۔

برائی ادینا الم 200 یا 1M 'چھ گھنٹے بعد

☆ جبکہ شکایت کی وجہ دق ہو۔

ٹور کولینم 'K 1M 'پندرہویں روز' تین  
مرتبہ

☆ آرام کے دوران تکلیف اور درد بڑھے۔ رات کے وقت اور گرمی سے بھی دردوں میں اضافہ ہو۔ حرکت اور کھلی ٹھنڈی ہوا سے بہتر محسوس کرے۔

پلسائٹلا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ جبکہ شکایت کی وجہ سوزاکی ہو۔ دن کے وقت دردوں کی تکلیف بڑھے۔

میڈورنیم 1M 'پندرہویں روز' تین مرتبہ

☆ ایڑیوں میں درد۔ تمام تر بوجھ ان پر ڈالنے سے بہتر محسوس ہو۔

بربرس وگلرس Q 8-10 قطرے 'چار  
گھنٹے بعد

☆ بجلی کے کرنٹ کی طرح درد دوڑے۔ مرطوب ٹھنڈے موسم میں تکلیف بڑھے۔ آرام اور گرمی سے بہتر محسوس ہو۔

فاسٹولا کا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

- ☆ گھٹیاوی مریض کے پیشاب میں سرخ ریت کے ذرات۔  
 لائیو پوڈیم 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ ناقابل برداشت درد۔ جوڑوں میں اکڑاہٹ اور تناؤ۔ احساس کمتری یا برتری۔  
 پلائینا 1M ہفتہ وار 'تین مرتبہ
- ☆ کمر اور گردن کا پرانا گھٹیا۔ ٹپھے کے عصب کے (center nerve) کے قریب بڑا گھرا  
 درد۔ بے حسی یا سن ہو جائے تو درد کم ہو جائے یا درد زیادہ ہو تو سن ہونا کم ہو جائے۔  
 نفاللم (Gnaphalium) 30 یا  
 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ گھٹنوں کے جوڑوں میں درد۔ جس میں چھوٹے (Round worms) بھی ہوں۔  
 نیرم فاس 6x یا 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ پاؤں کے انگوٹھے اور جوڑوں کی گھٹیا درم کے ساتھ۔ قدم رکھنے سے شدید کھینچنے اور  
 پھاڑنے والا درد۔ گرمی دباؤ اور حرکت سے بڑھ جائے۔ درد اوپر کی جانب چڑھے۔ لٹھڑی  
 پٹی کرنے سے بہتر محسوس ہو۔  
 لیڈم پال 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ بے حسی یا سن ہونے کی کیفیت کے ساتھ درد۔ اتنا شدید درد کہ مریض چلا اٹھے کہ اس  
 درد کی نسبت وہ موت کو ترجیح دے گا۔  
 کیومیلا 200 یا 1M 'آدھے گھنٹے بعد'  
 تین مرتبہ
- ☆ جوڑوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شدید قسم کا درد۔ آرام اور آندھی چلنے کے دوران  
 اور زیادہ بڑھ جائے۔  
 رہوڈنڈرون 200 یا 1M '10 منٹ  
 بعد 'تین مرتبہ
- ☆ جلدی تکلیفات اور جلن کے ساتھ گھٹیا۔ سیدھا نہ چل سکے۔  
 سلفر 200 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ
- ☆ گھٹیاوی درد۔ کپڑے دھونے یا دھوبی پنے کے دوسرے کام کرنے سے تکلیف میں اضافہ  
 ہو جائے۔  
 سیپیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ پیشاب میں یورک ایسڈ کے ساتھ گٹھیاوی درد۔

ارٹیکا یورٹس Q 10-8 قطرے گرم پانی  
میں چار گھنٹے بعد

☆ گٹھیا کے نتیجے میں ہڈیوں کے بڑھنے کا پرانا گٹھیا۔ خاص طور پر انگلیوں میں۔

بکریک ایسڈ 30 چار گھنٹے بعد

☆ چھوٹے جوڑوں میں شدید درد جو ورم آلود ہو گئے ہوں۔ کمر درد۔ صبح کو اٹھنے سے پہلے  
تکلیف بڑھ جائے۔

شیخی سگریٹ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ درد متضاد سمتوں کے اعضاء میں ہو مثلاً " دائیں بازو اور بائیں ٹانگ میں۔ جس میں  
جھنجھناہٹ، سن ہونے اور بے حسی کی سی کیفیت پائی جائے اور ٹھنڈک کا سا احساس ہو۔

ایگریکس مس (Agricus mus) 30

یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ جوڑوں میں گٹھیاوی گومڑ، ہاتھ مڑے ہوئے۔ نمک کے پانی کے ترہ نشین مادے کی وجہ  
سے ہاتھوں کی ہیئت بدل جائے۔

امونیم فاس 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ جوڑوں میں گٹھیاوی گومڑ۔ پھاڑنے والے درد۔ پنوں میں کھپاؤ اور شدید درد۔

گوانکم (Quaiacum) 30 چار

گھنٹے بعد

☆ دوران حیض تکلیفات بڑھ جائیں۔ موقوفیء حیض کی ابتدا کے وقت دردیں۔ ہاتھوں اور  
پاؤں میں زیادہ تکلیف۔

کالوفالٹم 30 چار گھنٹے بعد

☆ چھوٹے جوڑوں میں شکایت جو سرخ یا پیلے سے ورم آلود ہوں۔ نرم پڑ جائیں اور دردیں  
منقل ہوتی رہیں۔ حرکت سے تکلیف بڑھ جائے۔ ٹھنڈے موسم میں گٹھیا کی خصوصی دوا۔

کالچی کم 30 چار گھنٹے بعد

☆ گیس کی شکایت کے ساتھ جوڑوں میں گومڑ۔ آخر کار گومڑ میں درد ختم ہو جائے۔ زبان  
سفید۔ سفید مادے کی موٹی ترہ جمی ہوئی۔

انٹم کروڈم 30 چھ گھنٹے بعد

☆ رات کے وقت درد بڑھ جائے۔ مرطوب موسم میں بھی تکلیف بڑھے۔ بڑے پنوں میں



## گھٹیاوی درد۔

☆ سبکی فوگا 30 ' چار گھنٹے بعد  
درد ہاتھ پاؤں کو متاثر کرتا ہوا نیچے کی جانب بڑھے اور اعصابی اعضاء کے ساتھ تیزی سے گزرے۔

کالیا (Kalmia Lat) 30 یا 200 ' چھ گھنٹے بعد

☆ ہڈیوں کے تیزی کے ساتھ بڑھنے کے لئے۔ گرمی سے افادہ اور ٹھنڈ سے تکلیف بڑھے۔  
☆ کلکیریا فلور 12x یا 30 ' چار گھنٹے بعد  
☆ تمام جسم میں درد پھیلے۔ حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

سٹیلیریا (Stellaria) 10-8 Q قطرے  
گرم پانی میں ' چار گھنٹے بعد

☆ گھٹنے کے عمل کے ساتھ لمبے جوڑوں کا پرانا درد۔ سوجن کے ساتھ درد ' اینٹھن اور جوڑوں کا نرم پڑ جانا۔ حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ جوڑ چھین۔ ٹھنڈ سے درد بڑھے اور گرمی سے آرام آئے۔

او اے نوزوڈ (O.A.Nosode) 1M یا  
1002 ' ہفتہ وار ' چھ مرتبہ

☆ لمبی ہڈیوں میں درد کی شکایت۔ جوڑوں یا بندھنوں میں تناؤ کھنچاؤ۔  
کاسیکم 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد  
بایو کیمک کی میکنیشا فاس 6x اور بایو کیمی نیشن نمبر 19x  
بھی جوڑوں کے دردوں اور گھٹیاوی امراض کے لئے بڑی مفید  
ادویات ہیں۔



## درد اعصابہ

### Neuralgia

(Facial Nerve Pain)

چہرے کا درد اعصابہ بہت شدید ہوتا ہے۔ یہ درد چہرے کے ان تمام اعصاب میں ہوتا ہے جہاں عصب کی شاخیں پہنچتی ہیں۔ رخسار، ابرو، آنکھ کے ڈھیلے، پیشانی، پونے اور ٹھوڑی یا نیچے کے جڑے میں چھری سے کانٹے یا گولی لگنے کا سا تیز درد ہوتا ہے۔ عام طور پر درد کسی جگہ محدود ہوتا ہے۔ مریض درد کی تکلیف سے چلا اٹھتا ہے اور مریض درد والی جگہ کو رگڑتا ہے تاکہ کسی طرح آرام آجائے۔ آنکھوں میں درد ہونے سے بکثرت پانی جاری ہو جاتا ہے۔ جڑوں میں درد ہونے سے کثرت سے رال بہتی ہے۔ درد کے ساتھ کبھی کبھی ماؤف عضلات اکڑ جاتے ہیں۔ عموماً "یہ درد ادھیڑ عمر میں ہوتا ہے۔ زیادہ تر عورتوں کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ مزمن مرض میں ہفتوں یا مہینوں کے بعد درد کا دورہ ہوتا ہے۔ یہ مرض عام طور پر خون کی کمی، کمزوری، فکرات، کثرت جماع، لیبریا کے زہر اور سرد گرم ہو جانے سے ہوتا ہے۔ آتشک، پارہ، سیسے کے زہر اور گنٹھیا کے امراض بھی اس مرض کے اسباب بنتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ چہرے کے دائیں جانب درد۔ گرمائش سے اور شام چار سے آٹھ بجے تک تکلیف میں اضافہ ہو۔

لائکوپوڈیم 30 یا 200 '10 منٹ بعد  
تین مرتبہ

☆ سر کی جانب سیلان خون۔ گالوں، چہرے کی ہڈیوں، جڑوں، کینٹی یا گردن میں زبردست درد۔

بیلاڈونا 30، تین گھنٹے بعد

☆ بائیں جانب کا درد اعصابہ۔ جلن اور چھین والا ناقابل برداشت درد۔

سپائی جیلیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ خشک ٹھنڈی ہوا لگ جانے سے اچانک درد شروع ہو جائے۔

اکونائٹ 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد

☆ رطوبات ضائع ہو جانے کی وجہ سے۔ وقفے وقفے سے درد اعصاب ہو۔ انتہائی حساسیت اور جلد کی سوجن۔

چائے 30' تین گھنٹے بعد

☆ رگ یا سانس کے ساتھ لہردار درد۔ دبانے یا سینکے سے بہتر ہو۔

میگنسیا فاس 6x یا 30' تین گھنٹے بعد

☆ وقفے وقفے سے ہونے والا درد اعصاب۔ جلن دار درد۔ آنکھوں اور کپٹی کے آس پاس زیادہ شدید ہو۔ ٹھنڈ سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ گرمائش سے بہتر ہو۔

آرسنک البم 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ چہرے کا درد اعصاب۔ چہرے کے متاثرہ حصے میں ٹھنڈک اور بے حسی۔ پیاس نادر۔ شام کے وقت تکلیف بڑھے۔

پلساٹلا 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ صرف چولہے کی گرمی سے درد کو افادہ ہو۔

میزیریم 30' چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ شدید اور ناقابل برداشت پھاڑنے والا درد جو کہ زیادہ چہرے کے بائیں جانب ہو اور سر اور کپٹی کی طرف پھیلے۔ چھوٹے سے بڑھ جائے۔

کیومیل 200 یا 1M 10' منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ رات کے وقت درد زیادہ ہو۔ معاون دوا۔

سفلینم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ


مرتبہ

بایو کیمک کی فیرم فاس 6x اور میگنسیا فاس 6x بھی بہتر

ادویات ہیں۔

نوٹ : دوسری ادویات جو مختلف دردوں کے لئے مفید ہیں

وہ بھی علامات کے مطابق دی جا سکتی ہیں۔



# ورم اعصابہ

## Neuritis

(Inflammation of nerves)

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ ورم اعصابہ کے لئے بہترین دوا۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے درد اعصابہ۔  
ہائپریمکم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ لو یا گرمی لگ جانے کی وجہ سے ورم اعصابہ۔ سر کو کھلا رکھنے یا حرکت کرنے سے بہتر ہو۔
- ☆ گلوٹامین 3x یا 6 'دو گھنٹے بعد
- ☆ تھمبایا ہوا چہرہ۔ خون کا بہاؤ سر کی طرف۔ کھنکھن کی وجہ سے درد اعصابہ۔  
بیلاڈونا 30 'تین گھنٹے بعد
- ☆ دو اعضاء کے درمیان کی جگہ کے درد اعصابہ کے لئے۔ ہوا اور چھونے سے بہت زیادہ حساس۔
- ☆ کسی فکر یا خوف کی وجہ سے اچانک ہونے والا درد اعصابہ۔ روشنی یا شور سے تکلیف پڑھے۔  
ریونون بلبرس 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ رحم کی تکلیفات کی وجہ سے۔ علامات سے مرض ظاہر ہو۔  
اکونائٹ 30 یا 200 'دو گھنٹے بعد
- ☆ کسی فوگا 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ درد اعصابہ جس کو گرمائش اور دبانی سے آرام آئے اور فوگ سے تکلیف پڑھے۔  
میکینسیا فاس 6x یا 30 'چار گھنٹے بعد



# لنگڑی کا درد / عرق النسا

## Sciatica

(See arthiritis, slipped disk, lumbago etc also)

لنگڑی کا درد عصبی سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کولہے میں ایک سائنک نروٹ ہوتی ہے۔ چونکہ یہ درد کولہے کی اس نرو سے ٹانگ کی طرف پھیلتا ہے اسی لئے اسے انگریزی میں شالینکا درد کہا جاتا ہے۔ یہ درد نہایت تکلیف دہ اور ناقابل برداشت ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہجلی کا سا کرنٹ لگتا ہے۔ بعض اوقات اس میں جلن بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر اس درد کا سبب وٹامن بی کی کمی کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کثرت سے تمباکو نوشی کرنے، چوٹ لگ جانے، پسینے کے بعد ہوا لگ جانے، زیادہ ٹھنڈے مشروبات استعمال کرنے اور سردی لگ جانے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس مرض کے علاج کے ساتھ ساتھ سخت بستر پر آرام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس تکلیف میں زیادہ چلنے پھرنے سے پرہیز کرنا چاہئے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ لائنیں جھکن محسوس کریں۔ بائیں جانب کی سرین یا پٹھے میں گولی لگنے کا سا درد۔ کولہے کی ہڈی میں کیل ٹھونکنے کا سا درد۔

یو پی نوریم پروفیم 200 یا 1M تین گھنٹے بعد

☆ زبردست محنت یا جھکن کے بعد لنگڑی کا درد۔ بستر سخت محسوس ہو۔

آرینیکا مونٹ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ کبھی درد ہو اور کبھی سن ہو جائے۔ بیرونی سرین یا پٹھے کے ساتھ شدید پھاڑنے والا درد۔ جلن دار درد۔ حرکت کرتے سے بڑھ جائے۔

نفیلیم (Gnaphalium) 200 یا

1M چار گھنٹے بعد

☆ ایسے محسوس ہو کہ بائیں کولہے کی نیس چھوٹی ہو گئی ہیں۔ اس کھپاؤ کی وجہ سے چلنے ہوئے لنگڑا نے لگے۔ بیٹھے ہوئے تکلیف میں اضافہ ہو۔ لیٹے ہوئے درد کی شدت میں کمی ہو۔

امونیم میور 200 چار گھنٹے بعد

☆ اعضاء کی کمزوری اور لنگڑا پن۔ ران کے پٹھوں میں خراش اور کھپنے کا احساس۔

کمرے اور چلتے ہوئے تکلیف میں اضافہ ہو۔ نیچے کی جانب پھیلنے والا درد۔

کالسیا لیٹ 200 'چار گھنٹے بعد

☆ متاثرہ حصے میں درد ہو اور سن ہو جائیں۔ شدید قسم کا پھاڑنے اور چیرنے والا درد۔ حرکت سے اور رات کو بستر میں تکلیف شدید ہو جائے۔

کیومیلا 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد

☆ بائیں ٹانگ کے ہڈی کے ابھاروں میں کیل ٹھوکنے کا سا درد۔ رات کے وقت درد زیادہ شدید ہو خاص طور پر رات ڈھلے صبح کے قریب۔

کالی آیوڈیم 200 یا 1M اور اس سے

بڑی طاقت 'ہفتہ وار' چھ مرتبہ

☆ نسون اور رگوں پر چوٹ لگنے کی وجہ سے سخت اذیت ناک درد دیں۔

بانیریکم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ گھٹنے کے وتر یا بندھن بہت چھوٹے محسوس ہوں۔ اکڑے ہوئے اور کچے ہوئے محسوس ہوں۔ پاؤں کو حرکت دینے کی خواہش کرے۔ کھلی ہوا میں تکلیف بڑھے اور گرمائش سے افادہ ہو۔

کاشی کم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ بجلی کے جھکوں کی طرح کا درد۔ گولی لگنے کا سا درد ران کے بیرونی حصے پر۔ حرکت کرنے کی خواہش کرے۔ لیکن حرکت کرنے سے درد بڑھ جائے۔

فاسٹولا کا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ گھٹنے اور کولہوں کے جوڑوں میں پھاڑنے والا درد۔ رات کے وقت زیادہ ہو۔ کثیر پسینہ آئے۔ لیکن اس سے بھی آرام نہ ملے۔

مرک سال 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ چیرنے والے درد۔ جو کہ کولہوں سے ران ٹانگ اور پیر کی طرف جائیں۔ گولی لگنے کے سے درد جس سے تمام ہاتھ پاؤں ہلکے پڑ جائیں۔ اچانک درد شروع ہو۔ لمبھند 'حرکت اور چھوٹے سے تکلیف بڑھے۔ دبائے، گرمائش اور آرام کے دوران افادہ ہو۔

کالوسنتھ 200 یا 1M 'تین گھنٹے بعد

☆ بائیں جانب کا عرق النساء، حرکت شروع کرنے پر زیادہ ہو۔ معمولی یا ہلکی سی حرکت سے کچھ افادہ ہو۔ دبائے اور سہلانے یا رگڑنے سے بہتر ہو۔ شام، رات کو اور گرم کمرے میں تکلیف میں اضافہ ہو۔ کھلی ہوا میں بہتر ہو۔

کالسیا Lat 200 'چار گھنٹے بعد

☆ بھینگنے کی وجہ سے لنگڑی کا درد ہو۔ کوئی چیز اٹھاتے ہوئے زور پڑے۔ سن ہو جائے۔

آرام کے دوران اضافہ ہو۔ ملنے یا رگڑنے سے اور گرمائش سے افادہ ہو۔ رات کے وقت اور مرطوب موسم میں تکلیف میں اضافہ ہو۔

رہس ٹاکس 200 یا 1M چھ گھنٹے بعد

☆ درد رات کے وقت زیادہ ہو۔ ذرا سے بھی جھٹکے، اعضاء اور پاؤں نیچے لٹکانے سے اور گرمائش سے بھی تکلیف بڑھے۔

بیلاڈونا 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ کمر کے کسی چھوٹے سے حصے میں درد شروع ہو اور پھر نچلے، دھڑکی جانب بڑھے اور مریض کو مسلسل تنگ کئے رکھے۔ ٹھنڈ سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ مریض ٹھنڈ زیادہ محسوس کرے۔

ٹکلیریا 200 یا 1M 10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ متاثرہ عضو جسم کے باقی حصے کی نسبت زیادہ ٹھنڈا ہو۔ درد اوپر کی جانب چڑھے۔ بستر میں جب گرمائی آجائے تو تکلیف بڑھے۔ ٹھنڈی پٹی سے بستر محسوس کرے۔

لیڈم پال 200 یا 1M چار گھنٹے بعد

☆ ڈھانپنے سے آرام آئے اور ٹھنڈ اور حتیٰ کہ ذرا سی بھی ہوا لگنے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

شیلینیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ جلدی جلدی گولی لگنے کے سے درد ہوں۔ نیچے کی جانب بڑھے۔ عضو کو پھیلانے سے بہتر ہو اور حرکت سے بھی افادہ ہو۔

ڈائس کوریا 30 چار گھنٹے بعد

☆ بہت گرمائی میں اترا ہوا درد۔ آرام کے دوران اور کسی طرح کی رگڑ، خراش یا چوٹ آنے کے بعد تکلیف زیادہ بڑھے۔

روٹا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد





## امراض بول (پیشاب کی تکلیفات)

### Affections of Urine

عام طور پر گردہ اور مثانے کی پتھری کی وجہ سے پیشاب کی تکلیفات ہوتی ہیں۔ پیشاب میں خون کی آمیزش (Haematuria) بے ارادہ پیشاب نکل جانا، سوتے میں پیشاب نکل جانا، پیشاب مشکل سے آنا، ورم مثانہ، پیشاب پیدا ہی نہ ہونا (Ischuria) زہر بول، مثانہ کی خراش، سوزش مثانہ، مثانہ کی کمزوری، تشنج مثانہ، وغیرہ پیشاب کے عام امراض ہیں۔ جن کی وجہ سے پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ مثانہ اور گردے کے مقام پر درد ہوتے ہیں۔ پیشاب میں پیپ آتی ہے۔ بعض دفعہ پیشاب رک جاتا ہے یا قطرہ قطرہ آتا ہے۔ بعض دفعہ پیشاب کی تکلیفات کی وجہ سے بخار بھی ہو جاتا ہے۔ پیشاب کے امراض کی علامات کے مطابق دوا تجویز کرنے سے مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ صرف لیٹے ہوئے پیشاب کر سکے۔ پیشاب جلدی اور زیادہ مقدار میں آئے۔  
کریازوٹ 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ
- ☆ پیشاب کی نالی میں گدگدی کے ساتھ پیشاب آئے۔  
فیرم فاس 6x یا 30 'چار گھنٹے بعد'
- ☆ مثانے کے بھراؤ کے ساتھ پیشاب میں رکاوٹ۔  
اوپیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ پیشاب سے پہلے اور بعد میں جلن ہو۔  
کیستمرس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ
- ☆ کسی دوسرے کی موجودگی میں پیشاب نہ کر سکے۔ چلتے ہوئے چھینکتے اور کھانتے ہوئے پیشاب نکل جائے۔  
نیزم میور 12x یا 30 'چار گھنٹے بعد'
- ☆ بخار کی حالت میں نبض اور نمبر پچر غیر مناسب ہو۔ پیشاب کرنے کی مسلسل حاجت ہو۔  
پائرونیٹم 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ



☆ سرخ ریت، دودھیا اور ریت کے ذرات والا پیشاب۔

لائیکو پوڈیم 30 یا 200، چار گھنٹے بعد،  
تین مرتبہ

☆ پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا گدلا جالے دار۔ جب پیشاب نہ کر رہا ہو تو نالی میں درد ہو۔

نیرم کارب 30، چار گھنٹے بعد

☆ بہت زیادہ پیلے یا گہرے بھورے رنگ کا پیشاب۔ غیر شفاف اور گدلا پیشاب۔

کالچی کم 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ مثانہ کے گردن کے فالج کی وجہ سے غیر ارادی طور پر پیشاب خارج ہو جائے۔ گدلا پیشاب۔

ڈلکا مارا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد، تین  
مرتبہ

☆ سوزاکی مریض میں پیشاب کی شکایات۔

سفلیئم 200 یا 1M، ہفتہ وار، تین  
مرتبہ

☆ دوران پیشاب جلن اور خارش۔ پیشاب کے ساتھ رطوبت بھی خارج ہو۔ پیشاب کے بعد قطرے پگھلتے رہیں۔

پروڈیم 30 یا 200، چار گھنٹے بعد، تین  
مرتبہ

☆ مثانہ خالی ہونے سے پہلے پانچ چھ مرتبہ پیشاب رکے۔ رات کے وقت جلدی جلدی یا تھوڑے وقفے کے بعد پیشاب آئے۔

تھوجا 200 یا 1M، چار گھنٹے بعد، تین  
مرتبہ

☆ یوریمیا کی رکاوٹ۔ پیشاب کرنے میں دقت ہو۔

ہلمیم میٹلیکم 30 یا 200، چار گھنٹے  
بعد، تین مرتبہ

یوریمیا : پیشاب کی ایک بیماری جو گردوں کی خرابی یا ان کے کسی نقص کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یا خود گردے اس نقص کا سبب ہوتے ہیں یا کسی دوسری بیماری کی وجہ سے جو جسم کے کسی اور حصے میں پیدا ہوتی ہے گردے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ پیشاب کی سمیت (پیشاب میں تیزابیت جو کہ زہر آلود ہوتی ہے) اس مرض میں پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے مادے جو پیشاب کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔ (نائٹروجن پر مبنی) اور خون میں موجود ہوں ان کا اخراج بھی ناقابل عمل ہو جاتا ہے۔

☆ پیشاب کرتے ہوئے مٹانے کی گردن میں درد محسوس ہو۔ پیشاب کی غیر موثر حاجت ہو۔

نکس دامیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ تیز رنگ کا پیشاب۔ بہت آہستہ نکلے۔ پیشاب کرتے ہوئے درد بھری کھچاؤ ہو۔

میڈورنیم 200 یا 1M چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ صرف گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اور گھٹنے کھلے کر کے بیٹھے سے پیشاب کر سکے۔

☆ بیٹھے ہوئے یا چلتے ہوئے پیشاب کے قطرے نکل جائیں۔ مریض ٹھنڈی اور کھلی ہوا میں بہتر محسوس کرے۔

☆ پیشاب سے پہلے، پیشاب کے دوران اور بعد میں جلن اور کاٹنے والے درد محسوس ہوں۔

کنابس انڈیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ پیشاب میں البیومن آئے۔ ذرات شامل ہوں اور جالا سا آئے۔ شدید قسم کی بدبو ہو۔ پیشاب میں خون خارج ہو۔

☆ مٹانے میں مسلسل کھچاؤ اور تناؤ ہو۔ پیشاب میں خون آئے۔

☆ دن کے وقت وقفے وقفے سے پیشاب آئے۔ زور لگائے بغیر پیشاب نہ کر سکے۔

لیلم ننگ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ جب بیٹھا ہو تو پیشاب کے قطرے نکل جائیں۔ قلت پیشاب اور جلن کے ساتھ وقفے وقفے سے حاجت محسوس کرے۔ صرف کھڑے ہو کر پیشاب کر سکے۔ پیشاب کے ساتھ گیس بھی خارج ہو۔

سارسا پیریل 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ بدبودار پیشاب۔ پیشاب کرتے ہوئے جلن ہو۔

پنسیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ جلدی جلدی اور زیادہ مقدار میں پیشاب آئے۔ صرف پاخانہ کرتے ہوئے پیشاب کر سکے۔

میورک ایسڈ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ پیشاب میں رکاوٹ۔ پیشاب کی رنگت روشنائی کی طرح کی۔ پیلے رنگ کا پیشاب۔ لمبوں کے عرق کا سا پیشاب۔

چیلی ڈونیم Q یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ کمزوری کے ساتھ زیادہ مقدار میں پیشاب خارج ہو۔

گلکیریا فاس 6x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ وقفے وقفے سے پیشاب کی حاجت ہو۔ پیشاب کے اخراج کے لئے بڑی دیر انتظار کرنا پڑے۔

لائیکو پوڈیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ نویا ہتا لوگوں کی پیشاب کی شکایات۔ پیشاب کرنے کے بغیر شغف میں جلن ہو۔

شیفنی سیکریا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ پیشاب کرتے ہوئے مریض ٹھنڈ محسوس کرے۔ پیشاب ٹھنڈا اور سخت بدبودار۔

ٹائٹریک ایسڈ 30 یا 200 چار گھنٹے

بعد، تین مرتبہ

☆ گمرے بھورے رنگ کا پیشاب۔ قلیل مقدار میں۔ امونیا کی سی بو والا۔ تیز اور کانٹے والا پیشاب۔

ایس فونڈا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ سوائے کھڑے ہوئے کسی طرح بھی پیشاب نہ کر سکے۔ ہر کھانسی کے ساتھ پیشاب نکل جائے۔ آپریشن کے بعد پیشاب میں رکاوٹ ہو۔ عضلہ ماصرہ (کسی چھید یا خارجی راستے کو بند کرنے یا سکینر نے والا عضو) Sphincter کے فالج کی وجہ سے غیر ارادی طور پر پیشاب نکل جائے۔

کاشی کم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ نیند کے ابتدائی دور میں غیر ارادی طور پر پیشاب نکل جائے۔ پیشاب میں سرخ ذرات ہوں جو کہ برتن میں سختی کے ساتھ جم جائیں۔

سیپا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ



☆ مریض ہر وقت پیشاب کرتا رہے۔ شدید تیز درد کی وجہ سے مریض اچھل پڑے جیسے اس کے انگوٹھے کے ناخن میں کوئی تیز دھار والا آلہ پہنچا دیا گیا ہو۔

سلفر 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ بہت زیادہ تیزابی پیشاب۔ قطروں میں نکلے۔ پیپ کے ساتھ گاڑھا ہو۔ نالی میں چھیننے والا خراش دار درد ہو۔

آرنیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ کردرد کے ساتھ پیشاب ہو۔ پیشاب کی نالی میں کھچاؤ اور رکاوٹ ہو اور درد ہو۔

کوکوربٹا (Cucurbita Cit) 30

تین گھنٹے بعد

☆ پیشاب گرم اور چھینے والا۔ مریض پیشاب کرنے سے پہلے تھکنے چلائے۔

بوریکس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ پیشاب ایسا پیلا جیسا یرقان میں ہوتا ہے۔ یسدار پیشاب۔

کروٹیل 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ تیز بو والا پیشاب جس میں خون کی آمیزش ہو۔

سلی سائٹک ایسڈ 30 یا 200 چار

گھنٹے بعد

☆ پیشاب کی مسلسل حاجت ہو لیکن تھوڑی مقدار میں ہو۔ پیشاب لگنے سے خارش اور جلن ہو۔

مرک سال 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ پیشاب کی ہر قسم کی تکلیف کے لئے معاون دوا۔

مارگن پیور (Morgan pure) 200

یا 1002 پندرہویں روز، تین مرتبہ

☆ مریض کو پیشاب نکلنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پیشاب کی دھار ٹیڑھی یا ترچھی پڑتی ہے۔

بیبیر سلف 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ پیشاب کے اخراج کے بعد بھی ایسا محسوس ہو کہ مٹانے میں باقی رہ گیا ہے۔ پیشاب میں

چونا ملا ہو اور تار دار ہو۔

کالی بک 30 یا 200 چار گھنٹے بعد



## بول الدم (پیشاب میں خون آتا)

### Hamaeturia

اس مرض میں پیشاب سے پہلے یا بعد میں یا پیشاب میں ملا ہوا خون آتا ہے۔ بعض اوقات خالص خون بھی آجاتا ہے۔ جب خون پیشاب میں ملا ہوا اور سیاہی مائل آئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ خون گردے سے آیا ہے۔ پیشاب کے آخری حصے میں آنے والا خون مٹانے سے آتا ہے۔ بعض بخاروں مثلاً "میریا وغیرہ میں بھی کبھی کبھار خونی پیشاب آجایا کرتا ہے۔ غدہ قداریہ اور تائزہ کے بعض امراض کی وجہ سے بھی پیشاب میں خون آتا ہے۔ بعض لوگوں کو خونی پیشاب آنے کی وجہ شدید سردی ہو تو مریض کو پہلے جاڑا لگتا ہے۔ وہ کانپتا ہے پھر پیشاب کے ساتھ خون آتا ہے۔ مٹانے سے چل کر آگے تھلنے سے گزر کر مٹنے تک آنے والی مٹی سے خون آئے تو پیشاب کے بغیر اور قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ زبان صاف ہو۔ مسلسل متلی ہو۔ پیشاب میں چمکدار خون شامل ہو۔  
الپی کاک Q یا 30 تین گھنٹے بعد
- ☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والا مریض۔ کمر میں درد اور حشفہ میں تیز درد۔ بواسیر کو اچانک روک دیا گیا ہو۔ بہت زیادہ شراب اور سپرٹ وغیرہ سے بنی چیزیں پینے والا مریض۔  
نکس دامیکا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ بخار اور بے چینی کے ساتھ چمکدار خون پیشاب کے ساتھ نکلے۔ تکلیف کے ابتدائی دور کے لئے۔  
اکو نائٹ 30 یا 200 دو گھنٹے بعد
- ☆ اچانک بڑی تیزی سے خون جاری ہو جائے۔ چمکدار سرخ خون اور لو تھڑے۔  
ایری گیرون (Erigeron) Q 7-3  
قطرے، تین گھنٹے بعد
- ☆ مریض ٹھنڈی بخ چیزیں کھانا مینا پسند کرے۔ گردے اور پتے میں درد۔ جلن کے ساتھ خون ملا پیشاب آئے۔  
فاسفورس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ گردے، مٹانے یا مٹنے سے خون کا اخراج۔ پیشاب میں ریت کے سے سرخ ذرات۔  
اوسی مم کینالیم  
(Ocimum Can) 30 یا 200 چار  
گھنٹے بعد

- ☆ کسی مشینی چوٹ یا سوزش کی وجہ سے پیشاب کی ٹالی میں خراشدار درد۔  
 آرینیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین  
 ☆ معمول سے کم ٹیپر کے ساتھ کسی بھی تکلیف اور بے چینی کے بغیر خون آئے۔  
 چائنا سلف 30 چار گھنٹے بعد  
 ☆ مٹانہ کا دباؤ گردے کی طرف بڑھے۔ پیشاب میں کالی رنگت کے ذرات۔ گردے۔  
 خون آئے۔

☆ ٹیر-بستہ Q (Terebinth) 7-5

- قطرے، تین گھنٹے بعد  
 ☆ پیشاب قطرہ قطرہ آئے۔ پیشاب کے دوران، بعد اور پہلے جلن دار درد کے ساتھ۔ پانی  
 پینے کے بعد زیادہ تکلیف ہو۔  
 کیسترس 30 چار گھنٹے بعد  
 ☆ سیاہی مائل خون۔ خون کے لوتھڑے۔ زیادہ خون نکل جانے کے سبب مریض بے ہوش  
 ہونے لگے۔ پٹکھا کرانا پسند کرے۔

- ☆ چائنا Q یا 6 آدھے گھنٹے بعد  
 ☆ پیشاب میں اینٹ کے سے سیاہ موٹے ذرات۔ پیشاب رک جائے۔ بعض اوقات یہ دوا  
 پیشاب اتارنے والی ٹالی کا متبادل بھی ثابت ہوتی ہے۔

☆ فیسی Q یا 6 (Thalaspi b.p.)

7-5 قطرے، چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی فیرم فاس 3x اور کالی فاس 6x تین گھنٹے بعد دینا  
 فائدہ مند ہے۔

# پیشاب نکل جانا

## Bed wetting/Enuresis

اس مرض میں غیر ارادی طور پر پیشاب نکل جاتا ہے۔ اکثر اوقات رات کے وقت ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دن کے وقت بھی یہ شکایت ہو سکتی ہے۔ یہ مرض عام طور پر بچوں اور بوڑھوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ مرض مملکت نہیں ہے لیکن اس کے سبب پریشانی اور شرمندگی بہت ہوتی ہے۔

اس مرض کا اصل سبب مثانہ کی کمزوری ہے۔ ایسومنا اور ذیابیطس کی وجہ سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ مثانہ کی پتھری کی وجہ سے بھی پیشاب قطرے قطرے آنے لگتا ہے۔ رات کو سردی لگنا اور نقص ہاضمہ بھی اس مرض کا سبب ہو سکتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ مریض خواب میں پیشاب خارج کر کے جاگ اٹھے۔  
لیک کینیم 200، ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ رات کے پہلے حصے میں غیر ارادی طور پر پیشاب خطا ہو جائے۔  
کاسیکم 30 یا 200، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ کیڑوں کی وجہ سے بستر میں پیشاب نکل جائے۔  
سائنا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد
- ☆ اعصابی مریضوں میں جبکہ کاشی کم ناکام ہو جائے۔  
جیلی میم 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ عام اور ڈراونے خواب کے ساتھ پیشاب نکل جانے کی عادت۔  
ایکوی سٹیم (Equisetum) 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ زیادہ ٹھنڈ محسوس کرنے والا مریض۔ سونے کے فوراً بعد بستر میں پیشاب نکل جائے۔  
سپیا 200، 10 منٹ بعد، تین مرتبہ
- ☆ نیند کے دوران غیر ارادی طور پر پیشاب نکل جائے۔ اکیلے ہونے کے ڈر سے پیشاب خارج ہو جائے۔ فکر یا پریشانی سے پیشاب خطا ہو جائے۔  
لائیکوپوڈیم 30 یا 200، 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ موٹے اور لمبے بچے بستر میں پیشاب کر دیں۔ پیند جلدی سے آجائے اور ٹھنڈ سے جلد متاثر ہونے کی رغبت رکھیں۔

گلکیریا کارب 200 یا 1M چار گھنٹے

☆ مخصوص جگہ پر پیشاب کرنے کے خواب کے ساتھ گہری نیند میں بستر بھگو دیں۔ دانت کا ناسور بھی ہو۔

کریازوٹ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ بستر میں پیشاب کر دینے کی عادت۔ چچک کے مرض کے بعد پیشاب کی تکلیف بڑھ جائے۔ گرم مزاج مریض۔ طبیعت اور تکلیف میں تبدیلی آتی رہے۔ پیاس بالکل اڑ جائے اور کھلی ہوا کی خواہش کرے۔

ہلسٹیل 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ مکمل چاند کی راتوں میں بستر گھلا کر دے۔ جب تمام منتخب دوائیں ناکام ہو جائیں اور مریض خارش زدہ ہو۔

سورنیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

☆ مخصوص وزن سے کم پیشاب۔ تیزبو۔ نیند کے دوران کئی مرتبہ پیشاب کر دے۔

ایسڈ نیٹر 3 یا 6 چار گھنٹے بعد

☆ عسر البول (قطرہ قطرہ پیشاب) مٹانے کی کمزوری۔ مٹانے میں درد۔

میکلنٹس پال اوٹل

'200 (Magnetis Pol Austral)

ہفتہ وار، تین مرتبہ

بائیو کیمک کی گلکیریا فاس 6x کالی فاس 6x اور نیزم فاس 6x

چار چار گھنٹے بعد دینا مفید ہے۔





## بول زلالی، البیومن (پیشاب میں یسدار مادہ)

### Albuminuria

بول زلالی خود سے کوئی مرض نہیں بلکہ یہ بعض دوسرے امراض مثلاً "گردہ کی پتھری، گردہ میں رسولی، درم گردہ وغیرہ کی علامت ہے۔

اس مرض میں پیشاب کے ساتھ البیومن خارج ہوتی ہے۔ یہ مادہ حیوانات و نباتات کی ساخت میں پایا جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی خالص البیومن ہوتی ہے۔ یہ مادہ عضلات، ہڈیوں اور دیگر اعضاء وغیرہ کی ساخت کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

اس مرض میں کبھی قبض ہو جاتا ہے اور کبھی دست آنے لگتے ہیں۔ ہاضمہ ناقص ہوتا ہے۔ جی متلاتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے۔ مریض کو رات کے وقت کئی مرتبہ پیشاب کے لئے اٹھنا پڑتا ہے۔ جسم کی رنگت پھکی پڑ جاتی ہے اور مریض کمزور و لاغر ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً "استسقا" ہو جاتا ہے۔

یہ مرض بعض امراض کے دوران بھی ہو جایا کرتا ہے مثلاً "خناق، سرخ بخار اور دوران حمل۔ زیادہ البیومن والی اشیاء کھانے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ جبکہ پیشاب میں خون بھی شامل ہو اور یسدار مادہ بھی۔ نظام عصبی اور دماغ میں ہلکا درد اور ماؤف ہونے کی سی کیفیت ہو۔ دماغی دھندلاپن ہو۔ کمزوری ہو اور چکر آئیں۔

زکم فاس 30، ہر چار گھنٹے بعد

☆ پیشاب جلد جلد آئے۔ حشفے میں پیشاب کے شروع میں جلن ہو۔ پیشاب سیاہی مائل اور تھوڑا سا ہو اور اس میں خون کی ملاوٹ ہو۔

مرکبور سال 200 یا 1M، ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ مقدار میں تھوڑا۔ گاڑھے رنگ کا اور ذرات سے بھرا ہوا پیشاب۔ جب پیشاب کیا جائے تو جلن اور خراش ہو۔ پیاس نہ لگے۔ گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

ایس ملینکا 30 یا 200، ہر چار گھنٹے

بعد، تین مرتبہ

☆ پیشاب میں البیومن یا خون کے قطرے شامل ہوں۔ دوران پیشاب حشفے میں جلن اور پھاڑنے والا درد ہو۔

ٹیرے .سم Q (Terebinth) 5 تا

10 قطرے، ہر چار گھنٹے بعد

☆ پیشاب میں خون اور چونے کی آمیزش ہو۔ صاف اور بدبودار ہو اور اس میں فاسٹیٹ بھی ہو۔

ہیلوناس Q (Helonias) 5 تا 10

قطرے، ہر چار گھنٹے بعد

☆ خون کی آمیزش والا گدلا پیشاب۔ مقدار میں تھوڑا۔ پیشاب کرتے ہوئے حذ میں شدید جلن۔

کیسترس 30، ہر چار گھنٹے بعد

☆ گدلا پیشاب، بدبودار جس میں یسدار تار والی رطوبت ہو اور خون بھی شامل ہو۔ پیشاب گزارنے میں مشکل پیش آئے۔

چیمافلا امب

10 تا 5 Q (Chimaphila Umb)

قطرے، ہر چار گھنٹے بعد

☆ پیشاب میں گدلا پن جس کی رنگت بھوری سی ہو۔ اس میں پنچٹ یا گاد ہو اور پیشاب میں خون کی آمیزش ہو۔ برف کی طرح ٹھنڈے پانی کی خواہش پائی جائے۔

فاسفورس 30 یا 200، ہر چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ پیشاب مقدار میں تھوڑا، گہرے رنگ کا، پیپ ملا، خون آلود، بھورا۔ سیاہی مائل جس میں البیومن شامل ہو۔ کھانے کی خوشبو سے مریض کی تکلیف میں اضافہ ہو۔

کالچی کم 30 یا 200، ہر چار گھنٹے بعد

☆ پیشاب جلدی جلدی آئے۔ مقدار میں تھوڑا ہو۔ گہرے رنگ کا کافی کی طرح۔ مٹانہ میں اکڑا ہٹ ہو۔

ہیلے بورس Q (Helleborus) یا

30، ہر چھ گھنٹے بعد

☆ دبے ہوئے سوزاک کی ہسٹری کے ساتھ۔ درد کے ساتھ آہستہ آہستہ پیشاب خارج ہو۔

میڈورینم 200 یا 1M، ہر 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ خون کی آمیزش والا پیشاب جبکہ گھٹیا بھی ہو۔ حمل کے دوران۔

مرکیورس سال 200 یا 1M، ہر چھ گھنٹے

بعد

علامات کے مطابق متعلقہ دوا کے ساتھ ساتھ

ہائپو کیمک کی کالی فاس 6x دینا بھی مفید ہے۔

# ذیابیطس

## Diabetes

(پیشاب میں شوگر بھی دیکھئے)

بچوں کو عموماً یہ مرض نہیں ہوتا بلکہ چھپتیس تیس برس کی عمر کے بعد ہوتا ہے۔ عورتوں کی نسبت مردوں کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے۔ اس مرض میں پیشاب میں گلوکوز یعنی شکر خارج ہوتی ہے اور بعض دفعہ خون میں بھی شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔

اس مرض کی پانچ خاص علامات ہوتی ہیں یعنی پیشاب بار بار آتا ہے، پیشاب کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، پیشاب میں شکر خارج ہوتی ہے، شدید پیاس لگتی ہے، منہ خشک رہتا ہے اور بھوک زیادہ لگتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کے منہ کا ذائقہ میٹھا رہتا ہے۔ سوڑھے پھول جاتے ہیں اور درد کرتے ہیں۔ مریض کی جلد خشک ہو جاتی ہے۔ چکر آنے لگتے ہیں۔ مریض ست اور چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ موتے کا عارضہ ہو کر بینائی میں نقص آ جاتا ہے۔

اس مرض کی دو اقسام ذیابیطس شکر کی اور ذیابیطس سادہ ہوتی ہے۔ جب یہ مرض زیادہ میٹھا اور نشاستہ دار اشیاء کھانے اور انتڑیوں کے نقص کی وجہ سے ہوتا ہے تو اسے ذیابیطس موزی کہتے ہیں اور جب یہ مرض جگر کی خرابی یعنی کھانے پینے میں بدپرہیزی یا شراب خوری کی وجہ سے ہو تو اس کو ذیابیطس جگری کہتے ہیں۔ جب یہ مرض زیادہ دماغی محنت یا کثرت مجامعت یا سر یا ریڑھ پر کسی صدمے کے نتیجے کی وجہ سے ہو تو اسے ذیابیطس عصبی کہا جاتا ہے۔

مرض شدید ہو جانے کی صورت میں سخت کمزوری ہو جاتی ہے۔ پھوڑے پھنسیاں اور کار بکل نکلنے لگتے ہیں۔ ایگزیمہ ہو جاتا ہے۔ مرض سل اور نمونیہ بھی ہو جاتا ہے اور آخر کار شدید کمزوری کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ مردوں میں قوت باہ کمزور ہو جاتی ہے۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ عام کمزوری، بہت مقدار میں پانی پینے کی پیاس۔ جلد جلد کثرت سے پیشاب آئے۔ بار بار پھوڑے پھنسی ہوں جن میں خارش اور جلن ہو۔ ذیابیطس، خارش، جلن اور درد۔

سیفلائنڈرا انڈیکا

10-5 'Q (Cephalandra Ind)

قطرے، چار گھنٹے بعد



☆ بلند شوگر کے لئے بہت ہی موثر دوا۔

سائٹری جیم جام

'Q (Syzgium J) 10-8 قطرے

چار گھنٹے بعد

☆ بغیر پیاس کے منہ خشک۔ رات کے وقت بہت مقدار میں پانی پینے کی پیاس۔ غیر ارادی طور پر پیشاب نکل جائے۔ لاتوں میں کمزوری۔ آرام اور دبائے سے بہتر محسوس کرے۔

سلفونا مائڈ (Sulphonamide) 30

چار گھنٹے بعد

☆ لاغری کے ساتھ ذیابیطس۔

یورینیم سٹیلکیم 3x

چار گھنٹے بعد

☆ ذیابیطس شدید پیاس کے ساتھ۔ مریض تکلیف سے کھل رہا ہو۔ مایوس اور پشیمردہ قبض۔

نیرم میور 12x یا 30

چار گھنٹے بعد

☆ منہ خشک، پیاس بڑھی ہوئی۔ رات کے وقت بار بار پیشاب آئے۔ پیشاب کثیر، پیشاب کرنے کے بعد کمزوری ہو جائے۔ عام کمزوری اور لاغری۔ اندام نمائی میں بغیر کسی ابھار کے سخت خارش۔

جائمنیما (Gymnema) 10-5

قطرے، چار گھنٹے بعد

☆ جب ذیابیطس اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہو۔ سخت کمزوری، بے حسی کی کیفیت، عام کمزوری خاص طور پر مردوں میں۔

ایسڈ فاس Q یا 6

چار گھنٹے بعد

☆ معاون دوا۔

میڈورینم 200 یا 1M

پندرہویں دن

تین مرتبہ

بائیو کیمک کی نیرم سلف 12x یا 30 اور بائیو کیمی نیشن نمبر 7

چار گھنٹے بعد دینا بھی بہت فائدہ مند ہے۔



## مشت زنی (مردانہ) جلق

### Masturbation (Male)

عام طور پر جذبات سے مغلوب ہو کر نوبالغ لڑکے مشت زنی یا جلق کی بدعات اختیار کر لیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے قوت حیات کمزور ہو جاتی ہے۔ خام منی ضائع ہونے سے جسم کی بالیدگی رک جاتی ہے۔ قویٰ کمزور ہو جاتے ہیں۔ آلہ تناسل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ ابستادگی کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ آلہ تناسل ذکی الحس ہو جاتا ہے۔ ذرا سی شہوت سے بھی منی خارج ہو جاتی ہے۔ سرعت انزال، احتلام، جریان اور ضعف باہ کی وجہ سے قوت مردی کمزور پڑ جاتی ہے۔ مریض ست و کابل ہونے لگتا ہے۔ طبیعت میں افسردگی اور تنگی آ جاتی ہے۔ حوصلہ پست اور ہمت کم ہو جاتی ہے۔ مجلس میں بیٹھنے سے گریز کرنے لگتا ہے۔ محفلوں میں جاتے ہوئے شرمانا ہے۔ چہرہ زرد اور آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ نظر کمزور ہونے لگتی ہے۔ آنکھوں کے گرد حلقے پڑ جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ زندگی کی تمام رونقوں اور خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بری عادت نہ چھوڑی جائے اور مناسب علاج نہ کیا جائے تو مرگی اور رعشہ کی تکلیفات حتیٰ کہ پاگل پن اور جنون کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ خود کشی تک پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ رات کے وقت احتلام۔ یادداشت کمزور ہو جائے اور ہر وقت افسردہ رہے۔ وہم اور مراق یا مایہو لیا۔ کمر میں درد۔ لاتیں کمزور۔ چہرہ لٹکا ہوا۔ چہرے سے شرمندگی ٹپکے۔ ملزم یا مجرم سا۔ چہرے پر غلط کاری کے آثار۔ پرانا مشت زنی کا مرتکب۔

شیخی یگریا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ مریض تیزی سے بڑھے اور بہت لمبا ہو جائے۔ بلوغت سے پہلے ہی مشت زنی شروع کر دے جس کی وجہ سے کمزوری اور بد اثرات ہوں۔ ناجائز حرکت پر کنٹرول نہ کر سکے۔

فاسفورک ایسڈ 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ سوتے میں مشت زنی کی عادت۔ احساس برتری۔

پلائینا 1M پندرہویں روز، تین مرتبہ

☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والا مریض جس کو قبض کی شکایت بھی ہو۔ صبح کو سو کر اٹھنے پر تھکا ماندہ۔

نکس و امیکا 200 یا 1M چھ گھنٹے بعد

☆ دماغی اور جسمانی طور پر تھکا ماندہ۔ دماغ میں دھند لاپن۔ تمام جسم میں جھکن اور بھاری پن کا احساس۔ خاص طور پر ہاتھ پاؤں میں۔ مشت زنی کے اثرات بد۔

بیکرک ایسڈ 30 چار گھنٹے بعد

☆ مشت زنی سے بہت زیادہ منی ضائع ہو جانے کی وجہ سے کمزوری۔ چہرہ زرد اور بیمار کا سا۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی جن کے گرد نیلے اور گہرے حلقے پڑے ہوں۔ چہرے کا رنگ پیلا ہلدی کی طرح۔ پینہ بہت زیادہ اور کمزور کر دینے والا۔ ذرا سی محنت سے بھی پینہ آجائے۔

چائنا 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ مشت زنی کے عمل کی وجہ سے خود کو ملزم سا سمجھے۔ اور مایوس اور متاسف ہو۔ بہت زیادہ جھکن اور کمزوری۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑائے۔

فاسفورس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ جنسی طاقت کمزور پڑ جائے یا کم ہو جائے۔ مشت زنی کی بڑھی ہوئی خواہش۔ مشت زنی کے بعد مایوسی اور تاسف۔ جھکن اور اعصابی ڈھیلا پن۔

کلکیریا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار،

تین مرتبہ

☆ مشت زنی کے اثرات بد۔ نامردی اور کمزوری۔ چلتے ہوئے لڑکھڑائے۔ سیدھا اور ٹھیک طور سے نہ چل سکے اور نہ کھڑا ہو سکے۔ لاتیں کمزور ہو جائیں۔ اونگھنا شروع کر دے جیسے نیند آرہی ہو۔ ذہنی اور دماغی صلاحیتیں کمزور پڑ جائیں۔ یادداشت قریباً ختم یا کمزور ہو جائے۔

کالی برومائڈ 30 چار گھنٹے بعد

☆ معاون دوا۔ جنسی خیالات آئیں اور مشت زنی کی طرف رغبت ہو۔

سلفر 200 یا 1M پندرہویں روز، تین

مرتبہ

بائیو کیمک کی کلکیریا فاس 3x اور نیٹرم میور 12x بھی مفید ادویات ہیں۔



# جریان منی

## Spermatorrhoea

### Involuntary discharge of semen

(See seminal Emissions also)

تازہ سے بلا ارادہ منی خارج ہونے کو جریان منی کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر رات کے وقت سوتے میں ہوتا ہے۔ آلہ تناسل کی خراش کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ مشت زنی اور کثرت جماع کی وجہ سے جریان منی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ جریان منی زیادہ ہو جانے سے مریض ست اور کامل ہو جاتا ہے۔ پیشاب کے دوران جلن ہونے لگتی ہے۔ پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے۔ مریض چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ کمر میں درد اور چکر آنے لگتے ہیں۔ جسمانی اور دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ہاضمہ خراب اور قبض ہو جاتا ہے۔ مریض تنہائی پسند اور غمگین و افسردہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات خودکشی تک پر آمادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ زندگی کی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جماع کی شہوت کم ہو جاتی ہے یا بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ مرض شدت پکڑ جائے تو ہلکی سی تحریک، حتیٰ کہ شلوار کی رگڑ یا خراش اور جنسی خیالات تک سے منی خارج ہونے لگتی ہے۔ صحت مند اور کنوارے لوگوں کو ایک ماہ میں ایک یا دو مرتبہ منی خارج ہو جانے میں کوئی حرج نہیں البتہ مہینے میں کئی مرتبہ یا روزانہ خواب میں یا ابستادگی اور پیشاب پاخانہ کرنے کے دوران منی کا اخراج نہایت مملک ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ سوزاک کے دبائے جانے کی وجہ سے۔ معاون دوا۔  
میڈورینم 200 یا 1M پندرہویں روز،  
تین مرتبہ
- ☆ اعضاء تناسل ٹھنڈا اور ڈھیلا۔  
ایگنس کاسٹس Q یا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ اکثر اوقات نیند میں احتلام ہو جائے۔ عیاشی کے خواب میں منی خارج ہو یا احتلام ہو۔  
فاسفورس 30 یا 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ جنسی اور اشتغال انگیز خوابوں میں احتلام۔ شدید اعصابی انگیخت۔  
زکیم فاس 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ کمزوری کی وجہ سے جریان منی۔ جنسی بے راہ روی کی وجہ سے احتلام ہوتا رہے۔  
فاسفورک ایسڈ Q یا 6 چار گھنٹے بعد



- ☆ جب پاخانہ کرنے کے لئے زور لگائے تو غدودی رطوبت (منی) ٹپکنے لگے۔  
 کلکیر یا سلی کا 30 چھ گھنٹے بعد
- ☆ بوڑھے کنوارے یا غیر شادی شدہ لوگوں کا جریان منی۔  
 کوئیم میک 200 پندرہویں روز، تین مرتبہ
- ☆ سورا کے مریضوں کے لئے۔ صبح کے وقت ایستادگی ہو اور احتلام ہو۔ معاون دوا۔  
 سورینم 200 یا 1M پندرہویں روز، تین مرتبہ

## جریان / احتلام / سرعت انزال

### Seminal Emission/Ejaculation

(See spermanorrhoea also)

احتلام سے مراد رات کو خواب کے ساتھ منی کا اخراج ہے۔ ایک صحتمند آدمی کو مینے میں ایک یا دو مرتبہ ایستادگی کے ساتھ اخراج منی ہو جانے میں کوئی حرج نہیں اور اس سے کسی قسم کی تھکن کمزوری اور لاغری نہیں ہوتی۔ مگر اکثر یا بہت مرتبہ احتلام ہونا مرض کی علامت ہے جس کے نتیجے میں چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں۔ بھوک نہیں لگتی۔ سانس پھولنے لگتا ہے۔ غرض یہ کہ ذہنی اور جسمانی طور پر مریض کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس مرض کے اسباب مشت زنی، پراگندہ خیالی، فحش لڑچکر کا پڑھنا، بری صحبت میں بیٹھنا، مسالے دار اور گرم اشیاء زیادہ استعمال کرنا وغیرہ ہیں۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ لیموں کی رنگت کا سا اخراج۔  
 ہرا برازیل 30 یا 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ سرخ بھورے رنگ کا اخراج۔  
 فلورک ایسڈ 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ مباشرت کے دوران ناکامی اور اخراج۔  
 گریفائٹس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ



☆ اچانک اور ایک دم اخراج۔

فاسفورس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ دودھیا اور بدبو والا اخراج۔

لکے سس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ رات کے وقت خون ملا اخراج۔

مرکیورس سال 200، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ ایستادگی درد بھری، ایستادگی سے پہلے ہی اخراج۔

سلفر 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ غیر معمولی یا بغیر بدبو کا اخراج۔

سینیم 30 یا 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ مباشرت کے دوران ٹھنڈا اخراج۔

نیزم میور 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ یسار اخراج۔

شیفی سیکریا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ جلدی یا دیر سے اخراج۔

کلکریا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ بہت جلدی یا مشکل سے اخراج۔

زکیم میٹلیکم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ جھاگ دار اخراج۔

میورک ایسڈ 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ بای پیٹاب کی طرح کا اخراج۔

نیزم فاس 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

## جنسی خواہش (مردانہ)

### Sexual Desire (Male)

جنسی خواہش ہونا انسانی جبلت میں شامل ہے لیکن اس کا ضرورت سے زیادہ یا غیر معمولی ہونا یا کمزور یا بالکل نہ ہونا مرض کی علامت ہے۔ جنسی خواہش کی نوعیت اور کیفیت اور اس کے بڑھنے گھٹنے کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ تاہم عام حالات میں جنسی خواہش میں اعتدال ہونا چاہئے۔

#### علامات 'دوا اور طاقت' دورانہ

- ☆ شدید جنسی خواہش۔ پانی سے خوف کھائے۔
- ☆ صبح کے وقت شدید جنسی خواہش ہو۔
- ☆ لائسن 200 یا 1M ہفتہ وار 'تین مرتبہ
- ☆ انٹم کروڈم 200 یا 1M ہفتہ وار 'تین مرتبہ
- ☆ ہریان کے دوران زیادہ جنسی خواہش ہو۔ اندھیرے سے ڈر گئے۔
- ☆ سٹرامونیم 200 یا 1M ہفتہ وار 'تین مرتبہ
- ☆ جنسی خواہش کم ہو جائے یا بالکل نہ رہے۔
- ☆ لائیگلوپوڈیم 200 یا 1M ہفتہ وار 'تین مرتبہ
- ☆ شدید جنسی خواہش ہو۔ کنٹرول نہ کر سکے۔ کانپنے لگے۔
- ☆ پلائینا 200 یا 1M ہفتہ وار 'تین مرتبہ
- ☆ شدید جنسی خواہش ہو جس کی وجہ سے خیمہ میں خلل پیدا ہو۔
- ☆ کیسترس 200 یا 1M ہفتہ وار 'تین مرتبہ
- ☆ نفسانی خواہش بڑھانے والی چیزیں اور تصویریں دیکھنے سے جنسی خواہش بڑھے۔
- ☆ نیرنولا 200 یا 1M ہفتہ وار 'تین مرتبہ

☆ پٹھوں میں کھچاؤ والے مریض میں جنسی خواہش زیادہ ہو۔

ورائرم ورائنڈ 200 یا 1M ہفتہ وار  
تین مرتبہ

☆ شدید جنسی خواہش ہو اور آسانی سے جذباتی ہو جائے۔

زکم میٹلیکم 200 یا 1M ہفتہ وار تین  
مرتبہ

☆ بہت زیادہ جماع کرنے کے بعد بھی شدید جنسی خواہش ہو۔

فاسفورک ایسڈ 200 یا 1M ہفتہ وار  
تین مرتبہ

☆ جنسی بے راہ روی کی وجہ سے خواہش کم ہو جائے۔

ٹیننی سیکریا 200 یا 1M ہفتہ وار تین  
مرتبہ

☆ بچوں یا بوڑھوں میں شدید جنسی خواہش ہو۔

برٹا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار تین  
مرتبہ

☆ سخت اور شدید ابستادگی کے ساتھ بہت زیادہ جنسی خواہش۔

فلورک ایسڈ 200 یا 1M ہفتہ وار  
تین مرتبہ

☆ بغیر ابستادگی شدید جنسی خواہش۔

کیلیدیم 200 یا 1M ہفتہ وار تین  
مرتبہ



# ایستادگی / مباشرت

## Erections & Coition

(See the male ailments also)

سخت ایستادگی قوت مباشرت کی علامت ہے۔ اگر اس میں کوئی نقص ہو تو مرد کو سخت شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ جلق اور کثرت مجامعت وغیرہ کی وجہ سے انتشار اور ایستادگی میں کمی آجاتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ کھڑے ہوئے ایستادگی ہو۔ درد ہو۔ مباشرت کے بعد درد۔  
ایسڈ فاس 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ پیشاب روکنے کے ساتھ ایستادگی ہو جائے۔  
کالوسنٹھ 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ
- ☆ جب بیٹھا ہو تو ایستادگی ہو جائے۔  
کینابلس انڈیکا 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ
- ☆ نامکمل ایستادگی۔ مباشرت کے دوران۔ مباشرت کی خواہش کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔  
لائکوپوڈیم 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ
- ☆ موٹے، پلپے اور ٹھنڈ محسوس کرنے والے مریض کو ایستادگی کی ضرورت ہو۔  
گلکیریا کارب 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ
- ☆ خواب میں احتلام کے بعد ایستادگی۔  
ٹائٹریک ایسڈ 200 'ہفتہ وار' تین مرتبہ



☆ رات دن ایستادگی۔ رات کو مباشرت کے دوران نامکمل ایستادگی۔ جبکہ خواہش شدید ہو زبردست ایستادگی۔

فاسفورس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ ٹھنڈے کمرے میں غلی حالت میں زبردست ایستادگی۔

لالسن (Lyssin) 200 یا 1M 'ہفتہ وار'  
تین مرتبہ

☆ صبح کے وقت زبردست ایستادگی۔ مباشرت کے دوران اعضاء متاسل ڈھیلا پڑ جائے۔

نکس و امیکا 0 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ ایستادگی کی کپکپی اور شدید خواہش کے ساتھ۔ یا تاخیر سے ایستادگی۔ ایستادگی کی ضرورت۔

برٹا کارب 200 'ہفتہ وار' چھ مرتبہ

☆ زبردست ایستادگی۔ غصیہ مریض۔ دوسروں کو حقیر سمجھنے والا۔

پلاٹینم 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ پیشاب کرنے کی حاجت کے ساتھ ایستادگی۔

رہس ٹاکس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ بہت زیادہ جذبات۔ ایستادگی درد کے ساتھ۔

کینابیس سیوا 200 یا 1M 'ہفتہ وار'  
تین مرتبہ

☆ خیند کے دوران سخت 'زبردست اور بہت ایستادگی۔

فلور ایسڈ 200 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ ایستادگی کمزور۔ عضو ٹھنڈا اور ڈھیلا۔ خواہش ختم ہو گئی ہو۔

اکس کاسٹس 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'

☆ صبح کے وقت ایستادگی۔

امونیم کارب 200 'چھ گھنٹے بعد'

☆ چلنے پر ایستادگی۔ مباشرت کے دوران درد۔

بیبیر سلف 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'

☆ رفع حاجت کرتے ہوئے بغیر جنسی خواہش کے ایستادگی۔

تھوجا OC 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ صرف نیم خوابی میں ایستادگی۔ ایستادگی کی کمی۔

کیلاڈیم (Caladium) 30 یا 200  
چھ گھنٹے بعد

☆ مباشرت کے بعد ایستادگی۔

☆ دوران مباشرت نامکمل ایستادگی۔ دیر سے ایستادہ ہو۔ پاخانہ قبض کے ساتھ۔ مریض موٹاپے کی طرف راغب ہو۔

گرفائش 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ نفسانی خواہشات سے متعلق سوچتے ہوئے ایستادگی۔ زبردست اور سخت ایستادگی سر درد کے ساتھ۔

بکریک ایسڈ 30 چار گھنٹے بعد

☆ جب مباشرت کی سعی کرے تو ایستادگی ختم ہو جائے۔

ارجنٹم نائٹرکیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ بار بار ایستادگی۔ پروٹیٹ غدود کی رطوبت کے بغیر۔

ہلسٹیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ درد کے ساتھ ایستادگی۔ رات کے وقت بہت زیادہ جاگنے کے دوران سخت اور زبردست ایستادگی۔

کیٹھرس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ خضیوں کے ٹھنڈے ہونے کے ساتھ ایستادگی۔

کیسی کم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ معاون دوا۔

سورینم 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ



# اعضاء تناسل کی خارش / کھجلی

(مردانہ / زنانہ)

Pruritus

Itching of genital organs

(See itching also)

مردانہ اعضاء تناسل پر اور عورت کی شرمگاہ میں بعض دفعہ شدید خارش ہوتی ہے۔ مردانہ اعضاء تناسل کے مختلف حصوں پر کھجلی کے ساتھ سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ میں کھجلی سے کلیٹورس پر رگڑ لگنے سے بعض اوقات جماع کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ بعض دفعہ خارش اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریضہ کھجکا کھجکا کر کھال چھیل لیتی ہے۔

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ مقعد کی خارش اور جلن۔ اعضاء تناسل کی خارش / کھجلی۔  
امونیم کارب 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ فرج کے بیرونی حصے پر شدید کھجلی اور اندام نہانی کے اندر تک حیض کے فوراً بعد زیادہ ہو جائے۔  
کونیم میک 30 یا 200، چار گھنٹے بعد
- ☆ بایس خصیت الرحم میں چھین۔ اندام نہانی میں بھرے پن کے احساس کے ساتھ کھجلی۔  
تین مرتبہ  
یلیم ننگ 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ اعضاء تناسل کے بال جھڑنا شروع ہو جائیں۔ کھجلی اور سوجن شرمگاہ اور فرج میں جلن ہو جائے۔  
ٹائٹرک ایسڈ 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ فرج کے بیرونی حصے پر کھجلی۔ بیرونی اعضاء تناسل پر گومڑ سے یا پیپ دار پھنسیاں۔  
انٹیم ٹارٹ 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ فرج کے اوپر پھنسیاں۔ مریضہ جب بستر میں گرم ہو جائے تو اس پر کھجلی شروع ہو جائے۔  
۱۔ تیموزا 30، چار گھنٹے بعد

☆ مردانہ عضو مخصوص پر کھجلی خاص طور پر اس پٹھے اور رگ کے اوپر جو کسی عضو کی حرکت کو روک دے۔ سر ذکر پر کھجلی۔ فرج پر کھجلی۔ معمولی سی چوٹ پکنے لگے۔

ہیپر سلف 30' چار گھنٹے بعد

☆ مقعد کی خارش۔ مقعد کے اندر اور ارد گرد کھجلی اور سیون پر بھی کھجلی ہو۔

فلورک ایسڈ 30' چار گھنٹے بعد

☆ آلہء تناسل کے اس حصے کے اوپر کھجلی جو بالوں سے بھرا رہتا ہے۔

ایفورنیم 30' چار گھنٹے بعد

☆ گھونٹھٹ کے اوپر اور اندرونی حصے کے اندر کھجلی۔ رات کے وقت زیادہ ہو۔ حیض میں دیر ہو جائے۔ ٹھنڈے پانی سے دھونے سے بہتر ہو۔

ہلساٹیل 30 یا 200' چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ دوران حیض شدید کھجلی۔ جو مشت زنی پر مجبور کر دے۔ ایسی مریضہ جس کے پاؤں میں چلبلاہٹ ہو۔

زکیم میٹلیکم 30' چار گھنٹے بعد

☆ فرج میں چھن اور کھجلی۔ ایسی عورت کے لئے جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور اسے جلدی جلدی پیشاب کی حاجت ہو۔

ٹینیفی گیکریا 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ اندام نہانی میں کھجلی۔ پھولے ہوئے سے۔ گرم اور سرخی اور کھجلی۔ اندام نہانی کا ہونٹ سو جا ہوا اور وہی کی طرح سفید مادے سے ڈھکا ہوا۔

ہیلومیاس 30' چار گھنٹے بعد

☆ فرج کے بیرونی حصہ پر کھجلی۔ خضیوں پر کھجلی۔ فرج کے ہونٹ پر درم۔ دوران حمل فرج پر سخت خارش۔

ایبرا 30 gr' چار گھنٹے بعد

☆ خضیوں پر کھجلی جس کو کھجانے کے باوجود آرام محسوس نہ ہو۔

میوریک ایسڈ 30' چار گھنٹے بعد

☆ مقعد پر کھجلی۔ سونے کے بعد زیادہ ہو جائے۔

لیکے سس 30' چار گھنٹے بعد

☆ فرج کی خارش خاص طور پر مشت زنی سے۔ مرض کی ابتدا پر شدید جنسی خواہش کے ساتھ۔



کیسٹرس 30 چار گھنٹے بعد

☆ خضیوں اور اعضاء تناسل کے اگلے حصے پر شدید خارش۔ چلتے ہوئے اور زیادہ ہو۔ زنانہ اعضاء کی شدید کھجلی جو رات کے وقت بڑھ جائے۔ ہلکے ہلکے کھجلائے سے بہتر محسوس ہو۔

کروٹون نک 30 چار گھنٹے بعد

☆ دن کے دوران گرمی کے وقت ڈنک لگنے کی سی خارش۔ مقعد میں دانے نکل آئیں۔ جن کو چھونے سے بھی تکلیف ہو۔ گھونگھٹ کی اندرونی سطح پر کھجلی۔

لائیکو پوڈیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ خضیوں میں رانوں کے درمیان کھجلی۔ سیوں پر کھجلی۔ شدید کھجلی کے ساتھ زنانہ اعضاء مخصوصہ پر درم اور نمی۔

پزولیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ اندام نہانی اور فرج پر شدید کھجلی۔ ان حصوں پر گرمی اور خشکی کے ساتھ رات کے وقت تکلیف بڑھے۔

ٹیرنولا ہسپانیہ چار گھنٹے بعد تین مرتبہ

☆ ٹھنڈ سے تکلیف میں اضافہ ہو اور گرمی سے افادہ۔ کھجلی کی نسبت سرسراہٹ یا چیونٹیاں ریگنے کا سا احساس زیادہ ہو۔

ریوکس C 30 چار گھنٹے بعد

☆ فرج کی خارش مسوں کے ساتھ۔ ضدی قسم کا قبض درد عیش کے دوران یا دوران حمل۔ لیٹنے پر تکلیف میں اور اضافہ ہو۔

کولن سونیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ اگر کھجلیا جائے تو کھجلی کے ساتھ سوجن بھی ہو۔ مردانہ اعضاء تناسل پر خارش۔ اگلے حصے کی نوک پر خارش خضی کے بائیں جانب نمک کی طرح کی کھجلی۔

انٹم کروڈم 30 چار گھنٹے بعد

☆ فرج کی کھجلی کثیر لیکوریے اور جنسی اشتعال کے ساتھ۔

ہائڈراسٹس کین 30 چار گھنٹے بعد

☆ خضیوں اور اعضاء تناسل پر کھجلی جو کہ مقعد تک پھیلے۔ بیٹھے ہوئے زیادہ ہو۔ حرکت اور کسرت سے بہتر ہو۔

میگنسیا میور 30 چار گھنٹے بعد

☆ خضی کے منہ پر کھجلی۔ اندام نہانی پر کھجلی مقعد خضیوں اور کاندھوں پر کھجلی۔

ایلو مٹا 30 چار گھنٹے بعد

☆ مقعد پر کھجلی جو کہ سو جا ہوا محسوس ہو۔ زنانہ اعضاء مخصوصہ کے کسی حصے پر کھجلی۔

بچے میلس 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ اندرونی یا بیرونی فرج میں چیجن اور کھجلی۔

فلکیریا 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد ' تین مرتبہ

☆ فرج اور ہونٹ کے درمیان سوجن اور کھجلی۔

کریا زوٹم 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ بڑی آنت کے نچلے حصے پر کھجلی۔ رات کے وقت مقعد سے باہر کیڑوں کی سی سرسراہٹ۔

فیرم میٹلیکم 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ خضیوں اور ران کے درمیان کھجلی اور نمی اور سوجن۔ پیلی رنگت کے لیکوریے کی وجہ سے کھجلی۔ زنانہ اعضاء کے بیرونی حصوں پر کھجلی کے ساتھ بال گرنے لگیں۔

نیرم میور 12x یا 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ مقعد اور سیون میں ریگنے کے احساس کے ساتھ کھجلی۔ مقعد میں چیجن اور کھجلی۔ خضیوں اور اعضاء تاسل کے اگلے حصے میں سرسراہٹ۔

چیلی ڈونیم 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ بیرونی ہونٹ پر ہلکی سی کھجلی اور جلد چھلتا۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہو کہ کوئی جاندار چیز رینگ رہی ہے۔

لیک کینم 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ مقعد کی خارش نمی کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے چھالے بننے کے رجحان کے ساتھ۔ فرج کے اندر کھجلی۔ حیض سے پہلے تکلیف میں اضافہ ہو۔

گرفائٹس 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ رات کے وقت کی شدید کھجلی جو مریض کو کھجانے پر مجبور کر دے جس کی وجہ سے سونہ سکے۔

آیوڈیم 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ مقعد میں شدید کھجلی کی وجہ سے مریض سونہ سکے اور تمام رات کروٹیں بدلتا رہے۔ بعض اوقات باریک کیڑوں کی وجہ سے۔

ٹیوکریم (Teucrium m.v) 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ قلت حیض کی وجہ سے۔ دوران حمل۔ پھنسیاں۔ شدید خارش۔ بٹیا (نپل) کے آس پاس رطوبت ہے۔ بستر اور گرمی سے تکلیف بڑھے۔ مریض اس حد تک کھجائے کہ خون نکل آئے جس سے سکون ہو۔

سورنیم 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ رحم کے اندر کھجلی۔ فرج پر خارش۔

پلیٹینا 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ کھجلی جلن کے ساتھ۔ بستر میں اور شام کے وقت تکلیف میں اضافہ ہو۔ کھجانے کے بعد اور زیادہ تکلیف بڑھے۔

سلفر 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

بایو کبی نیشن نمبر 20 ہر چار گھنٹے بعد دینا بھی بہت مفید ہے۔



# خصیوں کی سوزش

## Orchitis

(See Hydrocel also)

اس مرض میں ماؤف خصیہ میں سوزش کی وجہ سے درم ہو جاتا ہے اور خصیہ سخت ہو جاتا ہے۔ جبکی وجہ سے شدید درد اور ٹیسس اٹھتی ہیں جو کمر، پیٹ اور رانوں تک جاتی ہیں۔ جی متلاتا ہے اور ابکیاں آتی ہیں۔ بخار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مرض سوزاک، آتھک، سنگ مثانہ، سوزش مثانہ، کن پڑے اور گلموے کے باعث ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ خبیے سخت اور بڑھے ہوئے۔ رگڑ یا خراش کی وجہ سے سوزش۔  
کوئیم 200 یا 1M 10 منٹ بعد، تین مرتبہ
- ☆ اکڑے ہوئے اور سوزشی خبیے۔ کھینچنے والے درد ہوں۔  
پیشیا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد
- ☆ سوزاک کے دب جانے کے بعد کی شکایات۔ منی کی نالی میں درد کی شکایت کے ساتھ۔  
سپانجیا کوشا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ دائیں خبیے کے نچلے حصے میں سوجن اور درد۔  
ار جٹم ٹائٹرکیم 30 یا 200، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ خصیوں میں سوزش اور منی کی نالی میں درد بھری کھچاوت۔  
ٹائٹرک ایسڈ 30 یا 200، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ خشک ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے خصیوں کی حاد تکلیفات۔  
اکونائٹ 30 یا 200، چار گھنٹے بعد
- ☆ خبیے بہت زیادہ سخت اکڑے ہوئے۔ خراشدار درد۔ خصیوں کی قھیلی یا بیضہ دانی کے دائیں نصف حصے میں سوجن۔  
کیمیشس 30، چار گھنٹے بعد



- ☆ چہرے پر تہمتا ہٹ۔ درد اچانک شروع اور اچانک ختم ہو جائے۔  
 بٹلا ڈونا 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ خضیوں کی مزمن سوزش۔ ایسا لگے کہ خضیوں کو بھینچا یا دبایا جا رہا ہے۔ طوفان اور گرج  
 چمک کے دوران تکلیفات میں اضافہ ہو۔

رہوڈنڈرون 200 یا 1M '10 منٹ

بعد 'تین مرتبہ

- ☆ خضیوں اور ریڑھ کی ہڈی میں کھینچنے والے درد۔ خضیوں اور منی کی ٹالی سخت اکڑی ہوئی  
 اور سوجی ہو جس پر چمکدار سرخی ہو۔

مرک سال 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x اور کالی میور 6x بھی مفید ادویات

ہیں۔

دیگر اہم ادویات : نکس دامیکا 'فاسٹولا کا' لائیگو پوڈیم  
 ہلسٹیلٹا 'آرنیکا' اورم میور نیڑم اور اورم میٹلیکیم وغیرہ۔

## خضیوں کی تھیلی میں پانی آ جانا

### Hydrocele

(See Orchitis also)

اس میں فوطوں کے پردوں کے اندر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور فوطے بتدریج بڑھ جاتے  
 ہیں۔ لیکن عام طور پر درد نہیں ہوتا البتہ بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ مرض کی تشخیص کے لئے فوطوں  
 کے ایک جانب چراغ رکھ کر دیکھا جائے تو دوسری جانب روشنی نظر آتی ہے گویا ہائیڈروسل سے  
 روشنی گذرتی ہے۔ اگرچہ بذریعے سوئی فوطے سے پانی نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات پھر  
 سے پانی بھر جاتا ہے۔ لہذا اکثر اوقات آپریشن کر کے پانی نکال دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ مرض  
 دوبارہ نہیں ہوتا ہے۔

### علامات 'دوا اور طاقت' دورانیہ

- ☆ خبیثے بھاری اور سوجے ہوئے۔ بڑھے ہوئے اور سخت۔ خاص طور پر کسی چوٹ کے بعد۔  
 کوئیم میک 200 یا 1M 'ہفتہ وار' چھ  
 مرتبہ

- ☆ جلدی بیماریوں کے ساتھ خضیوں کی تھیلی یا ریزہ میں پانی آجائے۔ قبض بھی ہو۔  
 گریفائٹس 200 یا 1M ہفتہ وار چھ مرتبہ
- ☆ خضیے سخت۔ سوچے ہوئے اور نرم۔ فوطوں میں چھین یا ٹانگے۔ کسی چوٹ کی وجہ سے سوئی کے چھینے کا سادرد۔
- آرنیکا مونٹ 200 یا 1M ہفتہ وار چھ مرتبہ
- ☆ سستی۔ ایسے لگے کہ اس کو ہمیشہ چلنا چاہئے۔ چلنے سے درد کم ہو۔  
 ایسڈ فلور 200 یا 1M ہفتہ وار چھ مرتبہ
- ☆ دماغ میں مایوسی اور غمگینی۔ خضیوں کی لاغری۔ دائیں خضیے میں سوجن اور شدید درد۔ ایسا لگے جیسے خراشیں لگی ہوں۔  
 اورم میٹلیکم 200 یا 1M ہفتہ وار چھ مرتبہ
- ☆ خضیے ٹنک جائیں۔ بایاں خضیہ زیادہ ٹنکا ہو۔ چیرنے والا درد۔ سوزش اور ورم۔ پیدائشی طور پر ایسا ہو۔  
 ہلماٹلا 200 یا 1M ہفتہ وار چھ مرتبہ
- ☆ چپکے ہوئے خضیے۔ لیٹنے کے بعد اور رات کو تکلیف بڑھے۔ منی کی نالی میں دباؤ۔ نیچے کو لٹکے ہوئے خضیے۔  
 سلیسیا 200 یا 1M ہفتہ وار چھ مرتبہ
- ☆ خضیوں کا اکڑا ہونا یا سخت ہونا۔ خاص طور پر لڑکھن میں۔  
 سلفر آئیوڈینم 3x یا 6 چار گھنٹے بعد
- ☆ منی کی نالی کے مقام کے ساتھ دائیں خضیے میں درد بھرا کھپاؤ۔ بیٹھے ہوئے سوئی کی سی چھین محسوس ہو۔  
 برائی اونیا البم 200 چھ گھنٹے بعد
- ☆ اوپر کو چڑھے ہوئے خضیے۔ ورم آلود۔ درد ہو اور سخت ہوں۔ دائیں جانب زیادہ تکلیف ہو۔ طوفان سے پہلے اور ٹھنڈ میں تکلیف بڑھے۔  
 رہوڈینڈرون 200 یا 1M ہفتہ وار چھ مرتبہ
- ☆ سلفر 200 یا 1M پندرہ سوئیں روز تین مرتبہ
- ☆ معاون دوا۔  
 بائو کیمک کی ٹکیریا فلور 6x چار گھنٹے بعد دینا بھی مفید ہے۔

# آتشک

## Syphilis

آتشک ایک متعدی مرض ہے جو کہ چھوت لگنے آتشکی مادہ جسم میں سرایت کرنے یا موروثی طور پر والدین سے منتقل ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ بیماری پہلے سے متاثرہ مرد یا عورت کے ساتھ مجامعت کرنے سے لگتا ہے لیکن بعض دفعہ مریض کے کپڑے پہننے سے اس کا جھوٹا کھانے پینے سے بھی لگ جاتا ہے۔ جسم میں آتشکی مواد داخل ہونے کے بعد ایک زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ مردوں میں عموماً "سپاری (غلغلہ) کے اوپر مستورات میں اندام نہانی کے لبوں کے اندر کی طرف یا رحم اور پیشاب کی نالی میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات لبوں، پستان کے منہ، انگلی، جسم یا کسی حصے پر جہاں آتشکی زہر سرایت کر گیا ہو ایسا زخم ہو جاتا ہے۔ آتشک کے ابتدائی مرحلے میں زہر جسم میں داخل ہو جانے کے بعد ایک زخم پیدا ہوتا ہے۔ بعد ازاں زخم میں خراش آنے سے پیپ آنے لگتی ہے اور جہاں یہ پیپ لگتی ہے وہاں زخم پھیلتا جاتا ہے اور زہر خون میں سرایت کر کے تمام جسم میں پھیل جاتا ہے۔ آلہ تناسل اور سپاری گل سز جاتی ہے۔ جنگالہ کے غدود متورم ہو جاتے ہیں جو پھٹ کر زخم بن جاتے ہیں۔ اس کا زخم گہرا ہوتا ہے۔ جس کے نتیجے میں مواد کا اخراج، عضو ماؤف، سخت سوجن، ہڈیوں، جوڑوں اور گوشت میں دردیں ہونے لگتی ہیں۔ غرض یہ کہ تمام عضلات جسم متاثر ہوتے ہیں اور مریض گھٹنے لگتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ جب آتشک کے زخم کو ذرا سا چھونے سے بھی تکلیف ہو۔ زخم سے آسانی سے خون بننے لگے۔ زخموں سے پتھر کی سی بدبو والی رطوبت خارج ہو۔ چبھنے اور چھیلنے والا درد ہو۔  
ہیبر سلف 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد
- ☆ جب کافی عرصے سے آتشک کا زخم اور ران کے غدود کا ورم سخت اور اکڑا ہوا ہو۔ غدود سوجے ہوئے ہوں۔ مسوڑھے سوجے ہوئے اور نرم اور پلپے ہو گئے ہوں۔  
مرک بن آیوڈیم 3x یا اوپر کی طاقت چار گھنٹے بعد
- ☆ مریض بہت زیادہ لاغری اور کمزوری محسوس کر رہا ہو۔ رطوبات بہ رہی ہوں۔ مریض کھلی ہوا یا پٹکھے کی ہوا کی خواہش کرے۔  
کاربوج 30 یا 200 چار گھنٹے بعد



☆ جب آتشک کا زخم تیزی سے پھیل رہا ہو اور خراشدار رطوبت اور پیپ خارج ہو۔ یہ رطوبت پھیل کر دوسرے حصوں کو متاثر کر رہی ہو۔

مرک کار 30 یا 200، چار گھنٹے بعد  
☆ ابتدائی یا دوسرے مرحلے میں جبکہ زخم سخت ہو۔ زخم گہرائی میں پھیل رہا ہو۔ آسانی کے ساتھ خون جاری ہو جائے۔ پیلے رنگ کی بدبودار رطوبت خارج ہو۔ ناک کا مزمن نزلہ۔ ناک کی ہڈیاں ورم آلود اور درد بھری ہوں۔ ناک سے سبزی مائل تیز مادہ خارج ہو۔

مرک سال 30 یا 200، چار گھنٹے بعد  
☆ شدید تکلیف کے کیسوں کے لئے جبکہ آتشک کا گھاؤ رسولی کی شکل اختیار کر لے اور اعصابی بافتوں کو متاثر کرنے لگے۔ زخموں کے کنارے سخت ہو جائیں۔ جن میں سے دہی کی مانند پیپ خارج ہو۔ ہڈیوں میں شدید درد ہو۔ رات کے وقت تکلیفات میں اضافہ ہو۔  
کالی آیوڈیم 200 یا بڑی طاقت، چھ گھنٹے

بعد

☆ جب مرک سال موثر نہ ہو۔ زخم بڑھ جائے اور بو آنے لگے۔ جب بیرونی سطح اور زخموں کے کنارے ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں اور کچے گوشت کی طرح کے نظر آنے لگیں۔ لیکن مرک سال کے زخموں کی نسبت زیادہ گہرے ہوں۔ زخم چھونے سے بھی ذکی الحس ہوں۔ زخم میں انگور یا دانے بن جائیں۔ ذرا سا بھی چھونے سے خون رسنے لگے۔ مرہم پٹی کرنے سے بھی خون نکلنے لگے۔ اور تیز پیشاب سے بھی زخم چھل جائیں۔

ٹائٹریک ایسڈ 30 یا 200، چھ گھنٹے بعد  
☆ جب آتشک کے زخم بہت زیادہ ذکی الحس ہو جائیں۔ حتیٰ کہ مرہم پٹی کا لگنا تک ناقابل برداشت ہو جائے۔ گوڑا اور ناسور بن جائے۔ زخم سڑ جائے۔ زخم کے گرد چوٹ کے سے نیلے رنگ کے دھبے پڑ جائیں۔

لیکے سس 30 یا 200، چھ گھنٹے بعد  
☆ چڈے کے غدودوں کے ورم کے ساتھ بغیر درد کے زخم ہوں۔ آتشک کے دوسرے مرحلے کے علاج کے لئے۔

مرک پوٹو آیوڈیم 3x یا بڑی طاقتیں،  
چار گھنٹے بعد



☆ مردہ یا کامل بغیر درد کے آتشکی زخم۔ ٹانگوں پر زخم ہوں جو آسانی سے مندل نہ ہوں۔  
سر پر تانبے کی سی رنگت کے دانے نکل آئیں۔

کاربووتیج 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ معاون دوا۔

سفیلنم 200 یا 1M پندرہویں روز

تین مرتبہ

بائیو کیمک کی کالی میور 3x اور سلیسیا 30x بھی مفید ادویات  
ہیں۔

دیگر اہم ادویات : آسفوڈا، آرم میٹلیکم، اناکارڈیم،  
سنبیرس، آرسنک البم، فاسٹولاکا، کاربو این، بڈیاگا وغیرہ۔



# سوزاک

## Gonorrhoea

سوزاک ایک متعدی مرض ہے۔ یہ مرض اکثر سوزاک میں مبتلا عورتوں سے مردوں کو لگتا ہے یا ایسی مستورات سے جن کی اندام نہانی میں سوزاکی مادہ موجود ہو۔ اس مرض میں پیشاب کی نالی (نازہ یا یور تھرا) میں ورم آجاتا ہے اور پیپ آنے لگتی ہے۔ یہ مرض چھوت لگنے سے چوبیس گھنٹے سے لے کر پانچ چھ دن تک ظاہر ہوتا ہے اور بعض دفعہ ظاہر ہونے میں اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ شروع میں آلہء تناسل کے خشفے میں خراش ہوتی ہے پیشاب دقت سے ہوتا ہے۔ پیشاب کی نالی کا منہ سرخ ہو جاتا ہے۔ مقام جنگالہ اور فوطوں میں کھچاوت اور درد ہوتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے۔ ورم اور جلن زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ درد کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ شروع میں پیپ تھوڑی اور یسہار نکلتی ہے اور کپڑے پر داغ پڑ جاتا ہے۔ سپاری متورم اور سرخ ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت خیزش کا وجہ سے شدید درد ہوتا ہے۔ سوزش کی وجہ سے پیشاب کی نالی تنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب درد کے ساتھ اور جلن سے ہوتا ہے۔ اس مرض کی وجہ سے مٹانے اور منی کی تھیلیوں اور نوسوں میں ورم اور درد ہوتا ہے۔ ہلکا سا بخار بھی ہو جاتا ہے۔ سوزاک پرانا ہو جائے تو جوڑوں میں درد ہونے لگتی ہے۔

بعض دفعہ یہ مرض مسلسل جلق کی عادت کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض جوان لڑکے منی ضائع نہ کرنے کے خیال سے احتلام کے وقت آلہء تناسل دبا کر اخراج روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے نازہ میں منی کا مواد جمع ہونے اور خراش ہو جانے سے بھی سوزاک پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس مرض کا بروقت اور صحیح طور سے علاج نہ کرانے کی صورت میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس مرض کے رفع ہو جانے تک مباشرت نہیں کرنی چاہئے۔ بصورت دیگر بیوی کو بھی یہ سوزی مرض لگ سکتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ خشفے میں جلن اور سوزش۔ پیشاب گدلا اور سرخی مائل۔ پیشاب کے بعد جلن ہو۔ پیشاب جلد جلد آئے۔

کالی بائی کروم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ سوزاک کا دوسرا مرحلہ۔ پہلے ٹھیک ہونے کے بعد پھر سوزاک ہو گیا ہو۔ نامردی اور کمزوری۔

ایگنس کاسٹس 200 ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ گٹھیاوی شکایات۔ پتلی سبزی مائل رطوبت خارج ہو۔ پیشاب کے دوران چر کے لگیں۔  
جلن ہو۔

☆ تھوچا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ  
دبایا ہوا سوزاک۔ رطوبت پھر سے خارج کرنے اور دبائے جانے کے اثرات بد ذاکل  
کرنے کے لئے یا سائیکوٹک میازم کے لئے۔

☆ میڈورینم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین  
مرتبہ

☆ پیشاب شروع کرنا یا نکالنا دشوار ہو۔ پیشاب کے دوران جلن اور چر کے لگیں اور دھار  
بعد میں نکلے۔

☆ پیمافیل (Chimaphilla Umb)

☆ یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ پیشاب میں خون آئے۔ پیشاب کرنے کی مسلسل حاجت محسوس ہوتی رہے۔ شدید قسم  
کی جلن اور سوزش۔ جنسی جوش۔

☆ کیسٹرس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ پیشاب سفید۔ سرخی مائل۔ پیشاب رکے۔ پیشاب سے کھال چھلنے لگے۔

☆ سلفر 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ پیشاب کے بجائے خون زیادہ خارج ہو۔ ورم مٹانہ۔ مٹانہ اور پیشاب کی تالی میں شدید  
درد۔

☆ ٹائٹریک ایسڈ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ مٹانہ کے سوراخ کا ششخنی طور سے بند ہو جانا۔ دوران پیشاب جلن اور کٹن۔ بار بار  
پیشاب کی حاجت ہو۔

☆ کینابس شائیوا 200 یا 1M ہفتہ وار،

تین مرتبہ

☆ دوران پیشاب کانٹے والے درد۔ سوزاک دبائے جانے کی وجہ سے کثرت سے پتلی  
رطوبت خارج ہو۔ تیزابی پیشاب میں خون کی آمیزش۔

☆ ہلسٹیل 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ ہائیو کیمک کی فیرم فاس 6x کالی میور 6x۔ نیزم فاس 6x اور  
سلیسیا 30x چار گھنٹے بعد دینا مفید ہے۔

# نامردی

## Impotency

اس مرض میں قوت مجامعت کمزور ہو جاتی ہے۔ شہوت بالکل نہیں ہوتی یا پورے طور پر نہیں ہوتی۔ جماع کی رغبت ختم یا بہت کم ہو جاتی ہے۔ ایستادگی کمزور ہوتی ہے یا جذبات میں انہیخت نہیں ہوتی۔ آلات تناسل ڈھیلے ڈھالے اور ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

مشت زنی، کثرت مباشرت، کثرت احتلام اور جریان منی، خبیوں یا عضو تناسل میں کوئی پیدائشی نقص، آتشک، سوزاک، مثاپہ، جسمانی کمزوری، منشیات کا بہت زیادہ استعمال وغیرہ نامردی کے عام اسباب ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ کسی قسم کی چوٹ لگ جانے سے قوت مردی جاتی رہے۔  
آرنیکا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ جنسی افعال میں زیادہ ملوث ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جائے۔  
کالی برومائڈ 30 چھ گھنٹے بعد
- ☆ خواہش اور ایستادگی نہ ہو۔ جنسی نظام کو بہتر بنانے کے لئے۔  
نیوفرلٹ (Nupher Lut) 10-5 Q  
قطرے، چار گھنٹے بعد
- ☆ جنسیات میں بہت زیادہ ملوث ہونے کی وجہ سے یا جنسی خواہشات کو دبا دینے کی وجہ سے۔ بوڑھے کنوارے لوگوں کے لئے۔  
کونیم میک 200 یا 1M پندرہویں روز، تین مرتبہ
- ☆ شدید قبض کہ کسی آلے یا انگلی کے زور سے فضلہ نکالنا پڑا۔ شہوت پرستی کے خیالات کے ساتھ نامردی۔  
سلیئم 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ کمر میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے کمزوری یا نامردی۔  
ہائپریمک 200 یا 1M پندرہویں روز، تین مرتبہ
- ☆ جلق، مشت زنی اور منی کے بہت زیادہ خارج ہو جانے کی وجہ سے۔  
ایسڈ فاس Q یا 30 چار گھنٹے بعد



☆ اعصابی کمزوری اور تھکن کی وجہ سے جنسی کمزوری۔ جنسی اشتعال اور طاقت کے لئے۔  
ڈیمیان 10-5 Q قطرے، چار گھنٹے بعد

☆ مشت زنی کی وجہ سے جنسی کمزوری۔ نیم خوابی میں ابستادگی ہو۔

☆ کیلیڈیم 30 یا 200، چھ گھنٹے بعد  
☆ خوش مزاج۔ مذاہبہ ذوق رکھنے والے لوگوں کے لئے سفلس کی وجہ سے کمزوری یا

نامردی۔  
کالی آیوڈیم 30 یا 200، چھ گھنٹے بعد

☆ بہت زیادہ احتلام ہونے کی وجہ سے کمزوری ہو جائے۔

میڈورینیم 200 یا 1M، پندرہویں روز،  
تین مرتبہ

☆ جلدی اخراج ہو جائے۔ بڑھاپے کی وجہ سے یا جوان لوگوں میں جنسی خواہش ختم ہو  
جائے۔

لائکو پوڈیم 200 یا 1M، پندرہویں  
روز، تین مرتبہ

☆ سوزاک کے دب جانے کے بعد۔ خواہش ہو اور نہ ابستادگی۔ عضو مخصوص ڈھیلا اور  
ٹھنڈا ہو۔ وقت سے پہلے بڑھاپا آجائے۔ جنسی قوت کا زیادہ استعمال۔  
اگنس کاسٹس 30 یا 200، چار گھنٹے

بعد

☆ شہوانی خیالات سے جنسی اشتعال پیدا ہو۔ بہت زیادہ منی ضائع کر دی ہو۔

چائنا 30، چار گھنٹے بعد

☆ غیر معمولی سخت اور بہت دیر تک رہنے والی ابستادگی۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے  
نامردی۔

یوہیم بینم (Yohim binum) Q  
10-5 قطرے، چار گھنٹے بعد

☆ پروٹیسٹ غدود کے بڑھ جانے یا کمزوری کی وجہ سے نامردی۔

سابل سارالوٹا (Sabal Ser) 10-5 Q  
قطرے، چار گھنٹے بعد

☆ عضو مخصوص چرمر جائے۔ شرمندہ ہو۔ جریان منی۔ جنسی افعال میں بہت زیادہ ملوث۔  
شیفنی سیکریا 30 یا 200، چھ گھنٹے بعد

☆ زیا بیٹس کے ساتھ نامردی۔

موس کس (Moschus) 30 یا 200

پندرہویں روز، تین مرتبہ

☆ خواہش بہت بڑھ جائے۔ موٹے اور پلپے لوگوں کے لئے۔ بہت زیادہ مباشرت کرنے کی وجہ سے۔

کلیریا کارب 200 یا 1M پندرہویں

روز، تین مرتبہ

☆ پہلے بہت زیادہ جنسیات میں ملوث رہنے والے جوان، جو شادی کرنے سے ڈریں۔

اناکارڈیم 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

بائیو کیمک کی کلیریا فاس 30x اور کالی فاس 30x چار گھنٹے

بعد دینا بہت مفید ہے۔



# حیض / ماہواری

## Affections of Menstruation

### پر درد حیض

(Including Dysmenorrhoea etc)

حیض میں بے قاعدگی کہ کبھی بہت زیادہ مقدار میں اور کبھی تھوڑا تھوڑا اور وقفے وقفے سے یا دیر سے شروع ہو کر مقررہ وقت سے پہلے رک جائیں۔ شدید درد کے ساتھ ہوں۔ خون کی رنگت مختلف چمکدار، بدبودار اور لوتھڑے دار ہوتی ہے۔ بعض دفعہ حیض وقت سے پہلے شروع ہو کر دیر تک جاری رہیں۔ کسی وجہ سے حیض دب جائے۔ یا تیز بہاؤ کے ساتھ اور کثیر مقدار میں خون خارج ہو۔ ایک آدھ روز حیض ہو کر رک جائے۔ پندرہویں دن حیض شروع ہو جائیں۔ حیض کے دوران پہلے یا بعد میں شدید درد ہوں۔ خراش دار اور جلن کے ساتھ حیض ہوں۔ پیشاب بار بار آئے۔ مٹی اور تے ہوتی ہے۔ مریضہ کی کمر اور لاتوں میں درد ہوتا ہے۔ عصبی کمزوری، تشنج، رکاوٹ، اجتماع خون اور درم رحم اس مرض کے عام اسباب ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ بدبودار، لوتھڑے والے، سرخ چمکدار خون والے حیض۔

بیلادونا 30، چار گھنٹے بعد

☆ ہر پندرہویں روز وقفے وقفے سے۔ کثرت سے خون۔ ایک ہفتے تک حیض جاری رہیں۔  
لہی جلدی ہو جائیں۔

سلفر 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ کثرت سے یا قلت سے ماہواری۔ صرف دن کے وقت۔ پہلی ماہواری دیر سے شروع ہو اور درد بھری ہو۔ وقفے وقفے سے اور بے قاعدہ ہو۔ لوتھڑے والا سیاہی مائل خون۔ مریضہ کی طبیعت اور مزاج میں تبدیلی آتی رہے۔ کھلی ہوا پسند کرتی ہو۔

ہلساٹیل 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ قلت سے اور درد بھرے حیض۔ بیٹھنے سے بڑھ جائیں اور چلتے ہوئے کم ہوں۔

ایومنا 30 یا 5/0

(50 millesimal) چار گھنٹے بعد

☆ بدبودار، کثرت سے اور جلدی جلدی، تھوڑا تھوڑا خون۔

ہیلوناس (Helonias) Q یا 6 چار  
گھنٹے بعد

☆ حیض دیر سے یا رکے ہوئے۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے۔ دودھ پینے کے بعد حیض  
دب گئے ہوں۔

لیک ڈی فلوریٹم (Lacdef) 200  
تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ زبان پر سفیدی جمی ہوئی۔ وقت سے پہلے اور کثیر۔ دریا یا تالاب میں نہانے کے بعد  
حیض دب جائیں۔

انٹم کروڈم 200 چار گھنٹے بعد، تین

☆ تاخیر سے قلت کے ساتھ۔ ٹھنڈ کی وجہ سے دب جائیں۔ ہاتھ ٹھنڈے پانی میں ڈالنے  
سے دب یا رک جائیں۔ چھاتیاں بڑھ جائیں۔ ماہواری کے دوران چھاتیاں ورم آلود اور  
درد بھری ہوں۔

کونیم میک 200 یا IM تین گھنٹے بعد،  
تین مرتبہ

☆ وقت سے پہلے اور کثرت سے حیض۔ رات کو لیٹنے کے دوران کافی مقدار میں۔ جلدی  
جلدی اور وقفے وقفے سے درد کے ساتھ۔ مباشرت سے اگلے روز اندام نہانی سے خون کا  
اخراج ہو۔

کریازوٹ 30 یا 200 تین گھنٹے بعد،  
تین مرتبہ

☆ درد بھرے حیض۔ ماہواری عام طور سے دیر سے ہو۔

نیوکوکس (Pneumococcus) 30  
یا 200 تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ رکے یا دبے ہوئے حیض شدید درد کے ساتھ۔ مریضہ کسی طرح کی پٹی باندھنے یا دبانے  
سے بہتر محسوس کرے۔

کالوسنتھ 200 تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ ماہواری سے پہلے چھاتیاں سوجی ہوئی اور درد بھری جو کہ حیض کے بعد ٹھیک ہو جائیں۔  
کثرت اخراج۔ ماہواری کے بعد نئے چاند پر خونی مواد جاری ہو۔ جلدی جلدی اور زوردار

بہاؤ کے ساتھ۔ جھلی دار، درد بھرے اور ڈوری یا ریشہ دار۔  
لیک کیناٹم 200 یا IM تین گھنٹے بعد،  
تین مرتبہ



☆ کثیر مقدار میں حیض۔ دیر سے یا دبے ہوئے۔ بیٹھے ہوئے زیادہ ہوں۔ بہاؤ ہو جانے کے بعد بہتر ہو۔

زکرم میٹلیکم 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ وقت سے پہلے اور کثرت سے حیض۔ کسی قسم کا محنت کا کام کرنے سے۔ لہبا چلنے سے یا سخت پاخانہ خارج کرنے سے حیض پھر سے شروع ہو جائیں۔ دو ماہواریوں کے درمیان وقفے میں بھی خون خارج ہو۔

امبرا گر۔ سیا 200 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ جوان بچیوں میں وقت سے پہلے حیض جو دیر تک جاری رہیں اور بالغ لڑکیوں میں دیر سے جاری ہوں۔ وقت سے پہلے اور کثرت سے۔ چمکدار سرخ خون۔ دیر تک کمر کا درد ہوتا رہے۔ محنت کے کام کے بعد زیادہ اور تکلیف دہ حیض۔

کلیریا فاس 12x یا 30 'تین گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ کچے اور کثرت سے حیض۔ سخت بدبودار اور تیز اور ناگوار۔ وقت سے پہلے اور گاڑھے حیض۔

کاربووٹیج 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ پستان سوجے ہوئے اور درد بھرے۔ تیز اور ناگوار حیض۔ یا بدملے کا حیض۔

☆ سورنیم 200 یا 1M 'ماہانہ' تین مرتبہ  
☆ گہرے رنگ کے اور زیادہ مقدار میں۔ کسی چوٹ لگ جانے کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو۔

ہیما میل 30 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ بدلے کا حیض۔ سرخ چمکدار خون۔ مریضہ برف کی مانند ٹھنڈی چیزیں پسند کرے۔

فاسفورس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ ہر دو ہفتے کے بعد یا چند دنوں کے بعد حیض ہو جائے اور ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ ہوتا رہے۔ تیزی سے نکلنے والا زیادہ مقدار میں خون۔ محنت کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔

میڈورنیم 200 یا 1M 'ماہانہ' تین مرتبہ

☆ ماہواری دیر سے ہو خاص طور پر پہلی ماہواری۔ بے قاعدہ اور درد بھری اور مقدار میں کم اور زردی مائل۔ پاخانہ قبض کے ساتھ ہو۔

گریفائٹس 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ ماہواری کے دوران پیٹ اور کمر کے تھوڑے حصے میں درد۔ قلت سے ہوں یا صرف ایک دن کے لئے۔

برٹا کارب 200 'چار گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ

☆ قلت حیض۔ مگرے لو تھڑے دار خون۔ کثرت سے جلدی جلدی۔ تاخیر سے۔ پہلی ماہواری دیر سے۔ تھکا دینے والی ماہواری۔ پیلا اور پتلا خون۔

فیرم میلکیم 3x یا 6 'چار گھنٹے بعد'  
☆ تیزی سے بننے والا۔ سخت درد کے ساتھ جیسے دو پتھروں کو رگڑنے سے ہو۔ بے قاعدہ اور شدید درد والی ماہواری۔

کوکولس انڈیکا 30 یا 200 'چار گھنٹے  
بعد

☆ اخراج شروع ہونے سے پہلے شدید درد۔ دبے یا رکے ہوئے حیض۔ درودوں بھری ماہواری۔

ورائزم البم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ وقت سے پہلے اور کثرت سے۔ ایسا لگے کہ ماہواری کی نکسیر چھوٹ رہی ہو۔ حرکت کرنے سے اور زیادہ ہو۔

برائی 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ بچے کو دودھ پلانے کی مدت کے دوران ماہواری یا دودھ پلاتے ہوئے شرمگاہ سے خون کا اخراج۔

سلیسیا 200 یا 1M 'تین گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ ماہواری ہفتہ بھر یا اس سے بھی زیادہ دن جاری رہے۔ کسی قسم کی جذباتیت سے دوبارہ شروع ہو جائے۔ بھیگ جانے یا پانی میں کام کرنے کے بعد حیض دب جائے۔ وقت سے پہلے

اور کثرت سے حیض ہو اور اکثر ہو جائے یا ہر دو ہفتے بعد یا دودھ پلانے کے دوران۔  
 کلکیریا کارب 200 یا 1M تین گھنٹے  
 بعد، تین مرتبہ

☆ قلت سے اور تیز۔ رات کے وقت نہ ہوں۔ صرف دن کے اوقات میں ہوں۔ جلدی  
 جلدی ہو جائیں۔ وقت سے پہلے یا دیر سے ہوں۔

کاشی کم 200 یا 1M تین گھنٹے بعد،  
 تین مرتبہ

☆ پر درد حیض۔ درد جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جائے۔ اعصابی اور پٹھوں کے  
 دردوں کے ساتھ ماہواری ہو۔

کالو فائلم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد،  
 تین مرتبہ

☆ تیز درد بھرے اور گاڑھے۔ وقفے وقفے سے اور بے قاعدہ۔ صرف دن کے اوقات میں  
 ہوں۔ کثرت سے اور گرے رنگ کے۔

یلیم نگ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد،  
 تین مرتبہ

☆ لو تھڑے والے۔ ریشہ دار۔ تھوڑے تھوڑے۔ سرخ چمکدار خون اسقاط حمل کے بعد  
 کثرت سے۔ ذرا سے بھی اشتعال سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

یوشی لاگو (Ustilago) Q یا 6 چار  
 گھنٹے بعد

☆ بے قاعدہ۔ درد بھرے۔ دیر سے یا جلدی جلدی۔ محنت کے بعد تکلیف بڑھے۔

سیپیا 30 یا 200 تین گھنٹے بعد، تین  
 مرتبہ

☆ وقت سے پہلے یا دیر سے۔ قلت سے یا کثرت سے تھکا دینے والے۔ پاخانہ سخت اور  
 قبض کے ساتھ۔ دو ایام کے دوران خون بنے۔

تھلیسی برساپی Q (Thalaspi b. p.)  
 یا 6 چار گھنٹے بعد

☆ خراشدار سیاہ ماہواری۔ جس سے جلد چھل جائے۔ صرف رات کے وقت لیٹنے کے بعد  
 حیض ہوں۔

بووشا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ بے قاعدہ حیض۔ کثرت سے اور اگلی ماہواری تک جاری رہنے والے۔ سیاہ اور لو تھڑے

دار۔

سیکالے کار 30' چار گھنٹے بعد

☆ کثرت سے حیض جس میں ناک سے بھی خون بہے۔ کثرت الدم، غلبہ خون والی یا امتلا دموی جوان لڑکی۔ حیض کا اخراج کسی صدمے یا خوف سے دب گیا ہو۔ تاخیر سے ماہواری۔ غیر معمولی خوف اور بے چینی۔

اکونائٹ 30 یا 200' تین گھنٹے بعد

☆ بہت معمولی سے حیض کا اخراج۔ صرف پہلے دن۔ دوسرے روز تے کے ساتھ۔  
ماہواری کا شدید درد اور لوتھڑے۔ کثرت سے خون جاری ہو۔ ایک کے بعد دوسرا حیض زیادہ ہو۔ اکثر حیض ہو جائیں اور درد ہو۔

سائیکل مین 30' چار گھنٹے بعد

☆ یسدار، درد بھرے، تار کی طرح بندھے ہوئے۔ سیاہی مائل لوتھڑے دار۔ ذرا سی بھی حرکت سے تکلیف بڑھ جائے۔

کروکس سٹیا Q یا 6' چار گھنٹے بعد

☆ کثرت سے اور وقت سے پہلے اور جھلی دار۔ پیٹ میں مروڑ والے درد کے ساتھ۔ متلی اور معدے میں درد جو کہ کمر کے تھوڑے حصے میں پھیل جائے۔

بورکس 30' چار گھنٹے بعد

☆ کثرت سے یا قلت سے حیض۔ ماہواری کے دوران دیگر تمام شکایات میں افادہ ہو۔ بہت تھوڑے وقفے کے لئے درد ہو۔ گہرے اور سیاہ رنگ کا حیض۔

لیکے سس 200 یا 1M' تین گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ جھلی دار پر درد حیض۔ ماہواری کا شدید درد۔ وقت سے پہلے گہرے رنگ کا تار دار اور اعصابی درد کے ساتھ۔ بہاؤ شروع ہو جانے کے بعد کچھ افادہ ہو۔

میگنیشیا فاس 12x یا 30' تین گھنٹے بعد

☆ تیزی سے بننے والا حیض۔ متلی اور تے۔ حیض چمکدار سرخ رنگ کا۔ زبان صاف ہو۔

اپی کاک 30' چار گھنٹے بعد

☆ رحم کے سرک جانے کی وجہ سے۔ صرف رات کے وقت حیض ہو۔ سیاہی رنگ اور لوتھڑوں کے ساتھ۔ پرورد اور جلدی جلدی ہوں۔

ر۔ لمیم P' Q یا 6' تین گھنٹے بعد



- ☆ وقت سے پہلے اور کثرت سے۔ سیاہ لوتھڑوں اور پیٹ کے مروڑ کے ساتھ۔
- ☆ نکس دامیکا 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد
- ☆ قلت کے ساتھ اور دیر سے ہوں۔ صرف ایک دن یا ایک گھنٹے تک ہوں۔ پیپ دار آشوب چشم کے ساتھ قلت حیض۔
- ☆ یوفرزیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ خراشدار درد۔ کثرت سے۔ جماع یا چوٹ کے بعد تکلیف بڑھ جائے۔
- ☆ آرنیکا 200 یا 1M 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ بے قاعدہ۔ گاڑھے اور سیاہ۔ حیض کافی دنوں تک ہوتا رہے۔
- ☆ نکس موسکاتا 200 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ مقررہ وقت کے بعد۔ خاص طور پر پہلی ماہواری۔ بے قاعدہ۔ درد اور قلت سے۔ پاخانہ قبض سے ہو۔
- ☆ گریفائٹس 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ رحم میں ریشہ دار درم۔ دھونے میں دقت ہو۔ کثرت سے تیز اور بدبودار۔ لوتھڑے اور درد بھرے۔
- ☆ پلائینا 200 یا 1M 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ چمکدار سرخ رنگت۔ کثیر اور لوتھڑے والے 'پر درد اور جلدی ہو جائیں۔ موقوفی حیض کے دوران زیادہ تکلیف دہ۔ چلنے سے تکلیف بڑھے۔ اسقاط حمل کی ہسٹری کے ساتھ۔
- ☆ سینا 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد'
- ☆ خراشدار حیض۔ وقفے وقفے سے جلدی جلدی ہو جائیں۔ کھال پھیلنے والے حیض۔ اسقاط کے بعد زیادہ مقدار میں ہوں۔
- ☆ چائنا 6 یا 30 'چار گھنٹے بعد'
- ☆ اگرچہ حیض کثرت سے نہ ہو۔ اس کے باوجود مریضہ دوران حیض اتنی تھک جائے کہ بولنا بھی مشکل ہو۔ دیر تک ماہوای جاری رہے۔ اگرچہ مقدار میں کم ہو۔
- ☆ کاربو اینی میل 200 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ جلدی یا تاخیر سے۔ قلت حیض۔ کالے خون کے لوتھڑے۔ ماہواری کے بہاؤ سے

دوسری شکایات میں بھی اضافہ ہو جائے۔

تھو جا 200 یا 1M تین گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ ماہواری سرخ چمکدار رنگ کی۔ کثرت سے ہو یا قلت سے۔

ملی فولیم Q یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ کمر سے درد نیچے فرج کے بائیں ہونٹ کی جانب پھیلے حیض وقت سے پہلے یا دیر سے۔

قلت سے یا کثرت سے زرد رنگت کے۔ اعضاء مخصوصہ کی درم اور سوجن کے ساتھ۔

کالی کارب 200 یا 1M تین گھنٹے بعد،

تین مرتبہ



## سیلان الرحم Leucorrhoea

(White discharge from the vagina)

اس مرض میں عورتوں کی اندام نہانی کے اندرونی یا بیرونی حصے سے سفید یا زرد رنگ کی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ یہ رطوبت پتلی یا گاڑھی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بدبودار اور بغیر بو کے بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی پیچھے بکھڑے بھی نکلتے ہیں۔ مریضہ کو پیڑوں میں بوجھ محسوس ہوتا ہے اور کمر میں درد ہوتا ہے۔ مریضہ مضحل اور ست سی رہتی ہے۔ اس مرض کی وجہ سے اکثر حمل نہیں ٹھہرتا ہے۔ زیادہ تکلیف کی صورت میں مریضہ کی صحت بگڑ جاتی ہے۔ وہ نحیف و کمزور ہو جاتی ہے۔ چہرہ زرد اور ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا بھی کام کرنے سے سانس پھول جاتا ہے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ماہواری کے ایام میں بھی بے قاعدگی اور بد نظمی ہو جاتی ہے۔ مرض پرانا ہو جانے کی صورت میں رطوبت گاڑھی یا پیپ کی طرح کی ہو جاتی ہے اور رانوں کے بالائی حصے پر چپک جاتا ہے۔ اندام نہانی میں خارش ہوتی ہے۔ جس سے مریضہ کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ رحم کا ٹل جانا، زیادہ عرصے تک بچے کو دودھ پلاتے رہنا، ورم رحم، حیض کا خون کثرت سے آنا، نفرس، سوزاک اور آتشک وغیرہ اس مرض کے عام اسباب ہیں۔ محنت کرنے والی اور لطم کے ساتھ زندگی گزارنے والی خواتین کی نسبت یہ مرض عیاشانہ اور آرام کی زندگی گزارنے اور شہروں میں رہنے والی عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کمر کے درد کے ساتھ لیکوریا کی اعلیٰ ترین دوا۔

ادواٹوشا 3x چار گھنٹے بعد

☆ قریہ عورتوں میں سفید رنگ کا پانی خارج ہونا جس سے اعضاء مخصوصہ کے ارد گرد خارش اور جلن ہو جائے، قبض ہو۔

گریفائٹس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ خراش دار، دہی کی طرح گاڑھا یا انڈے کی سفیدی کی طرح کا مادہ خارج ہونا، ایسے احساس کے ساتھ کہ گرم پانی بہ رہا ہو۔

بوریکس 3x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ ذیابیطس کے ساتھ سیلان الرحم، سفید گاڑھا مادہ خارج ہو۔ کپڑے پر داغ پڑ جائے۔ کمر کے درد کے ساتھ بے قاعدہ اور سیاہی مائل لوتھڑوں کی ماہواری قلت کے ساتھ۔ حرکت کرنے سے تکلیف بڑھے اور آرام کرنے سے بہتر ہو۔

ابروما آگستا (Abroma Augusta)

30 چار گھنٹے بعد

☆ خارش، جلن اور کچے پن کے ساتھ لیکوریا۔ رات کے وقت تکلیف میں اضافہ ہو۔

مرکیورس سال 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ سیلان کے بعد کپڑے پر پیلے دھبے پڑ جائیں۔

چیلی ڈونیم 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ ماہواری دیر سے ہو اور قلت کے ساتھ۔ سفید غیر تیزابی خارش پیدا نہ کرنے والا پانی خارج ہو۔

پینی سیلنم 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ خراشدار اور یسدار کثرت سے شفاف مادہ کا اخراج جو کہ جلن کے ساتھ ایزی تک بہہ جائے۔ دن کے اوقات میں تکلیف بڑھے اور ماہواری کے بعد بھی صفائی اور دھونے سے بہتر ہو۔

الیومنا 0/7 یا اس سے اوپر کی طاقتیں

چھ گھنٹے بعد

☆ دودھ کی طرح کا چکنا مادہ خراشدار یا بے ضرر۔ بعض اوقات جلن کے ساتھ۔ مریضہ نرم خو اور زود رنج ہو۔ منہ خشک اور پیاس نداشت۔

پلسائٹلا 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ خراشدار پیلا مادہ انفیکشن کی وجہ سے۔ جس کے سبب ہلکا کمر درد ہو۔ دو ماہواری کے درمیان وقفے میں درد کی تکلیف بڑھے۔

کریازوٹ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والی خواتین۔ نو عمر لڑکیوں کے لئے۔ پاؤں ٹھنڈے اور نرم آلود۔ دودھ کی طرح کے مادہ کا اخراج جس سے ماہواری سے پہلے اور بعد میں جلن اور خارش ہو۔

ٹکلیریا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار

تین مرتبہ



☆ خراشدار، جلد چھیل دینے والا پیلا یا سبزی مائل مادہ کا اخراج۔ قبض بھی ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ اعضاء مخصوصہ کا ہر عضو نیچے کی طرف گر جائے گا۔

سیپیا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ اسقاط حمل کے واقعات کے ساتھ لیکوریا کی مریضہ کے لئے بطور معاون دوا۔ مریضہ رات کے وقت زیادہ تکلیف محسوس کرے۔

سفیلنم 200 یا 1M پندرہویں روز،

تین مرتبہ

بائو کیمک کی کلکیریا فاس 6x کالی میور 6x اور نیڑم میور 6x

بھی مفید ادویات ہیں۔



# رحم کی تکلیفات

## Affections of Uterus

(See prolaps of uterus also)

رحم کے اندر کا ورم، گردن رحم کا ورم، ناف بڑھ جانا، ناف کا ڈھلک جانا، نم رحم میں زخم، ناف ٹل جانا، رحم ٹل جانا، رحم کا پھسل جانا، رحم کا پیچھے کو مڑ جانا، رحم سے رطوبت کا اخراج، رحم میں اینٹھن، رحم میں جلن، رحم میں گومڑ، رحم میں خارش، رحم میں درد، رحم سے خون کا اخراج وغیرہ کی تکلیفات میں سے اکثر خواتین کو کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی ہے۔ علامات کے مطابق متعلقہ دوا سے شافی علاج ممکن ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کینسر۔ رحم سے کثرت سے خون خارج ہو۔

☆ آیوڈیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد  
☆ غیر منکوحہ خواتین کی رحم کی تکلیفات۔ غیر شادی شدہ بوڑھی عورتوں کی بد نظمی اور بے قاعدگی۔

☆ کوئیم میک 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد  
☆ بچے دانی سے خون کے اخراج کے ساتھ رحم میں جلن۔  
☆ ٹیرے بنتھ Q یا 30 'چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ رحم سے گہرے رنگ کے تار دار خون کا اخراج۔

☆ کروکس سٹیوا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ تیزی سے اور گرم خون کا اخراج۔ ایسا محسوس ہو کہ رحم کی ہر چیز باہر نکل پڑے گی۔

☆ بیلاڈونا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ رحم میں بھراؤ۔ کھچاؤ۔ رحم کی کمزوری کی وجہ سے اسقاط حمل کی عادت بن جائے۔

☆ کالوفانلم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ رحم میں شدید اعصابی دردیں۔ ذرا سے بھی جھٹکے یا چھونے سے تکلیف بڑھے۔ رحم اپنی جگہ سے ہل جائے۔

☆ یلیم نیکی 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

- ☆ رحم میں خراشدار درد۔ ڈی سی (D) کرانے کے بعد پیدا ہونے والی شکایات۔  
آرنیکا مونٹ 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ ڈی سی کا آپریشن کرانے کے بعد رحم میں رہ جانے والے مادوں کی صفائی کے لئے۔  
کونیم میک 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد
- ☆ ناقابل برداشت درد۔ رحم سے خون خارج ہو۔ رحم میں چھین پکڑ اور اینٹھن۔  
کیمومیل 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ رحم میں گومز۔ جنسی خواہش کے دبانے کے اثرات بد۔ رحم کے منہ پر السر۔ مہاشرت  
کے بعد رحم سے خون جاری ہو۔  
کریازوٹ 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ رحم میں جھٹکے سے محسوس ہوں۔ درد زہ جیسے درد۔ رحم کی جلن کی وجہ سے ہسٹرکل  
دورے۔  
دابرنم 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ رحم کی مرگی اور ہسٹریا کے دورے۔ رحم سے اخراج شروع ہونے کے بعد بہتر محسوس  
کرے۔  
سی سی فوگا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ رحم سے چمکدار تاردار خون کا اخراج۔  
لیک کینیم (Lac Caninum) 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ رحم کی بھلیوں پر گومز اور رحم کی کمزوری۔ کمزوری کی وجہ سے رحم سرک جائے۔  
کلیریا فاس 6x یا 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ فرج پر درد اور کھجلی۔ جنسی خواہشات کے ساتھ رحم میں خارش۔  
پلائینا 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ صاف زبان اور متلی کے ساتھ رحم سے تیزی کے ساتھ چمکدار اور کثیر خون کا اخراج۔  
اپی کاک Q یا 30 'چار گھنٹے بعد
- (Dilatation (پھیلاؤ) اور Curettage بافتوں سے کھرچ کر  
نکالا گیا مادہ جو معائنے کے لئے لیبارٹری بھیجا جاتا ہے۔

## بیضہ الرحم / خصیتہ الرحم کی تکلیفات

### Affections of Ovaries/Uterus

اس مرض میں عام طور پر رحم کے منہ پر ورم آتا ہے اور آہستہ آہستہ ورم رحم کے اندرونی حصوں میں پھیل جاتا ہے۔ مقام رحم پر درد ہوتا ہے جو دبائے سے بڑھ جاتا ہے۔ پیڑوں میں بوجھ اور گرانی ہوتی ہے۔ درد کی نیسیں کمر اور رانوں تک پہنچتی ہیں۔ پیشاب جلن کے ساتھ اور بار بار آتا ہے۔ جی متلاتا ہے اور قے آتی ہے۔ شرمگاہ میں سخت سوزش ہوتی ہے۔ شروع میں رطوبت خارج نہیں ہوتی لیکن دو ایک دن کے بعد رنم سے خون آمیز لعابدار رطوبت خارج ہونے لگتی ہے جو بعد میں پیپ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ رحم بڑھ جاتا ہے۔ نبض تیز اور زور زور سے چلتی ہے۔ شدید بخار ہو جاتا ہے۔ اگر مریضہ حاملہ ہو تو اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔

رحم میں رسولی، کثرت مجامعت، سردی لگنا، ٹھنڈی گھاس پر بیٹھنا، رحم کی سوزش اور خراش اس مرض کے عام اسباب ہوتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ بیضہ دانی میں ورم ہو خاص طور پر دائیں جانب کی بیضہ دانی کی سوجن کے لئے۔ جلن دار چھپنے والے درد ہوں۔ کھانسنے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ قلت پیشاب۔ پیاس ندارد۔

ایس ملفیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ بیضہ الرحم ورم آلود۔ تمام پیٹ کے اوپر سخت ازیت ناک سوجن ہو۔

ہیما میلز Q یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ چہرے سے جرم کی عکاسی ہو۔ بیضہ الرحم میں مشت زنی کی وجہ سے سوزش اور سوجن ہو۔

شیفنی سیکریا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، چھ

مرتبہ

☆ بیضہ دانی کا درد اعصابہ۔ سخت بے چینی۔ شدید درد کی وجہ سے مریضہ دوہری ہو جائے۔

کالوسنتھ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ



☆ خشک اور ٹھنڈی ہوا لگ جانے کے بعد بیفتہ الرحم کی تکلیفات کی شکایت۔ فکر مندی اور خوف بھی ہو۔

اکونائٹ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ بائیں بیضہ دانی میں پتھر کی طرح سختی اور اکڑاپن اور سوجن۔ ذرا سے چھیڑنے سے شدید کرناک درد ہو۔ پاخانہ قبض کے ساتھ ہو۔

گریفائٹس 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ بائیں خصیت الرحم میں چھپنے والا درد۔ منہ تر ہونے کے باوجود پیاس ہو۔ مسلسل پسینہ آئے جس میں کوئی کمی نہ ہو۔

مرک سال 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ تپکن والا درد جو اچانک آئے اور غائب ہو جائے نیچے کی جانب شدید دباؤ کا احساس جیسے مخصوص مقام کے تمام اعضاء باہر کو نکل پڑیں گے۔ ذرا سی حرکت یا جھٹکا بھی ناقابل برداشت ہو۔ اسقاط حمل کے بعد کی تکلیف۔ چہرہ سرخ چمکتا ہو۔

بیلادونا 30 چار گھنٹے بعد

☆ موقوفیء حیض کا مرحلہ۔ جلدی جلدی ٹھنڈ لگے۔ تپکن اور نوپنے والے درد ہوں۔

ہیبیر سلف 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، چھ

مرتبہ

☆ مزمن امراض بیضہ دانی۔ تیز درد ماہواری سے پہلے چھاتی میں سوجن اور سوزش ہو۔ پیشاب رک رک کر آئے۔

کونیم میک 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ پاؤں بھیگ جانے کے بعد حیض رک جانے کے سبب سے بیفتہ الرحم کی سوزش اور سوجن وغیرہ۔ ٹھنڈ محسوس ہو۔ پیاس ندارد۔ مریضہ کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں بہتر محسوس کرے۔

پلسائٹلا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ پیشاب کرنے کی مسلسل حاجت۔ بیفتہ الرحم کے مقام پر درد اور جلن۔ درم مثانہ کے ساتھ زچگی کی سوزش رحم۔

کیسترس 30 چار گھنٹے بعد، چھ مرتبہ

☆ پہلے بائیں بیضہ دانی متاثر ہو اور اس کے بعد دائیں۔ رحم سے مادہ خارج ہونے کے بعد درد اور سوزش۔ بائیں خصیت الرحم کا ہلکا سا اعصابی درد کپڑے تک کے دباؤ سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

لیکے کس 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ خصیت الرحم کی سوزش اور سوجن تیز درد کے ساتھ۔ گاڑھا پیلا جلن دار لیکوریا کا پانی خارج ہو۔ کھانے کے بعد مریضہ کچھ بہتر محسوس کرے۔

آیوڈیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ جلن اور تیز درد۔ ایسا محسوس ہو کہ اندر کوئلے جل رہے ہیں۔ گرمائش سے اتفاق ہو (سیکائی وغیرہ) شدید بے چینی ہو۔ خصیت الرحم سے بہت زیادہ خون خارج ہو جائے۔

آرسنک الیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ قبض اور شدید پیاس۔ خصیت الرحم میں سوئیوں کے چبھنے کا سا درد۔ ذرا سی بھی حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

برائی اونیا 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ کچے یا جھوٹے دردوں اور اسقاط حمل کے بعد درد ٹکونیہ ہڈی سے پیڑوں کی ہڈی کی طرف۔ سینا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

دیگر اہم ادویات : ہائیڈراسٹس، لیک کین، لیکے کس، اورم میٹلیکم، یلم فیک اور نکس دامیکا وغیرہ۔



# بچے دانی سے خون کا اخراج

## Metrorrhagia

(See miscarriage also)

اس مرض میں حیض کے دنوں کے علاوہ رحم سے خون خارج ہوتا ہے۔ کبھی وقفے وقفے سے تھوڑی مقدار میں اور کبھی ایک ہی مرتبہ کثرت سے خون خارج ہوتا ہے۔ خون کی زیادتی کی وجہ سے اخراج ہونے سے پہلے سر اور کمر میں درد ہوتا ہے۔ مریضہ کو گرمی محسوس ہوتی ہے۔ چہرہ خون سے پر اور سرخ ہو جاتا ہے۔ قبض ہو جاتا ہے۔ بھوک مر جاتی ہے۔ کبھی کبھار پاؤں پر درم آجاتی ہے۔ نبض کمزور اور چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ مریضہ کمزور اور لاغر ہو جاتی ہے۔ رحم میں آنول کا ٹکڑا رہ جانا، زیادہ بچے پیدا ہونے کی وجہ سے رحم کا ڈھیلا ہو جانا، رحم کا ٹل جانا، رحم میں سوزش اور اجتماع خون، رحم کی رسولی وغیرہ اس مرض کے اسباب شمار کئے جاتے ہیں۔ مزمن بد ہضمی، درم جگر، سوزش گودہ اور سل، کثرت مجامعت اور زیادہ جسمانی و دماغی محنت بھی اس مرض کے اسباب ہوتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ زچگی کے سے شدید درددوں کے بعد زبردست تحکن کا احساس۔ رحم کے سخت اور اکڑے پن کے ساتھ خون کا اخراج۔

کاربوئیج 30، چار گھنٹے بعد

☆ جبکہ صحت کے سلسلے میں کوئی اور شکایت نہ ہو حمل کے اور تیسرے مہینے میں اسقاط حمل کے خطرے کے ساتھ اچانک خون خارج ہونے لگے۔

کریازوٹ 30 یا 200، تین گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ معدے میں درم ہو۔ کسی طرح گر جانے سے اخراج خون شروع ہو جائے۔ خون سیاہی مائل آنے لگے۔ دو ماہواریوں کے درمیان اخراج خون ہو۔

ہیما میل 30 یا 200، تین گھنٹے بعد

☆ مزمن اخراج خون۔ اسقاط حمل سے پہلے یا بعد میں کثرت سے خون بے۔

لائکو پوڈیم 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ کثرت سے پتلا سیاہی مائل خون کا اخراج۔ کافی عرصے تک جاری رہنے والا۔ پانی جیسا

پتلا خون مسلسل رستا رہے۔

سیکالے کار 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ کسی مشینی چوٹ کے لگ جانے سے۔ مباشرت کے بعد رحم کے سرک جانے کی وجہ سے  
اخراج خون۔

آرنیکا 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ

☆ ڈنک لگنے یا کانٹے کے سے دردوں کے ساتھ گرمی کا احساس۔ دوران حمل اخراج خون۔  
پلاس ندارد۔

ایس ملفیکا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ شدید دردوں کی وجہ سے دورے۔ اسقاط حمل کے بعد وقفے وقفے سے اخراج۔ خون  
گاڑھا اور جما ہوا سا۔

کیمومیل 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ کچھڑے پانی کی طرح کثیر خون کا اخراج۔ شدید دردوں کے ساتھ۔ بہت زیادہ محنت کا کام  
کرنے کی وجہ سے۔

ٹائٹریک ایسڈ 30 یا 200 'چار گھنٹے  
بعد' تین مرتبہ

☆ موٹی پلپی سی اور ٹھنڈ محسوس کرنے والی مریضہ۔ جن کو اسقاط حمل کا خطرہ رہے۔  
گلکیریا کارب 200 یا 1M 'چار گھنٹے  
بعد' تین مرتبہ

☆ صاف زبان کے ساتھ مٹی اور تے۔ چمکدار سرخ خون دیر تک جاری رہے۔  
اپی کاک Q یا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ ششی دردوں کے ساتھ لوتھڑے والا خون۔ دوران حمل خون جاری ہو جائے۔ نیند کی  
کمی کی وجہ سے اخراج خون۔

کوکولس انڈیکا 30 'چار گھنٹے بعد'

ہائو کیمک کی گلکیریا فاس 6x اور فیرم فاس 3x بھی مفید  
ادویات ہیں۔



# رحم کا سرک جانا

## Uterus Prolapsus

استقاط یا وضع حمل کے بعد جب کسی سخت جسمانی محنت یا کمزوری کے سبب جب اندام نسائی کی پچھلی دیوار باہر کی طرف الٹ جائے تو اسی کے ساتھ مقعد بھی باہر الٹ جاتی ہے۔ اور اندام نسائی کی اگلی دیوار باہر الٹ جانے کی وجہ سے مثانہ بھی باہر نکل آتا ہے کیونکہ رحم کے عضلات ڈھیلے پڑے ہوتے ہیں۔ پیڑو اور کمر میں بوجھ محسوس ہوتا ہے اور سخت درد ہوتا ہے۔ رفع حاجت کرتے ہوئے زیادہ تکلیف ہوا کرتی ہے۔

### علامات 'دوا اور طاقت' دورانیہ

☆ مایوسی اور خودکشی کرنے کے خیالات آئیں۔ زیادہ وزن اٹھانے کے بعد رحم سرک جائے۔ مریضہ کے دوران حیض تکلیفات میں اضافہ ہو۔

اورم میلیکم 200 یا 1M 10 منٹ  
بعد 'تین مرتبہ

☆ رحم کے نیچے کو گر جانے کا احساس۔ بائیں جانب کے بیفتہ الرحم کے مقام پر درد ہو۔ چھاتی کے گرد کپڑوں کا ٹائٹ ہونا تک برداشت نہ کر سکے۔

لیکے سس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ رحم میں بوجھ کا احساس۔ نیچے کو دبائے جانے کا سا احساس۔ جوف شکم میں ڈوبنے کا سا احساس۔

سپیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ

☆ جب رحم کے سیون اور بندھن ڈھیلے سے محسوس ہوں بھاری رحم کی وجہ سے۔

فریکسیس نس (Fraxinus) 10-5 Q  
قطرے 'چار گھنٹے بعد'

☆ حیض قلت سے اور وقت سے پہلے۔ نیچے کو رحم گرنے کا احساس۔ دوران مباشرت زیادہ تکلیف ہو۔

نیو کوکسین (Pneumococcin) 30  
یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ کمزوری کی وجہ سے رحم سرک جائے۔ مقعد کے سرکنے کے ساتھ۔

پوڈو فاللم 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد

☆ چھیننے کا سا احساس۔ صدے یا چوٹ کی وجہ سے رحم گر جانا۔

آرینکا 200 یا 1M '10 منٹ بعد' تین

مرتبہ

☆ کثرت سے اور بدبودار حیض۔ جھٹکے یا ہلنے جلنے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ رحم نیچے سرکنے کا احساس ہو۔

بیلاڈونا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ سیپیا کے غیر موثر ہونے کی صورت میں۔ مریضہ ایسا محسوس کرے کہ پیڑوں کے اعضاء اندام نہانی کے ذریعے باہر نکل پڑیں گے۔ فرج کو ہاتھ سے تھامے۔ پیشاب کرنے کی لگاتار خواہش یا حاجت۔

یلیم نگی 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ روہانسی، نرم خو مریضہ۔ لیٹنے کے بعد تکلیف بڑھے۔ مریضہ ٹھنڈی کھلی ہوا میں اچھا محسوس کرے۔

پلساٹیل 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی کلیریا فلور 12x اور کلیریا فاس 3x بھی بہترین

ادویات ہیں۔

دیگر اہم ادویات : ایلو، ایگری کس m، ایسے کولس ہپ،  
ارجنٹم، ٹیلیکیم، ہیلونیا، میوریکس، سفلیم وغیرہ۔

## رحم کا مسہ

### Uterus Polypus

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ موٹی اور پلپلی خواتین کے لئے جو جلدی جلدی ٹھنڈ گتے سے متاثر ہوں۔ ان کے رحم میں گومڑ ہو۔

کلیریا کارب 200 یا 1M 'ہفتہ وار'

تین مرتبہ

☆ رحم یا اندام نسائی میں گومز۔ مرطوب موسم میں تکلیف پڑھے۔

یوکریم (Teucrium m. v.) 30  
چار گھنٹے بعد

☆ جبکہ گومز سے آسانی کے ساتھ خون بنے لگے۔

فاسفورس 30 یا 200 'ہفتہ وار' تین

مرتبہ

☆ رحم کے منہ پر گومز جو کہ رفع حاجت کے وقت باہر کو نکل پڑے۔

کونیم میک 200 یا 1M '10 منٹ بعد'

تین مرتبہ

بائیو کمک کی ٹکیریا فاس 6x چار گھنٹے بعد دینے سے بھی بہت  
فائدہ ہوتا ہے۔

آپریشن سے پہلے اور بعد کے لئے احتیاطی دوائیں

(Pre & Post Operation Care)

☆ آپریشن کے بعد خون روکنے کے لئے۔

فاسفورس 30 یا 200 'ایک خوراک'

☆ سرجیکل مدد کے لئے۔

سرو شیا کارب 30 یا 200 '10 منٹ'

بعد 'تین مرتبہ'

☆ اتھر کے ساتھ انسٹیمیا کے برے اثرات رفع کرنے کے لئے۔

انٹی مونیم ٹارٹ 200 '10 منٹ بعد'

تین مرتبہ

☆ آپریشن سے پہلے دینے کے لئے۔ آپریشن کے صدمے سے بچانے کے لئے۔ آپریشن کے  
بعد کے اثرات وغیرہ کے لئے۔

آرنیکا 200 یا 1M 'ایک خوراک'

☆ اعصابی چوٹ کے لئے۔ ناخن وغیرہ نکلنے کے لئے ختنہ یا کوئی عضو کاٹنے کی صورت

میں۔

بالبریکم 200 '10 منٹ بعد' تین

مرتبہ

☆ آپریشن کے بعد جبکہ سرخ چمکیلا خون ہے۔

میلی فولیم Q یا 30' تین گھنٹے بعد

☆ کلوروفارم سے استیجیسا کرنے کے اثرات بد کے لئے۔

کلوروفارم 200' 10 منٹ بعد ' تین

مرتبہ

☆ ہائپرکیم بے اثر ہونے کی صورت میں۔

۱۔ ہلیم سیپا 30' تین گھنٹے بعد

☆ آپریشن کے بعد کے لئے۔ پیشاب روکنے کے لئے۔

کاشی کم 30 یا 200' آدھے گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ گلے کے غدود نکالنے کے بعد۔

کیلنڈولا 30' تین گھنٹے بعد' چھ مرتبہ





## دوران حمل کی تکلیفات

### Alliments during pregnancy

بعض خواتین کو دوران حمل طرح طرح کی تکلیفات ہوتی ہیں۔ بعض عورتیں مغموم رہنے لگتی ہیں۔ بعض کو غشی اور ہسٹریا کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ کسی کے دانتوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ کسی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے اور کسی کے ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے ہیں۔ اکثر خواتین کو کمر میں درد محسوس ہوتا ہے اور قبض ہو جاتا ہے۔ بعض خواتین کو پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے۔ غرض یہ کہ دوران حمل انفرادی طور پر خواتین کو مختلف قسم کی شکایات ہو جایا کرتی ہیں۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ دوران حمل پانی کے نظارے سے قے آنے لگے۔  
فاسفورس 30 یا 200 '10 منٹ بعد'  
تین مرتبہ
- ☆ ہوش و خواص جاتا رہے۔ سر کی جانب دوران خون۔  
گلوٹائن 30 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ دوران حمل دانتوں میں درد ہو۔  
سیپیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ دوران حمل مسلسل قے آنے کی صورت میں۔  
کوپرم آر سکم 30 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ دوران حمل ہاتھ پاؤں پر درم اور سخت ہو جائیں۔ (اکڑ جائیں)  
سیگلونیریا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ دوران حمل کان کی تکلیفات کے لئے۔  
کیسی کم 30 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ پاؤں کے انگوٹھوں اور ٹکڑوں میں اینٹھن۔ دوران حمل ٹھنڈ زیادہ لگے۔  
کلیریا کارب 200 '10 منٹ بعد' تین مرتبہ

☆ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑیں۔ حمل کے ابتدائی دور میں کچلی ہو۔

سی سی فوگا 30 ' چار گھنٹے بعد ' تین مرتبہ

☆ درد زہ کے دوران گھٹن کی لہریں اور اینٹھن۔

ہائیو سیامس (Hyoscyamus)

200 ' آدھے گھنٹے بعد ' تین مرتبہ

☆ خراشدار دردیں۔ کسی قسم کے مشینی دباؤ کی وجہ سے تکلیفات۔

آرنیکا 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد ' تین مرتبہ

☆ دوران حمل دورے اور ٹانگوں میں اینٹھن۔

واہرنم 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ دوران حمل چلنے کے قابل نہ رہے۔

پلس 30 P ' چار گھنٹے بعد

☆ دوران حمل قبض اور سہ۔

کولن سونیا 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد ' تین مرتبہ

☆ ایسا محسوس کرے کہ رحم کا منہ کھلا پڑ رہا ہے۔

لیکے س 200 ' ایک خوراک

## عورتوں میں خواہش جماع کا غیر معمولی جذبہ

### Nymphomania

(See masturbaion of female also)

☆ دوران حیض اور ماہواری دب جانے کے بعد جماع کی خواہش۔ بہت زیادہ خواہش جماع۔

پلاٹینا 200 یا 1M ' ہفتہ وار ' تین مرتبہ

☆ ذرا سا بھی چھو جانے سے بہت زیادہ جنسی اشتعال۔ بڑھے یا پھیلے اور اکڑے ہوئے رحم

کے ساتھ انتہائی قسم کا جنسی اشتعال۔

میوریکس 200 یا 1M ' چار گھنٹے بعد ' تین مرتبہ

☆

☆ جماع کے نتیجے میں جنسی خواہش اور بڑھے۔ ماہواری کے دوران بہت زیادہ خواہش جماع۔

میرنٹولا ہسپانہ (Tarentula h) 200

یا 1M ہفتہ وار 'تین مرتبہ

☆ جبکہ چھاتی کے گرد لباس تک کا بوجھ ناقابل برداشت ہو۔ بہت زیادہ بکواس کرنے والی حاسد قسم کی عورت خاص طور پر موقوفی حیض یا تبدیلی زندگی کے وقت۔

لیکے سس 200 یا 1M ہفتہ وار 'تین

مرتبہ

☆ سرد نہ پڑنے والا جنسی اشتعال جس میں دنیا فساد تک کی کیفیت پائی جائے۔ اندھیرے سے ڈر خوف کے ساتھ۔

سٹراسونیم 200 یا 1M چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ ذرا سے اشارے پر جماع کے لئے آمادہ ہو جائے۔ حیض سے پہلے اور حمل کے دوران خواہش جماع بہت زیادہ ہو۔

فاسفورس 200 ہفتہ وار 'تین مرتبہ

☆ مشت زنی کے بعد شدید خواہش جماع کے ساتھ بظاہر (Clitoris) کی ابستادگی۔ ماہواری سے پہلے بہت زیادہ خواہش جماع ہو۔

کلکیریا فاس 12x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ رحم کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جماع کی شدید خواہش۔ رحم کے سرک جانے اور رحم کی گردن میں ٹپکن اور دھڑکن ہو۔

بلیئم نک 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ حیض سے پہلے اور حیض کے دوران شدید خواہش جماع۔ اپنے اوپر کسی طور پر کنٹرول نہ کر سکے۔

ورائزم البم 30 چار گھنٹے بعد

☆ جنسی جنون۔ شدید خواہش جماع کے ساتھ اعضاء مخصوصہ کا درم اور جلن۔

بیتھرس 30 یا بڑی طاقت 'چار گھنٹے

بعد

☆ جنسی خواہشات کا غیر معمولی جذبہ۔ مباشرت کے خیالات اور عیاشانہ قسم کے خواب۔  
جنسی اختلاط کا رجحان۔

سیلیکس نائگر (Salix nig) Q یا 30

چار گھنٹے بعد

☆ جوان لڑکیوں کے لئے جو شدید جنسی خواہش کے اطمینان کے لئے مشت زنی پر مجبور ہو  
جائیں۔

اوریگانم (Origanum) 30 چار گھنٹے

بعد

بائیو کیمک کی کلکیریا فاس 200x شدید جنسی خواہشات کے  
لئے مفید دوا ہے۔

جو چار چار گھنٹے بعد دینے سے مفید نتائج برآمد ہوتے ہیں۔





# موقوفی حیض

## Menopause

(change of life)

حیض سن بلوغت سے شروع ہو کر اوجیز عمری تک یعنی پینتالیس پچاس سال تک جاری رہتے ہیں۔ اس کے بعد عام طور پر حیض بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن حیض بند ہونے سے پہلے اور بعد میں عورتوں میں حیض سے متعلق اور دیگر طرح طرح کے امراض، ذہنی اور جسمانی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جو خود مریضہ اور دوسرے افراد کے لئے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ ذہنی تبدیلیوں میں عورت کا چڑچڑاہٹ، باتونی پن، غمگینی، افسردگی اور جھگڑالو پن جیسی باتیں شامل ہوتی ہیں۔ جبکہ جسمانی طور پر مریضہ یا تو کمزور اور دہلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا موٹی ہو جاتی ہے۔ تھکی ماندی ست اور کامل ہو جاتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والی موٹی، پلپلی، پیلے رنگت کی، ڈھیلی ڈھالی سی مریضہ۔ زیادہ کام کی وجہ سے تھکی ماندی۔

کلکیریا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار

تین مرتبہ

☆ شدید سر درد۔ مریضہ ایسا محسوس کرے کہ کھوپڑی پھٹ جائے گی۔ پشت کے پٹھوں کا گھٹیاوی درد اور گردن کی سوجن۔

موسا

ایکٹراراسکی

30 (Actararacemosa) چار

گھنٹے بعد

☆ گرمی اور خارش کا احساس۔ وزن کم ہوتا جا رہا ہو۔ تھکی ماندہ۔ نہانے سے گریز کرے۔

سلفر 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ گرم تھماہٹ۔ لیکوریا پیاس کی زیادتی یا قبض کے ساتھ۔ رحم کے سرکنے یا گرنے کے ساتھ خون کا اخراج۔ ناقابل برداشت دردیں۔ مریضہ ہر قسم کی ہمدردی کو ناپسند کرے۔ لمبی دہلی پتلی مریضہ ذرا سی بات پر افسردہ اور غمگین ہو جائے۔ خونی بواہیر۔

سپیا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ باتونی چڑچڑاہٹ اور غمگین قسم کی مریضہ۔ تمام جسم میں جلن کا احساس۔ گرمے رنگ کے

خون کا اخراج۔ سخت تکلیف دہ سردرد۔ دھڑکن۔ سونے کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو۔  
لیکے کس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ


☆ جسمانی علامات غائب ہو جائیں اور دماغی علامات ظاہر ہوں۔ تشدد یا جارحانہ طبیعت کی  
تکبر اور اکڑ والی مریضہ۔ دوسروں کو لعن طعن کرے۔ رشتہ الرحم میں درد کے ساتھ سیاہ  
لوتھروں کے ساتھ خون کا اخراج۔ خواہش جماع کا غیر معمولی جذبہ۔

☆ پلاٹینا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ  
رونے والے مزاج کی عورت۔ مزاج میں تبدیلی آتی رہے۔ گرم اور بند کمرے میں گرم  
پہینہ آئے۔ پیاس ندارد۔ کھلی اور ٹھنڈی فضا پسند کرے۔

پلساٹیل 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

بایو کیمک کی کالی فاس 6x مفید دوا ہے۔



# چھاتی کی تکلیفات / دودھ کے غدود

## Mammary glands

(Affections of Breast)

بعض خواتین کو دوران حمل اور وضع حمل کے بعد چھاتی کی تکلیفات ہو جاتی ہیں۔ بعض مستورات کے بچے کو پلانے کے لئے بہت قلیل مقدار میں دودھ بنتا ہے اور بعض کی چھاتیوں میں بہت دودھ اتر آتا ہے۔ کچھ عورتوں کی چھاتی سے خود بخود دودھ ٹپکتا رہتا ہے بعض اوقات زچہ کے پستانوں میں درد ہوتا ہے۔ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے یا نپل میں خارش ہوتی ہے۔ بعض خواتین کے دودھ کے غدود ورم آلود ہو جاتے ہیں یا چھاتی میں گومڑ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات زچہ کا دودھ بہت پتلا یا بہت گاڑھا ہوتا ہے گویا دودھ خراب ہوتا ہے۔ بچہ اس قسم کے دودھ کو ہضم نہیں کرتا اور الٹ دیتا ہے۔ علامات کے مطابق علاج کرنے کے علاوہ چھاتی کی تکلیفات میں مبتلا مستورات کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہئے۔ انھیں بہتر غذا اور اچھا ماحول فراہم کرنا چاہئے اور کسی قسم کے فکر اور غم سے آزاد رکھنا چاہئے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ دودھ کے غدودوں کے اوپر پھسیاں اور دانے نکل آئیں۔ پوری چھاتی پر جلن اور دباؤ کا احساس۔

بالبر ٹائیگر (Piper nig) 30

☆ چھاتیوں میں درد اور نپل میں خارش ہو۔ چھاتیوں کی نشوونما نہ ہوئی ہو اور بال پن سے متعلق رحم اور بیض دانوں کے مسائل بھی رہے ہوں۔

اوناس موڈیم

(Onos modium C. M.) ماہانہ

(تین مرتبہ)

☆ لٹنڈ محسوس کرنے والی مریض۔ دودھ کے غدودوں میں ٹالی کی شکل کا لمبا پھوڑا ہو۔

سلیسیا 12x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ چھوٹے سے بھی تکلیف ہو۔ چھاتیوں سکڑی ہوئی اور ڈھیلی ہوں۔ لاغری ہو۔

کوئیم 200 یا 1M ہفتہ وار چھ مرتبہ

☆ رحم اور بیضہ دانیوں کی کمزور نشوونما۔ زنانہ اعضاء کی بہتر نشوونما کے لئے۔

پکچڑی گلیٹڈ (Pituitary g) 200

پندرہویں روز چھ مرتبہ

☆ بیضہ دانیوں اور رحم میں تیز کاٹنے والے درد۔ دودھ کے غدود بہت حساس۔ رات کے وقت تکلیفات بڑھیں۔

مفلینم 200 IM ہفتہ وار تین مرتبہ

☆ عام صحت کمزور۔ جنسی کمزوری۔ بال پن کی رحم اور بیضہ دانیوں کی تکلیفات۔ چھاتیوں کی نشوونما ٹھیک نہ ہو۔ مرجھائی ہوئی سی چھاتیاں۔

سائل سیرولاٹا (Sabal Ser) 10-5 Q

قطرے چار گھنٹے بعد

☆ چھاتی کا زخم یا گاؤ دودھ کے غدودوں کا ناسور۔ چیرنے والے درد۔ ٹھنڈے مشروبات کی خواہش۔

فاسفورس 200 چار گھنٹے بعد تین مرتبہ

☆ چھاتی کے گومڑ۔ سخت اور حساس۔ جب بچہ دودھ پئے تو درد ٹھیل سے تمام جسم میں پھیلے۔

فائٹولاکا (Phytolacca) 30 یا 200

چار گھنٹے بعد

☆ گومڑ کے ساتھ لمبی چھاتیاں۔ دودھ ضرورت سے زیادہ بنے۔ درد والے گومڑ۔ لاغری۔

چیمافیلہ (Chimaphila) Q یا 30

چار گھنٹے بعد

☆ دودھ کے غدودوں کا ورم اور سوجن۔

سینفٹیم (Symphytum) 6 یا 30

چار گھنٹے بعد

☆ دودھ کے غدودوں کی سوزش اور زخم جلن اور خارش۔

پونیا (Paenonia) Q یا 6 چار گھنٹے

بعد

☆ دودھ کے غدودوں کے پیچھے درد۔ گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ پیاس ندرد۔ کھلی اور ٹھنڈی ہوا کے لئے خواہش۔

پلسٹیلہ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد



# چھاتی سے دودھ دینا

## Lactation

بعض اوقات بچے کی پیدائش کے بعد چھاتیوں میں دودھ کے بھراؤ کی وجہ سے چھاتیوں میں درد ہو جاتا ہے۔ لرزہ کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے۔ اعضاء کمر اور سر میں درد ہو جاتا ہے۔ نپل پر ورم آ جاتا ہے۔ بس سے دودھ پلاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ بعض اوقات دودھ زیادہ مقدار میں یا کم مقدار میں آنے کی وجہ سے چھاتی کی تکلیفات ہوتی ہیں۔ دودھ زیادہ آنے کی صورت میں دبا کر یا آلہ لگا کر دودھ نکال دینا چاہئے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ چھاتیاں سخت اور اکڑی ہوئی۔ پیپ بننے کے امکان کی وجہ سے۔ درد تمام جسم میں پھیلے۔ دودھ پلاتے ہوئے تکلیف ہو۔ نپل بہت زیادہ سوجا ہوا ورم آلود۔ دودھ کا بہاؤ بہت زیادہ ہو۔

☆ چھاتی سخت اور چھونے سے حساس۔ سوزشی سوجی ہوئی۔ درمیان سے گلاب کے پھول کے رنگ کی طرح۔ بچہ دودھ پینے سے انکاری ہو یا پینے کے بعد اگل دے۔ جب بچے کو دودھ پلائے تو نپل سے خون آئے۔ دودھ میں رکاوٹ ہو جائے۔

☆ چہرہ سرخ متمایا ہوا۔ جلد خشک اور گرم۔ دودھ کا بہاؤ بہت زیادہ۔ چھاتی ورم آلود سوجی ہوئی گرم اور سرخ۔ نرم اور بعض اوقات پتھر کی طرح سخت۔

☆ مریضہ کو شدید پیاس لگے۔ بہت زیادہ مایوس اور افسردہ ہو۔ چھاتی کا سائز چھوٹا ہو رہا ہو۔ دودھ کی مقدار کم ہو۔

☆ دودھ کی قلت۔ دودھ پلاتے ہوئے درد ہو۔ دردیں سینے، گردن اور کمر کی جانب پھیلیں۔ دودھ چھڑانے کے بعد قطرے قطرے ٹپکتا رہے اور چھاتی کھنٹی یا تنی ہوئی محسوس ہو۔ مریضہ زود رنج، آنسو بہانے والی اور نرم خو ہو۔ گرمی پسند نہ کرے اور ٹھنڈ اور کھلی ہوا کی خواہش کرے۔

☆ مریضہ ٹھنڈ محسوس کرنے والی، موٹی اور پلپلی سی اور کمزور ہو۔ جس کو جلدی ہیمنہ آجائے خاص طور پر سر میں اور رات کے وقت۔ پانی کی طرح پتلا دودھ کافی مقدار میں نکلے۔ لیکن بچہ پینے سے انکاری ہو۔ یا پھر دودھ کی قلت ہو چھاتی میں دودھ ہونے کے باوجود۔

☆ کلیریا کارب 200 چار گھنٹے بعد

مرتبہ

# درد زہ / زچگی کی دردیں

## Labor

وضع حمل کے ساتھ ساتھ درد زہ کے بھی تین مراحل ہوتے ہیں۔ جب زچگی کے درد شروع ہوتے ہیں تو اس وقت سے رحم کا منہ کھلنے تک وضع حمل کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ وضع حمل کے اس درجے میں رحم بار بار سکڑتا ہے جس سے دردیں ہوتی ہیں۔ یہ دردیں شروع شروع میں دس بیس منٹ کے وقفے سے آتی ہیں اور قریباً "تیس سیکنڈ تک رہتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ وقفہ کم ہوتا اور درد کا وقت بڑھتا جاتا ہے۔ ان بار بار کی دردوں اور رحم کے سکڑنے کی وجہ سے رحم کا منہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ بچے کے پانی کی تھیلی پھٹ جانے کے بعد زچگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس درجے میں جلدی جلدی درد ہوتا ہے۔ ہر پانچ منٹ بعد اور پھر کم ہوتے ہوتے ایک منٹ اور دردیں ہونے لگتی ہیں۔ اس مرحلے پر حاملہ کے زور لگانے سے شدید درد کے ساتھ بچے کا سر اور منہ باہر نکل آتے ہیں۔ اس حالت کے بعد دو منٹ تک درد رک جاتا ہے اور بچے کے مکمل طور پر باہر آجانے کے بعد دردیں ختم ہو جاتی ہیں اور قریباً "بیس منٹ تک درد نہیں ہوتے۔ تیسرے مرحلے میں حاملہ سردی محسوس کرتی ہے اور پھر اچانک درد شروع ہو جاتے ہیں۔ اور شدید درد کے ساتھ پردے اور آنول رحم سے باہر نکل آتے ہیں اور اس طرح وضع حمل کا تیسرا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے اور بعد میں مریضہ کو بڑی حد تک آرام آجاتا ہے البتہ ہلکی ہلکی سی قابل برداشت دردیں محسوس ہوتی رہتی ہیں جو چند گھنٹوں کے بعد رفع ہو جاتی ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ متلی کی علامت بہت زیادہ نمایاں خاص طور پر ناف کے قریب تیز اور شدید درد کے ساتھ۔

اپنی کاک 30 یا 200 '10 منٹ بعد،  
تین مرتبہ

☆ درد زہ کے آخری مرحلے میں دینے کے لئے۔ دوسری خوراک اس وقت دی جائے جب رحم اور اندام نہانی کے چھل جانے کی وجہ سے آنول الگ کر دی گئی ہو۔

آرنیکا 200 یا 1M '10 منٹ بعد، تین  
مرتبہ

☆ اندام نہانی کا منہ سخت، لمبا، موٹا، اکڑا ہوا اور پی کی طرح بندھا ہوا ہو۔ اعصابی کمزوری بے دھڑکن اور سختی شدید درد۔ جو عام طور پر ابتدائی مرحلے کے بعد کمزور پڑ جائے۔

کولو فالٹم 200 '10 منٹ بعد، تین  
مرتبہ

☆ درودوں کے بعد۔ تشنج اور اکڑاہٹ۔ رحم کے منہ کا کھچاؤ۔ درود لائقوں کی جانب سے بچے کی طرف جائے۔

واہرنم آپوس 30 یا 200 '10 منٹ  
بعد 'تین مرتبہ

☆ بہت زیادہ شور و غل کرے۔ گھبراہٹ کا اظہار کرے۔ دوسروں کی مدد کے لئے چلائے۔  
بہت زیادہ درد محسوس کرے۔ لیکن یہ علامات کیونچھیں شدد نہ ہوں۔

کافیا 200 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ  
☆ مریض بہت رنجیدہ طبیعت ہو۔ روئے۔ بے ہوشی محسوس کرے اور تازہ ہوا کی خواہش کرے۔

ہلساٹلا 200 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ  
☆ درودوں کے بعد۔ بچے کو چھاتی سے لگاتے ہوئے جذباتی ہو جائے۔ درد بائیں سے دائیں کو بڑھیں۔

کوئیم 200 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ  
☆ بسی بے چینی اور بے آرامی کے بعد جبکہ مریض کمزور اور تڑھال ہو جائے۔ گرمائش چاہے اور کپڑا اوڑھنا پسند کرے۔

آرسنک الیم 200 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ  
☆ مریض کپڑا اوڑھنا پسند کرے۔ کپکپی اور لرزے کے ساتھ دردیں۔ گزشتہ ایام میں گرنے اور سرک جانے کی علامات کے ساتھ۔ کار وغیرہ سے۔

سپیا 200 یا 1M '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ  
☆ طبی معائنہ سے تنگ آکر مریض تشدد ہو جائے۔ خوف اور بے چینی پائی جائے۔

اکونائٹ 200 یا 1M '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ  
☆ مریض روئے اور تکلیف کی شکایت کرے۔ ایک پاؤں سے فرش 'بستر یا کرسی کو خوب رگڑے اور دوران درد حرکت کرے۔

ایکیٹارلس موسا  
(Actaea racemosa) 30 یا  
200 'چار گھنٹے بعد



☆ دردوں کے بعد۔ رات کے وقت۔ دن میں درد نہ ہونے کے برابر۔ پہلو بدلنے کے بعد اور مناسب طریقے سے ڈھکے جانے کے بعد بہتر محسوس کرے۔

رہس ٹاکس 200 یا 1M '10 منٹ

بعد، تین مرتبہ

☆ مریضہ ذرا سی بات پر غصہ میں آجائے۔ الٹی سیدھی باتیں کرے اور چلائے۔ اس کو اعتدال میں رکھنا مشکل ہو۔ اعصابی کمزوری محسوس کرے۔

کیمومیل 200 یا 1M '10 منٹ بعد،

تین مرتبہ

☆ دردوں کے بعد۔ ذرا سی حرکت سے بھی جذباتی ہو جائے یہاں تک کہ گہرے سانس لینے سے بھی۔ ہونٹ پھٹے ہوئے۔ منہ خشک سر میں شدید درد جیسے پھٹ جائے گا۔

برائی اونیا 200 یا 1M '10 منٹ بعد،

تین مرتبہ

☆ مریضہ زودرنج ہو۔ روئے اور آپیں سسکیاں بھرے۔ ہمیشہ گہرا لمبا سانس لے۔ ایسا محسوس ہو کہ مریضہ گہرائی میں جھجھکوں تک سانس نہیں لے پا رہی ہے۔

اگنیشیا 200 یا 1M '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ





## اسقاط حمل

### Abortion/Miscarriage

#### حمل ضائع ہونا

رحم مادر میں جنس (کچا بچہ یعنی چار ماہ تک) یا اس سے زیادہ عمر کا جس کے جسم کے اعضاء مکمل ہو چکے ہوں کے وقت سے پہلے جنم کو اسقاط حمل کہتے ہیں۔ یہ اچانک کسی صدمے، گرنے، چوٹ وغیرہ کے سبب بھی ہو سکتا ہے یا بعض خواتین میں حمل کے دوران کسی بھی مہینے میں اسقاط کا رجحان پائے جانے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔  
انفاقہ یا حادثاتی اسقاط حمل کے لئے درج ذیل ادویات مفید و موثر ہیں۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کسی خوف یا جذباتی ہونے کی وجہ سے اسقاط ہونے کی صورت میں۔  
اکونائٹ 200 '10 '10 منٹ بعد تین

☆ ضائع ہو جانے کے بعد کمر اور اعضاء تناسل میں درد کے لئے۔  
مرتبہ  
سینا 30 'چھ گھنٹے بعد' چھ مرتبہ  
☆ ذہنی طور پر جذباتی ہو جانے سے۔

☆ خون کی کمی کے باعث اسقاط کا رجحان۔  
کیومیلا 30 یا 200 'ہر دو گھنٹے بعد'

☆ ایلٹریس ایف f (Aletris) Q 5 سے  
10 قطرے ہر دو گھنٹے بعد  
☆ کسی بھی مہینے خصوصاً "آٹھویں مہینے میں مریضہ کو مکمل آرام کرنا چاہئے۔

☆ وائبرنم (Viburnum) Q یا 30 'ہر  
دو گھنٹے بعد'

☆ رحم کی کمزوری کی وجہ سے۔

☆ کولو فائلیم (Caulophyllum) 30  
ہر تین گھنٹے بعد'

☆ اسقاط روکنے کے لئے جبکہ خون جاری ہو گیا ہو۔

ٹرلیم پی (Trillium P) 'Q 5 تا 10  
قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد

☆ بہت زیادہ اخراج خون جس میں کہ سرخ چمکدار خون جاری ہو، شدید درد ہو اور زبان صاف ہو۔

اپنی کاک Q یا 30 ہر آدھا گھنٹہ بعد

☆ بہت زیادہ تھکن یا غصیلے جذبات کی وجہ سے۔

ہیلونیاں (Helonias) 'Q 5 تا 10  
قطرے ہر دو گھنٹہ بعد

☆ کالے اور نہ بننے والے خون کے ساتھ۔

کروٹیلز ہیرائڈس (Crotalus h)  
30 یا 200 ہر آدھا گھنٹہ بعد، تین مرتبہ

☆ مگر جانے سے یا صدمے سے۔

آرنیکا 200 ہر 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ زیادہ اخراج خون کی کمزوری سے۔

چائنا 30 ہر تین گھنٹے بعد

☆ جب کچھ دیر تک خون جاری رہے۔

تھلاسپی برسا پی

(Thlaspi bur P) 'Q پانچ سے 10  
قطرے ہر دو گھنٹے بعد

☆ پہلے مہینے میں اسقاط کے لئے۔

کروکس سٹیوا (Crocus Sativa) Q  
یا 30 ہر تین گھنٹے بعد

بعض خواتین کے ہاں کسی خاص مہینے میں اسقاط حمل کا رجحان پایا جاتا ہے اور یہ صورت حال ایک سے زیادہ مرتبہ پیش آچکی ہوتی ہے۔ ان حالات میں علامات کے مطابق اسقاط کے متوقع وقت سے ایک ماہ پہلے درج ذیل دواؤں کے استعمال سے بچے کے ضائع ہونے کی روک تھام کی جاسکتی ہے۔

☆ پانچ سے سات ماہ میں۔

سیپیا 30 یا 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ ایسی خواتین جن کے رحم کمزور اور غیر مستحکم ہوں اور جن کو مسلسل کئی کئی ہفتوں تک بدبودار ماہواری ہو۔

سیکالے کور (Secale cor) 30 یا 200 چار چار گھنٹے بعد

☆ ایسی مریض خواتین جن میں کی کمی ہو۔

فیرم میٹلیکم 3x تین تین گھنٹے بعد

☆ ابتدائی مہینوں میں اسقاط حمل خصوصاً دوسرے مہینے میں۔

کالی کارب 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ ساتویں مہینے کے بعد اسقاط حمل۔

اوپیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ رحم کے منہ کے سخت ہونے کی وجہ سے حمل کا ضائع ہونا۔

اورم میور نیٹرم 3x ہر تین گھنٹے بعد

☆ دوسرے تیسرے یا چوتھے مہینے میں اسقاط حمل کی عادی خواتین۔

ایس ملفیکا 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ تیسرے مہینے کے دوران کلاٹ والے خون کے اخراج کے ساتھ۔ جس میں تھوڑی حرکت سے بھی حالت بگڑ جائے۔

سینا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ سپرنا غدہ (Thyroid) کی بے قاعدگی کی وجہ سے ہونے والے اسقاط کو روکنے کے لئے۔

تھائی رائیوڈینم (Thyroidinum)

200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ ایسی خواتین جن کو ہشیریا ہو اور ان میں احساس برتری بھی ہو۔

پلائینا (Platina) 1M 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ تیسرے مہینے میں سیاہی مائل خون کے اخراج میں۔

کریازوٹم (Kreosotum) 30 یا

200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ موٹی اور پلپلی خواتین جن کو وقت سے پہلے بدبودار ماہواری ہو۔  
 کلیریا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار

تین مرتبہ

☆ جبکہ خاندان میں دق کی ہسٹری پائی جائے تو علامات کے مطابق کسی دوسری دوا کے ساتھ۔

ٹوبر کو لینم 200 K یا 1M پندرہویں

دن، تین مرتبہ

☆ جبکہ خاندان میں اسقاط حمل کی ہسٹری پائی جائے تو علامت کے مطابق دوا کے ساتھ۔  
 سفیلیم 200 یا 1M پندرہویں دن

تین مرتبہ

ان ادویات کے علاوہ بائو کمک کی کالی فاس 6x کلیریا فاس  
 6x اور کلیریا فلور 6x بھی ہر چار گھنٹے بعد دینا مفید اور موثر  
 ہوتا ہے۔

احتیاط : اگر دردیں اور خون آنا شروع ہو جائے تو مریضہ کو مکمل آرام کرنا چاہئے اور  
 ایمرجنسی کی صورت میں سپتال لے جانا چاہئے۔ ایسی صورت میں جبکہ ماہواری رکے چند ہی دن  
 گزرے ہوں تو درج ذیل آزمودہ نسخہ استعمال کرایا جاسکتا ہے جو بیشتر کیسوں میں بڑا کامیاب  
 ثابت ہوا ہے۔

گوسی پیم Q + ہلٹائلا Q + سکیلے کار Q کے برابر برابر 40 قطرے تین چار روز تک ہر  
 روز چار مرتبہ دینے سے بہتر نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔





## مشت زنی (زنانہ)

### Masturbation (female)

بعض عورتوں کو بھی مشت زنی کی عادت بد پڑ جاتی ہے جس کے نتیجے میں عصبی کمزوری، سر درد، دنیا سے بے زاری، اداسی اور نملینی، افسردگی، چڑچڑاہٹ، بد مزاجی جیسی خامیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہسٹیریا، رعشہ، مرگی، تشنج، سکتہ جیسی تکلیفات بھی جنم لیتی ہیں۔ مشت زنی کی مرکب خواتین کا چہرہ زرد، جلد خشک آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، کمزور دلی پتلی ہونٹ پیلے اور دانت خراب ہوتے ہیں۔ آنکھیں دھندلی اور سرخ ہو جاتی ہیں۔

اس بری عادت کے نتیجے میں رحم کے سخت ہو جانے یا اس میں سرطان (پھوڑا) بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔

جوان لڑکیوں کا فحش ناول پڑھنا، بری صحبت، عاشقانہ قصے کہانیاں پڑھنا اور سنتا، فحش فلمیں دیکھنا وغیرہ اس بری عادت کے پڑنے کا سبب ہوتے ہیں۔ کیونکہ برے خیالات پیدا ہونے سے شہوانی جذبات بھڑکتے ہیں اور عضو مخصوص میں خراش پیدا ہونے سے یہ بری عادت پڑتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ اندام نہانی میں شدید خارش کی وجہ سے مشت زنی کی عادت۔ رات کے وقت زیادہ۔ ماہواری کے دوران بہتر ہو۔

زخم، ٹیٹلیکم 30، چار گھنٹے بعد

☆ رحم اور اندام نہانی میں ہلکی سی خارش کی وجہ سے مشت زنی کی عادت۔

کیلڈیم 30 S یا 200، دو گھنٹے بعد

☆ شرمیلی اور زودرنج مریضہ۔ مشت زنی جس کے نتیجے میں لیکوریا اور ہسٹیریا (باؤگولہ) کی بد نظمی ہو جائے۔

پلساٹیل 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

☆ جنسی افسردگی، مشت زنی کی وجہ سے۔ عیاشی اور ظاہری تسکین کی لہر پیٹ کی طرف ریگے یا بڑھے۔ احساس برتری ہو۔

پلاٹینا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ جنسی خیالات آئیں۔ بظاہر میں خارش کی وجہ سے مشت زنی۔

ملفر 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ مٹ زنی کے اثرات بدضائع کرنے، جنسی افسردگی رفع کرنے اور چہرے سے احساس شرمندگی کے آثار مٹانے کے لئے۔

☆ بہت زیادہ بڑھی ہوئی جنسی خواہش کی وجہ سے مٹ زنی کی عادت۔  
شیخی سیکریا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ زہنی طور پر رنجیدہ۔ اندام نہانی خشک اور درم آلود۔ رحم میں شدید خارش کی وجہ سے مٹ زنی۔  
اور لیگنیم 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ بائو کیمک کی گلیکیریا فاس 3x اور نیزم میور 12x بھی مفید  
نیزم میور 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
ادویات ہیں۔

☆ دیگر اہم ادویات : ایسڈ فاس، فاسنورس، لیکے سس،  
جلی میم اور ٹوبرکولینم وغیرہ۔

## جنسی خواہش

### Sexual Desire (female)

(See masturbation and Nymphomania also)

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ مریضہ اپنے پوشیدہ اعضاء دکھانے میں شرم محسوس نہ کرے۔ بے حیا ہو جائے۔ بدتمیز اور غیر منذب ہو اور خرافات کہے۔ بے حیائی کی باتیں کرے۔

ہائوسامس (Hyoscyamus) 200  
10 مٹ بعد، تین مرتبہ

☆ ماہواری کے ایام کے دوران بہت زیادہ جنسی خواہش ہو۔  
سٹرامونیم 200 یا 1M 10 مٹ بعد  
تین مرتبہ

☆ اندام نہانی کے خشک ہونے کی وجہ سے مباشرت کرنے سے گریز کرے۔  
نیزم میور 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ اعضاء مخصوصہ میں کھلبلی ہو۔ بے چینی ہو۔ جنسی خواہش ہو۔ جنسی جذبات بھڑکیں۔

بغلگیر ہونے کی خواہش ہو۔

ایگری کس مس 30 یا 200 چار گھنٹے

بعد

☆ ناقابل برداشت جنسی خواہش۔ شدید خواہش جماع خاص طور پر غیر شادی شدہ جوان لڑکیوں میں۔ ہر کسی سے بغل گیر ہونے کی خواہش کرے۔

پلاٹینا 200 یا 1M 10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ بڑھتی ہوئی جنسی خواہش کے ساتھ لیکوریا۔

سپیا 200 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ پلاٹینا سے افادہ نہ ہونے کی صورت میں۔ شرمگاہ کو دکھانے میں کوئی حجاب نہ کرے۔ ناقابل برداشت جنسی میلان۔ جلدی سے جماع کے لئے تیار ہو جائے۔

فاسفورس 200 یا 1M 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ نازک مزاج، زودرنج ٹھنڈ محسوس کرنے والی مریضہ۔ جس کو پیاس نہ لگے۔ تمنائی پسند ہو اور کھلی ہوا پسند کرے۔ بغلگیر ہونا چاہے۔

پلساٹا 200 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ شرمگاہ میں کپڑے ہوں جن سے کھجلی ہو۔ اندام نہانی کو کھجانے کی وجہ سے جنسی خواہش شدید ہو اور بڑھے۔

کیلڈیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ اعضاء مخصوصہ کو ذرا سا بھی چھیڑے جانے سے جنسی خواہش بڑھ جائے۔

میوریکس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد





## بانجھ پن Sterility

بانجھ پن سے مراد اولاد پیدا نہ ہونا ہے۔ بانجھ پن کے چند اہم اسباب رحم کا ٹل جانا، رحم کی رسولی، حیض کا کثرت سے آنا یا نہ آنا۔ رحم کا چھوٹا ہونا، خصیت الرحم میں پیدا کنی نقص ہونا، رحم کی گردن یا منہ کا بند ہونا، اندام نہانی کی سوزش یا بند ہونا وغیرہ ہیں۔ بہت زیادہ موٹاپے یا بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے بھی بعض دفعہ بانجھ پن ہو جاتا ہے۔ آتشک اور سوزاک جیسے موذی مرض بھی اس کا سبب ہوتے ہیں۔ شوہر کے جراثیم اور بیوی کے بیضے میں ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بھی اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے۔ لیکوریا اور خراشدار پانی کا اخراج بھی بانجھ پن کا سبب ہو سکتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ کئی بار اسقاط حمل ہو چکا ہو رحم میں تناؤ اور کچھاؤ۔ درد زہ تیز قسم کا ہوتا ہو۔
- ☆ کالوفانلم 30 چھ گھنٹے بعد
- ☆ پر درد حیض اور رحم سے خون زیادہ خارج ہونے والے کیسوں کے لئے۔ مثانہ کی گردن پر ایسا محسوس ہو جیسے سوچی ہوئی ہو۔ پیشاب گزارنے کے لئے خواہش اور کوشش کرنی پڑے۔
- ☆ میلا (Mitchella) Q چار گھنٹے بعد
- ☆ رحم کا عمل درست کرنے کے لئے۔ کرم میں درد ہو۔ رحم اور خصیت الرحم میں دباؤ ڈالنے والا درد۔ کانٹے پھاڑنے والا اور دباؤ ڈالنے والا درد۔ مثانہ میں سوزش اور جلن ہو۔ مثانہ میں اکثر اوقات درد ہو۔ مثانہ کی گردن پر دبانے والا درد ہو۔
- ☆ یونیورسٹری پر فوٹیم 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ خصیت الرحم کا عمل درست کرنے اور خوشگوار احساس بردھانے کے لئے۔ خاص طور پر لمبی، دلی پتلی اور حساس خواتین کے لئے۔
- ☆ فاسفورس 200 پندرہویں روز، تین مرتبہ
- ☆ قلیل مقدار میں حیض ہوں۔ پہلی رنگت کے حیض۔ تاخیر سے ہوں یا بعض اوقات کئی کئی مہینے گزر جائیں۔ قبض رہتا ہو۔ جلد غیر صحت مند ہو۔ کوئی زخم ہو تو جلدی مندمل نہ ہو۔ ایگزیرما ہو جاتا ہو۔ منہ کے کونے اور پلکیں پھٹ جاتی ہوں۔
- ☆ ہلیم میٹلیکم 30 چھ گھنٹے بعد
- ☆ کسی طبی تبدیلی کے بغیر یا بانجھ پن ہو۔

مینڈراگورا (Mandragora) 30 چار گھنٹے بعد



☆ پیدائشی اعضاء کی عملی کمزوری رفع کرنے کے لئے۔ حمل ٹھہرنے کے تھوڑے عرصے بعد ہی اسقاط ہو جائے۔ تحلیلوں کا پُر درد حیض ہو۔

☆ وائبرٹم اوپولس Q یا 6 چار گھنٹے بعد جب پیپ دار رطوبت (لیکوریا) اور تیزابی مادہ کے اخراج کی وجہ سے حمل نہ ٹھہرتا ہو۔ وہ مادہ تولید کے جڑوے کی حرکت کو روک دیتا ہو۔ مریضہ ایسا محسوس کرے کہ اندام نمائی سے گرم پانی بہہ رہا ہو۔ ماہواری کثرت سے پہلے، دیر تک رہنے والی اور درد بھری ہو۔ رحم کی گردن سے پانی بہنے کے مزمن کیس کے لئے۔

بوریکس 30 چار گھنٹے بعد

☆ اوپر بیان کی گئی علامات کے لئے بائیو کیمک کی بہترین دوا۔

نیزم فاس 6x چار گھنٹے بعد

☆ ہر مرتبہ جماع کے بعد ہیمنے آئے۔ نیند اڑ جائے۔ اور سخت قسم کی کمزوری کا احساس ہو۔ حیض وقت سے پہلے اور کثرت سے ہوں اور دیر تک جاری رہیں۔ تیزابی، کریم کی طرح کا لیکوریا ہو جو دن رات جاری رہے۔ موٹی اور چلی مریضہ کے لئے۔

گلکیریا کارب 200 یا 1M پندرہویں

روز، تین مرتبہ

☆ خستہ الرحم میں زخم یا سوزش ہو اور وہ سخت یا اکڑی ہوئی ہوں۔ البیومن کی طرح کا تیز اور جلن پیدا کرنے والے مادہ کا اخراج۔ رحم اور خستہ الرحم میں تشکن اور جلن دار درد ہو۔ جنسی خواہش کمزور ہو۔ حیض سے پہلے اور بعد میں چھاتیاں سوج جائیں اور درد ہو۔ کسی طرف سر گھمانے سے چکر آئیں۔

کونیم میک 200 پندرہویں روز، تین

مرتبہ

☆ پاخانہ قبض سے ہو۔ دوران حیض شدید درد ہو جو کہ مقعد اور چڈے کی طرف بڑھے۔

گریفائٹس 30 یا 0/5 چھ گھنٹے بعد

☆ رحم میں ناطاقتی ہو۔ حیض قلیل اور تاخیر سے ہوں۔ کمر میں اور کمر کے مہروں کے قریب شدید قسم کا درد محسوس کرے۔

گوسی پیم Q 5-10 قطرے، چار گھنٹے

بعد

دیگر اہم ادویات : شیئی یگریا، کالی کارب، سفینیم، تھو جا oc اورم، میلیکم، ٹوبرکولینم، سیکالے کار، کالی برومانڈ، میڈورنیم، کیومیلا، لیلیم ننگ، پلائینا، ہلساٹیل، تھائراڈیم، سلیکس ٹنگ، اشوکا، سلفر، نیزم میور، برٹاکارب، ایس ملیکا، وغیرہ۔

## رعشہ (پٹھوں میں کھپاؤ)

### Chorea

(Involuntary movements of muscles)

(See nervousness also)

رعشہ کے مرض میں تمام جسم یا اس کے کسی حصے یا عضو کے اختیاری عضلات میں غیر ارادی اور غیر منظم حرکت ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ بیماری ہاتھ پاؤں اور چہرے کے عضلات میں ہوتی ہے اور اس قسم کی حرکت نیند کی حالت میں واقع نہیں ہوتی۔

اس مرض کی ابتدا میں کسی عضو یعنی ہاتھ پاؤں یا چہرے پر دشمنی حرکت ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتی اور پھیلتی جاتی ہے اور ٹانگ، بازو، جسم کا نصف حصہ یا تمام جسم کانپنے لگتا ہے۔ مریض کھڑے ہوتے ہوئے لڑکھڑانے لگتا ہے۔ کسی چیز کو اٹھاتے ہوئے ہاتھ میں جھٹکا پڑتا ہے۔ بازو اور ٹانگ وغیرہ ہلے رہتے ہیں۔ مریض ٹانگ گھسیٹ کر چلتا ہے۔ مریض کا ہاتھ کچھ کھاتے ہوئے یا منہ میں کچھ ڈالتے ہوئے منہ کے بجائے سر کے اوپر چلا جاتا ہے۔ مریض ہاتھ اٹھا کر انگلیوں کو سیدھا اور متوازی نہیں رکھ سکتا۔ مرض کے شدت اختیار کر جانے پر مریض کو اپنی حرکات پر اختیار نہیں رہتا گویا وہ اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق اعضاء کو حرکت نہیں دے پاتا۔ غرض یہ کہ مریض کے لئے چلنا پھرنا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے۔

یہ مرض عموماً "دس سال سے اوپر کی عمر کے بچوں کو زیادہ ہوتا ہے مردوں کی نسبت مستورات اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ اکثر یہ مرض موروثی ہوتا ہے علاوہ ازیں فتور حیض، ہسٹریا، جلن کی عروق، وجع المفاصل، کثرت چائے نوشی اور شراب نوشی وغیرہ بھی اس مرض کے اسباب ہیں۔ عصبی مزاج والدین اور باؤگولہ کی مریضہ عورت کے بچوں میں اس مرض کے لاحق ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ سر کا آگے پیچھے حرکت کرتے رہنا۔ اندھیرے سے خوف یا ڈر۔
- ☆ سر اموئم 200 یا 1M چھ گھنٹے بعد
- ☆ درد اور سُن ہو جانے کے ساتھ کسی عضو کا ہلنا۔
- ☆ آسینوڈا 30 چھ گھنٹے بعد
- ☆ عضو پر قابو نہ رہے۔ اعضاء کا ہلنا۔ سوتے ہوئے زیادہ ہو۔ اعضاء میں کھپاؤ اور تباؤ۔
- ☆ کاشی کم 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ بازو اور ٹانگوں میں جھٹکے۔

مائی گیلی (Mygale) 200 'ہفتہ وار'  
تین مرتبہ

☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والے مریض۔ کمزور۔ ٹھنڈ سے تکلیف بڑھے۔  
زکم فاس 30 'چھ گھنٹے بعد

☆ ہاتھوں کا کپکپانا۔ بہت زیادہ پسینہ جس کے بعد بھی آرام نہ آئے۔  
مرکیورس سال 30 یا 200 'چھ گھنٹے  
بعد

☆ جذبات و احساسات کو نہیں لگنے کی وجہ سے رعبہ۔ خاص طور پر چہرے کے پٹھوں میں۔  
دھوکے سے اور زیادہ تکلیف ہو جائے۔

اگنیشیا 200 'چھ گھنٹے بعد

☆ بہت دبلا پتلا اور اکھڑ۔ سوتے ہوئے کچھ بہتر ہو۔  
ار جنٹم ٹائٹریکیم 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی کالی فاس 6x اور گنیشا 6x ہر چار گھنٹے بعد۔





## کینسر (مختلف اعضاء کا)

### Cancer Of Different Organs

اس مرض میں جسم کے کسی حصے کے خلیات بڑھ کر رسولی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یہ رسولی کچھ عرصے کے بعد درمیان میں سے گلنا شروع ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ایک زخم بن جاتا ہے۔ سرطان کی جگہ کے اطراف کے گلیٹنڈ بڑھ جاتے ہیں اور سخت ہو کر وہاں بھی کینسر کی علامات پیدا ہونے لگتی ہیں کینسر کے خلیات خون اور لعف کی ٹالیوں کے ذریعے جسم کے دوسرے حصوں میں پہنچ کر نئی رسولی پیدا کر دیتے ہیں۔ عام طور پر مسوڑھوں، معدے، جگر، پیسٹوں، چھاتی، ہڈیوں، بڑی انتڑی اور بچے دانی میں کینسر بنتا ہے خون کا کینسر بھی ہوتا ہے جس کا واحد علاج خون کی تبدیلی ہے۔ کثرت شراب نوشی، سگریٹ نوشی، پان خوری اور دیگر قسم کی نشہ آور اشیاء کا استعمال اس مرض کا خاص سبب ہیں۔ مختلف اور مخصوص اعضاء کے کینسر کے لئے جو دوائیں نہایت مفید ہیں ان کو ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ جب مریض کی تمام علامات متعلقہ دوا سے مناسبت و مطابقت رکھتی ہوں تو اس کے مطابق وہ دوا دی جائے اور دوا دہراتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لیا جائے۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ پیسٹوں کے کینسر کے لئے۔ نیند میں شہوانی اور بدکاری کے خواب آئیں جس سے پرسکون طور سے نہ سو سکے۔

کوبالٹم (Cobaltum) 30 تین گھنٹے

بعد

☆ مٹانے اور چھاتی کا کینسر۔ بلوغت کی عمر میں مہاسے اور پھنسیوں کی شدید تکلیف۔

اسٹریاس

(Asterias rubens) 30 یا 200

تین گھنٹے بعد

☆ کالی رطوبت کی مسلسل ترقی کے ساتھ معدے کا کینسر

کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph)

30 تین گھنٹے بعد

☆ فوطوں کا کینسر۔

کیڈمیم فاس (Cadmium Phos)

30 یا 200 تین گھنٹے بعد



- ☆ پتے اور ہڈیوں کا کینسر خاص طور پر نچلے جڑے اور پنڈلی کی بڑی ہڈی کا کینسر۔  
فاسفورس 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد
- ☆ مچلی آنتوں کو متاثر کرنے والا کینسر جس میں آنت سرک جائے یا گر جائے۔  
روٹا 6 یا 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ خود کو پہلے کینسر رہا ہو یا خاندان کی ہسٹری میں کینسر کا کیس پایا جاتا ہو۔  
کاری نو سین (Carcinocin) 200  
یا 1M 'پندرہویں روز' تین مرتبہ
- ☆ اندام نہانی یا غدود کا کینسر۔ پیشاب پر قابو نہ پاسکے۔ جب لیٹے تو مسلسل پیشاب کا قطرہ نکلتا رہے۔  
کریازوٹ 30 'تین گھنٹے بعد
- ☆ ہڈی اور ہڈی کے غلاف کا کینسر خاص طور پر جوڑوں کی ہڈی کا کینسر۔  
سمفائٹم (Symphytum) 6 یا 30  
تین گھنٹے بعد
- ☆ کسی مرض میں بار بار مبتلا ہونے کے رجحان میں کینسر کی علامات۔  
سٹرائکچنم (Strychninum) 200 یا  
1M 'پندرہویں روز
- ☆ گردن کے غدودوں کا کینسر۔ مریض ٹھنڈ سے بہت زیادہ حساس۔ مختلف اعضاء میں ٹھنڈک کا احساس۔  
سٹس کناڈنس (Cistus Can) 30  
تین گھنٹے بعد
- ☆ جب پھوڑا ناسور میں تبدیل ہو رہا ہو اور اس میں شدید جلن اور بے چینی ہو۔  
آرسنک البم 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ معدے، بظلوں، جاتگوں اور خوراک کی نالی کا کینسر۔ منہ کے کناروں کی پھٹن میں درد۔  
کانڈوراگو (Condurango) 30 یا  
200 'تین گھنٹے بعد
- ☆ متاثرہ جگہ میں سے زہریلا مادہ نکالنے کے لئے۔  
سلیسیا 12x یا 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ چہرے کا کینسر۔ ویکسی نیشن کے مضر اثرات۔ بہت جلدی تحکک اور لاغری۔  
تھوجا OC 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد
- ☆ معدے کے زیریں حصے کے چھید، بارہ انگشتی آنت اور اندھی یا کالی آنت کا کینسر۔

بارہ انگشتی آنت میں کھچاؤ کے ساتھ شدید درد۔

اورنی تھوکیلیم (Ornithogalum)

Q یا 6' تین گھنٹے بعد

☆ کینسر والا السر خاص طور پر لمیرا کے دبائے جانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا۔

چینینم سلف (Chininum Sulph)

30 یا 200' تین گھنٹے بعد

☆ گدی، گردن اور رحم کی گردن کا کینسر۔ جس میں سے آسانی سے خون بنے۔ پشت کے ساتھ پانی اگلنے کا سا احساس۔

اسٹی لاگو (Ustilago) Q یا 6' تین

گھنٹے بعد

بیرونی استعمال کے لئے ہائپریمکم (Hypericum) لوشن بہت مفید ہے۔



# خون کی کمی

## Anaemia

اس مرض میں جسم کی حرارت نارمل سے کم رہتی ہے۔ خون کے سرخ جراثیم (ہیموگلوبن) کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ مریض تھوڑی سی محنت سے تھک جاتا ہے۔ ہاتھ اور ٹانگیں ٹھنڈی رہتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہے۔ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے پڑ جاتے ہیں۔ بھوک مر جاتی ہے گیس بنتی ہے۔ مریض جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر کھڑے رہنے سے پاؤں پر ورم آجاتی ہے۔ دل زور زور سے دھڑکتا ہے۔ چکر آنے لگتے ہیں۔ طبیعت ست اور پشمرہ رہتی ہے۔

خونی بواہر 'زیادہ حیض' کسی وجہ سے خون کا بہت زیادہ اخراج، پرانی پیمپش اور دست، بد ہضمی اور قبض وغیرہ کے علاوہ کوئی ایسی بیماری جس میں خون پیدا کرنے والے اعضاء میں خرابی پیدا ہو جائے اور ناکافی غذا اس مرض کے عام اسباب ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ لہجے اور لگاتار لمبیے کے بعد خون کی کمی۔ اچھی خوراک کھانے کے باوجود لاغری ہوتی جائے۔ شدید پیاس۔ دل ڈوبے۔ اس بات کی خواہش بڑھے کہ کوئی اس کو تسلی دے۔ مزہ نمک کھانے کی خواہش بڑھے۔

نیزم میور 6x یا 30 ہر چار گھنٹے بعد

☆ ملکہ اور سبز یرقان جس سے چہرہ زرد ہو جائے اور خون کی کمی ہو۔ خصوصاً جوان لڑکیوں میں۔

کلیریا فاس 6x ہر چار گھنٹے بعد

☆ موٹے اور پلپے لوگوں میں خون کی کمی، تاہم ہونے والی چیزوں کے کھانے کی خواہش کریں۔

کلیریا کارب IM ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ جنسی کاموں میں پڑنے کی وجہ سے خون کی کمی۔

ایسڈ فاس 30 ہر چار گھنٹے بعد

☆ بڑھنے والی اور تباہ کن حد تک خون کی کمی۔ دماغی تھکن اور جنسی خواہشات بڑھی ہوئی۔

بیکریک ایسڈ 30 ہر چار گھنٹے بعد

☆ آئرن زیادہ مقدار میں لینے کے سبب کمیء خون۔ ماہواری میں بے قاعدگی۔ پیاس کم یا بالکل ختم ہو جائے۔ کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں بستر محسوس کرے۔

ہیماٹیل 30 ہر چار گھنٹے بعد

☆ سخت کمزوری اور تمام بدن میں تپکن کا احساس۔ نرم نبض۔ دل کا ڈوبنا۔ مریض کی 3 بجے رات حالت زیادہ خراب ہو۔

کالی کارب 30 یا 200 ہر چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ حیاتی عروق کے ضائع ہونے، خون ضائع ہونے اور زیادہ ماہواری ہونے۔ منی ضائع ہونے اور پیچش ہو جانے کی وجہ سے خون کی کمی جس سے شدید کمزوری ہو جائے۔ ٹھنڈ میں تکلیف بڑھ جائے اور کمزوری سے اونگھ آنے لگے۔

چائنا 6 یا 30 ہر چار گھنٹے بعد

☆ کاروباری یا زیادہ پڑھنے لکھنے والے لوگوں میں خون کی کمی۔ زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرنے کی وجہ سے اور تحریک دینے والے زیادہ مشروبات پینے کی وجہ سے مثلاً "چائے۔ کافی یا شراب وغیرہ۔

نکس دامیکا 30 ہر چار گھنٹے بعد

☆ پورے طور پر سانس نہ آنے کے ساتھ خون کی کمی مریض سیدھا لیٹ کر بہتر محسوس کرے اور گرم جگہ پر۔ موسم گرما میں بھی گرم کپڑے پہننا پسند کرے۔

سورنیم 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ دھڑکن اور سانس کی کمی کے ساتھ خون کی کمی۔

سٹرو فینٹس (Strophanthus) Q

10-5 قطرے، ہر چار گھنٹے بعد

☆ ذرا سی محنت سے سانس لینے میں دقت ہو۔ اچانک یکدم چہرہ سرخ ہو جائے جس میں چہرے کے کچھ حصے پر زردی چھا جائے اور سوجن اور اونگھ آنے لگے۔

فیرم میٹلیکم 3x یا 6 ہر چار گھنٹے بعد

☆ کافی دیر تک اعصابی تناؤ کے بعد خون کی کمی۔

فاسفورس 200 ہر تین گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ بہت زیادہ فکر بندی اور پڑمردگی کے بعد خون کی کمی۔ میسرے یا کسی قسم کے زہر کے اثرات بد کی وجہ سے۔ بے چینی اور جلن شدید پیاس۔ پانی کے گھونٹ جلدی جلدی لے۔

آرسنک البم 30 ہر چار گھنٹے بعد



# ادھرنگ / فالج

## Paralysis

(of different body parts)

ادھرنگ یا فالج کے مرض میں جسم کے کسی خاص یا بعض حصے کی حس یا حرکت یا دونوں زائل یا ناقص ہو جاتی ہیں۔ یہ مرض سارے جسم، نصف جسم، طولانی یا کمرے نچلے دھڑ میں یا صرف چہرے پر پڑ سکتا ہے۔ بعض اوقات اس مرض کا حملہ اچانک ہوتا ہے۔ اچھا بھلا آدمی صبح کو سو کر اٹھتا ہے، ہلکے سردرد کے بعد ایک دو مرتبہ قے آتی ہے اور مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ماؤف جانب کے ہاتھ پاؤں بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ کو اٹھا کر چھوڑ دیا جائے تو خود بخود گر پڑتا ہے۔ چہرے پر لقوے کے حملے کی صورت میں تندرست حصے کی جانب تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور زبان بیمار جانب قدرے مڑ جاتی ہے۔ کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ اگر مرض جلد رفع نہ ہو تو مفلوج حصہ لاغر اور سرد ہو جاتا ہے۔ مریض کے ہوش و حواس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ قبض ہو جاتا ہے۔ مریض کے لئے بغیر سارے کے چلنا پھرنا یا کوئی کام کرنا قریباً ممکن نہیں رہتا۔ ہاتھ پاؤں ہلانا چلانا محال ہو جاتا ہے۔ یہ مرض رعشہ، دماغ میں پھوڑے یا رسولی، مرگی، باؤگو لے یا آتشک کے سبب لاحق ہوتا ہے۔ یہ مرض عام طور پر بائیں جانب زیادہ ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ انتڑیوں کا فالج۔ اچانک علامات تبدیل ہوں۔  
 فاسفورس 200 '10 منٹ بعد، تین مرتبہ
- ☆ اعصاب کا فالج۔ جس کے نتیجے میں بھاری پن کا احساس ہو اور حساسیت بھی متاثر ہو۔  
 سخت بے چینی ہو۔  
 روہس ٹاکس 200 'چار گھنٹے بعد
- ☆ مریض انتہائی تڑھال اور پڑمردہ ہو جائے۔ چہرے اور آنکھوں کی پلکوں کا فالج۔  
 کیڈمیم سلف 200 '10 منٹ بعد، تین مرتبہ
- ☆ ہچکچاہٹوں اور ہاتھ پاؤں کا فالج جس میں کسی قسم کا درد نہ ہو۔  
 لوروسیریس (Laurocerasus) 30  
 یا 200 'چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

- ☆ خوف رنج اور صدمے کے اثرات بد۔ زبردست کمزوری اور نقاہت بازوؤں کا فالج۔  
 نیٹرم میور 200 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ
- ☆ کلائی یا واحد پٹھے کا فالج جو سکڑنے یا مرجھانے لگے۔ پھیلانے والے پٹھے میں فالج شروع ہوتا۔  
 ہلیم میٹلیکم 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد
- ☆ صدمے اور حادثے کے بعد کے اثرات۔ غیر حساسیت خاص طور پر دماغ کی۔  
 اوپیم 1M یا اوپر کی طاقتیں '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ
- ☆ چلتے ہوئے پاؤں لڑکھڑائیں اور کپکپائیں۔ اعصاب میں کھینچنے والے درد۔ چہرے کا فالج۔  
 نکس وامیکا 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد 'تین مرتبہ
- ☆ بوڑھے لوگوں کا فالج۔ جو ٹھنڈ سے متاثر ہونے کی رغبت رکھتے ہوں اور پگاندہ قسم کا برتاؤ کرتے ہوں۔  
 برشا کارب 200 یا 1M '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ
- ☆ کسی واحد عضو کے حصے 'مٹانے' گلے کے آلات صوت وغیرہ یا زبان کا فالج۔  
 کاشی کم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد 'چھ مرتبہ
- ☆ لاتوں کا فالج جو بڑھتا جائے۔ شدید کمزوری۔ 'تھکن' تمام جسم پر بھاری پن کا احساس۔  
 پیکری ایسڈ 30 'چار گھنٹے بعد
- ☆ نیچے سے اوپر کی جانب پھیلنے والا فالج خاص طور پر کنوارے مردوں اور عورتوں کے لئے۔  
 کوئیم میک 200 یا 1M '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ
- ☆ پلکوں اور آلہء صوت کا فالج۔ پٹھے کام کرنا چھوڑ دیں۔  
 بیلی میم 30 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ
- ☆ ایک جانب کا فالج جبکہ دوسری جانب تشنج اور اینٹھن ہو۔ اندھیرے سے ڈر لگے۔  
 سٹرامونیم 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد

☆ مریض جسم کے کسی حصے پر کوئی بھی چیز برداشت نہ کر سکے۔ دماغ کا فالج۔ بائیں جانب کا فالج۔

لیکے سس 200 '10 منٹ بعد، تین

☆ آنکھوں کے پٹھوں کا فالج۔ چہرے کے بائیں جانب کا فالج۔ چہرے میں گرمی کا احساس۔  
سینکا (Senega) 30 'چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی گلکیریا فاس 6x کالی فاس 6x اور میکینشا فاس  
6x بھی فالج کی مفید ادویات ہیں۔



## مرگی

## Epilepsy

اس مرض میں بے ہوشی اور مکمل غشی کا دورہ پڑتا ہے۔ اختیاری عضلات اکڑ جاتے ہیں۔ آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کو چڑھ جاتے ہیں۔ رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ قوائے حس و حرکت جواب دے جاتے ہیں۔ منہ سے جھاگ آنے لگتا ہے۔ مریض بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے۔ پیشاب پاخانہ بھی خطا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مریض کی زبان دانتوں کے درمیان آکر کٹ جاتی ہے۔ اس مرض کے دورے عام طور پر ہفتوں مہینوں اور لمبے وقفوں کے بعد پڑتے ہیں۔ بعض اوقات یہ دورہ چلتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے اچانک پڑ جاتا ہے۔ اس لئے اس کے مریض کو آگ، پانی، دریا اور کنوئیں کے قریب نہیں جانے دینا چاہئے۔

عام طور پر یہ مرض موروثی ہوتا ہے۔ زیادہ رنج و غم، زیادہ دماغی محنت، جلق، دماغی صدمہ، آتشک، زیادہ شراب نوشی، سمیت خون سرکی چوٹ اور دماغ میں پھوڑا بھی اس مرض کے اسباب ہیں۔

## علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے مرگی کا دورہ۔

نیزم سلف 200 یا 1M پندرہویں روز،  
تین مرتبہ

☆ رات کو نیند کے دوران مرگی۔

بفورانا (Buforana) 30 یا 200  
چار گھنٹے بعد، چھ مرتبہ

☆ ماہواری سے پہلے زیادہ مرگی۔

اونٹنہ کروکٹا (Oenanthe Cro)  
30 چار گھنٹے بعد

☆ معدے کے درم کے ساتھ۔ حملے کے دوران انگوٹھے اندر کی جانب مڑ جائیں۔ جھٹکے یا  
چھیڑنے سے تکلیف بردہ جائے۔

سکونا 30 V چار گھنٹے بعد

☆ کیڑوں کی وجہ سے۔ ناک اور مقعد میں درد۔

سائنا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ



☆ ماہواری میں بے قاعدگی کی وجہ سے۔

سیڈرون (Cedron) 200 ہفتہ وار  
تین مرتبہ

☆ چاند کے دورانوں میں ششی اثرات۔ پنوں میں تناؤ۔ دورے وغیرہ۔ اگیوں اور  
انگوٹھوں سے شروع ہو۔

کوپریم میٹلیکم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ آبلوں اور چھالوں وغیرہ کے دب جانے کے بعد۔

اگریکس مس (Agricus m) 30 یا  
200 چار گھنٹے بعد

☆ کسی خوف یا ڈر سے۔ لوگوں کو دور پرے کرے یا بے حس ہو جائے۔

اوپیم 200 یا 1M چھ گھنٹے بعد تین  
مرتبہ

☆ محبت میں ناکامی یا کسی صدمے کی وجہ سے۔

اکنیشیا 200 یا 1M چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی کالی میور 6x کالی فاس 6x اور گنیشیا فاس 6x  
چار گھنٹے بعد۔ شدید حملے کی صورت میں مذکورہ ادویات مختصر  
وقفے کے بعد بھی دی جاسکتی ہیں۔



# رسولی کے امراض

## Affections of Tumours

رسولی دو قسم کی ہوتی ہے : لائی پوما (Lipoma) اور فائبروما (Fibroma)۔ لائی پوما عام طور سے جلد کے نیچے چربی دار نرم گوشت کی ہوتی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ یہ مختلف سائز کی اور گول ہوتی ہے۔ اس کے اطراف میں کیپسول ہوتا ہے۔ اسی لئے ہلانے سے حرکت کرتی ہے۔ فائبروما رسولی ملحقہ گوشت سے جڑی ہوتی ہے اور ذرا سی سخت ہوتی ہے۔ یہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ لیکن یہ زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کی رسولی کینسر میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لئے اس کے علاج پر فوری توجہ دی جانی چاہئے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ جلد پر سخت رسولی ہو۔

مینگنم اسیکیم

'30 (Manganum acaticum)

چار گھنٹے بعد

☆ ناقابل برداشت درد کے ساتھ رسولی ہو۔

سٹرامونیم 200 یا 1M چھ گھنٹے بعد

☆ معدے کی رسولی۔

کالی آیوڈیم 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ رحم کی مملک رسولی۔ آسانی سے خون جاری ہو جائے۔

کروٹیل ہائیڈرس 200 یا 1M ہفتہ

دار، تین مرتبہ

☆ پٹکوں پر ریشہ دار رسولی۔ رحم میں ریشہ دار رسولی۔

ٹیو کریم (Teucrium m.v.) '30

چار گھنٹے بعد

☆ رحم کی ریشہ دار رسولی۔

اشی لاگو (Ustilago) Q یا 30 چار

گھنٹے بعد

☆ کھوپڑی کے اندر رسولی کی بیماری میں مٹی کے بغیر تے ہو۔

فیرم سیٹیلک (Fermi) چار گھنٹے بعد

☆ ماتھے یا پنڈلی کی بڑی ہڈی پر یا کسی اور جگہ رسولی ہو۔  
شلنجیا (Stillingia) Q یا 30 چار

کھٹنے بعد  
☆ جسم کے اندر جلد کے نیچے درد کے بغیر یا درد سے بھری گانٹھیں۔ رسولی اور پھیلنے والا  
درد۔

کوئیم 200 Mac یا 1M ہفتہ وار 7 تین  
مرتبہ

☆ کھٹنے کے اوپر رسولی۔

گلکیریا فلور 12x یا 30 چار کھٹنے بعد

☆ کھوپڑی یا گردن کے قریب رسولی جس سے مادہ خارج ہو۔  
برشا کارب 30 یا 200 چار کھٹنے بعد

☆ غدود سے متعلقہ ایسی جگہ رسولی جہاں غدود نہ ہوں۔  
لیس البم (Lapis alb) 30 چار کھٹنے  
بعد

☆ چھاتی کی ریشہ دار رسولی۔

تھائرایڈیم 200 یا 1M ہفتہ وار 7 تین  
مرتبہ

بایو کیمک کی گلکیریا فاس 6x گلکیریا فلور 12x تھائرایڈیم  
200 یا 1M ہفتہ وار (7 تین مرتبہ) اور سلیسیا 30x بھی مفید  
ادویات ہیں۔



# سوزش غصائے مصلیٰ/پیری ٹونم یا پیٹ کی استری یا جھلی کی سوزش

## Peritonitis

(See fever also)

اس بیماری میں پیٹ کی استری یا جھلی (شکم کی دیوار کی اندرونی سطح پر ہے) میں درم ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی حصہ یا پوری جھلی متورم ہو سکتی ہے۔ پہلے پیٹ کی کسی خاص جگہ درد شروع ہوتا ہے اور پھر تمام پیٹ میں پھیل جاتا ہے۔ پیٹ کے اعضاء اتنے حساس ہو جاتے ہیں کہ ہلنے جلنے، کھانسنے، دبائے، چھونے حتیٰ کہ کپڑا لگنے تک سے درد ہوتا ہے۔ یہ درد گولی لگنے، چھری چبھنے یا نشتر لگنے کا سا ہوتا ہے۔ پیٹ تن جاتا اور لرزے سے تیز بخار چڑھ جاتا ہے۔ قبض ہو جاتا ہے مریض کا جی مٹلاتا اور ابکائیاں آتی ہیں۔ نبض باریک اور تیز چلتی ہے۔ پیشاب میں سوزش ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ مریض ٹانگوں کو پیٹ کی طرف سکیڑے سیدھا لیٹا رہتا ہے۔ زبان خشک سفید ہوتی ہے۔ ہچکیاں آنے لگتی ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ بخار اور جلن کے احساس کے ساتھ غصائے سوزش مصلیٰ حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ لمبے وقفے کے بعد بہت مقدار میں پانی کی پیاس۔

برائی ادویا البم 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد  
☆ جب مریض معدے پر ذرا سا بھی چھوا جانا برداشت نہ کر سکے حتیٰ کہ کپڑے تک برداشت نہ کر سکے۔

لیکے سس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
تین مرتبہ  
☆ غصائے مصلیٰ کے درد کے ساتھ تیز بخار۔ سرد خشک ہوا لگ جانے کی وجہ سے سوزش غصائے مصلیٰ۔

اکونائٹ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد  
☆ پتلے دستوں کے ساتھ بخار۔ بہت زیادہ پسینے کے ساتھ پیپ پڑنے والے مرطے کے لئے۔ بخار کو پسینہ سے بھی کوئی فرق نہ پڑے۔  
مرکیورس سال 30 چار گھنٹے بعد



☆ معدے کے شدید درد اور ورم کے ساتھ۔ مقامی اجتماع تکلیف۔ ذرا سے دباؤ اور چھوٹے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

بیلادونا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ تمام جسم سرد پڑ جائے۔ اعضاء میں تپکن اور کھپاؤ تناؤ۔ مریض ٹھنڈے مشروبات کی خواہش کرے۔ بخار اورتے ہو۔

ورائزم الیم 30 'چار گھنٹے بعد

☆ جب سادہ بخار ثانی فائدہ میں تبدیل ہو جائے۔ زبان خشک ہو۔ زبان کی نوک سرخ ہو۔ شدید بے چینی۔ حرکت کرنے سے بہتر محسوس کرے۔

رہس ٹاکس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

بایو کیمک کی فیرم فاس 6x تین تین گھنٹے بعد دینا بھی بہت فائدہ مند ہے۔



## پیسینہ

### Affections of Sweat

قدرت نے جانداروں کے اجسام سے فضلے اور غیر ضروری مادوں کے اخراج کا خاص نظام یا بندوبست کیا ہے۔ جسم کے مساموں کے ذریعے جو غیر ضروری مادہ اخراج ہوتا ہے اسے پسینہ کہا جاتا ہے۔ پسینہ جسمانی ساخت، محنت، ماحول، آب و ہوا اور تکلیفات کی مناسبت سے کم یا زیادہ آتا ہے۔ پسینے کے کم زیادہ آنے کے اسباب ہوتے ہیں اور جسم کے مختلف اعضاء پر مختلف کیفیات میں کم زیادہ پسینہ آتا ہے۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ صرف ڈھکے ہوئے حصے پر پسینہ آئے۔
- ☆ پسینہ آنے کے دوران بھوک محسوس کرے۔
- ☆ تاغموں پر پسینہ آئے۔
- ☆ پیسے کے ساتھ تے ہونے لگے۔
- ☆ کبھی بھی پسینہ نہ آئے۔ پاخانہ سخت اور قبض کے ساتھ ہو۔
- ☆ عوارض کے بعد کثرت سے پسینہ آئے جس سے سکون ملے۔
- ☆ شدید بھوک کے ساتھ ٹھنڈا پسینہ۔ بازوؤں اور ہاتھوں پر۔
- ☆ جن حصوں میں درد ہو وہاں پسینہ آئے۔
- ☆ گرم پیسے۔ بستر کی گرمی سے زیادہ ہو جائے۔ سو کر اٹھنے پر غارش کے ساتھ پسینہ۔ کسی

بٹلاڈونا 30 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

سکونیڈیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

نیر-ہیتم Q یا 30 چار گھنٹے بعد

کمنڈرا 30 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

ایڈونا 200 یا 0/5 یا اور بڑی طاقت

چھ گھنٹے بعد

سورینم 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

فاسفورک ایسڈ Q یا 30 چار گھنٹے بعد

کالی کارب 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ گرم پیسے۔ بستر کی گرمی سے زیادہ ہو جائے۔ سو کر اٹھنے پر غارش کے ساتھ پسینہ۔ کسی

چیز سے ڈھانپنا برداشت نہ کر سکے۔ ہاتھوں اور پاؤں پر پینہ۔  
لیڈم پال 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ کپڑے پر پسینے کے دھبے پڑ جائیں اور کپڑا اکڑ جائے۔  
سیلیم 30 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ  
☆ چپکنے والا پینہ۔

کینابس انڈیکا 30 یا 200 'چار گھنٹے  
بعد' تین مرتبہ  
☆ کسی قسم کی حرکت کرنے سے پینہ غائب ہو جائے اور گرمی پیدا ہو جائے۔ پیاز کی سی بو  
آئے۔

لائیکو پوڈیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ  
☆ ڈھانپنے پر پینہ اور بہت پیاس اور کمزوری ہو۔

چائنا 6 یا 30 'چار گھنٹے بعد'  
☆ سوائے چہرے کے تمام جسم پر یا کھلے ہوئے حصے پر پینہ۔ ڈھکے ہوئے حصے پر پینہ نہ  
آئے۔ شہد کی سی بو آئے۔

تھوجا 200 یا 1M '10 منٹ بعد' تین  
مرتبہ  
☆ دل کی دھڑکن کے ساتھ۔ بہت زیادہ پینہ اور ہتھوڑے لگنے کا سادرد۔  
لیکے سس 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ بغلوں میں سے لسن کی سی بو آئے۔  
سلفر 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ

☆ صرف سوکر جانے یا اٹھنے کے بعد پینہ آئے۔  
سپیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ

☆ گرمی کے موسم میں بھی بہت کم پینہ۔  
نکس موسکاتا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ موسیقی سن کر ہینہ آئے۔ موسیقی سے لطف اندوز ہو۔

میرٹولا ہسپانیہ 200 'چار گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ

☆ جب ہینہ آ رہا ہو تو کپڑا اتارنا برداشت نہ کر سکے۔

ایتھوزا 30 Cy 'چار گھنٹے بعد'

☆ ٹھنڈا چپکنے والا ہینہ۔ کھانا کھاتے ہوئے ہینہ زیادہ آنے سے شکایات میں اضافہ ہو۔  
کثرت سے ہینہ آنے کے باوجود سکون نہ ملے۔

مرکیورس سال 30 یا 200 'چار گھنٹے  
بعد'

☆ ہینہ جس پر کھیاں بیٹھیں۔

کیلڈیم 30 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ تمام جسم پر ہلکا سا ہینہ۔ خوف اور پریشانی کے ساتھ۔

اکونائٹ 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ

☆ کھلی ہوا میں چلتے ہوئے ہینہ آئے۔ سالے کی سی بو آئے۔

رہوڈینڈرون 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ ٹھنڈا اور یسدار ہینہ۔

ورائزم 30 V 'چار گھنٹے بعد'

☆ جسم کے کسی حصے پر ہینہ آئے۔ ہاتھوں پر ٹھنڈ کے ساتھ اور گردن اور سینے پر بھی۔

فلکیریا فاس 6x یا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ گیس کی شکایت کے ساتھ لگاتار ہینہ آتا رہے۔

کالچی کم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ ٹانگوں اور پاؤں میں ٹھنڈے پسینے۔ مریض بہت زیادہ ذکی الحس ہو۔

ہیبر سلف 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ تپ دق کے مریض۔ پسینے سے کپڑے پر پیلے دھبے پڑ جائیں۔

ٹوبر کولینم 200 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ



☆ جلد میں چھلنے والے احساس کے ساتھ پیند۔

کیومیلا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ ماتھے پر پیند۔ پنکھا جھلنا یا پٹکے کی ہوا لینا پسند کرے۔

کاربوئیج 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ چہرے کے ایک جانب پیند آئے۔ گرمی سے اضافہ ہو جائے۔

ہلسائیل 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ کھانے کے بعد تمام جسم پر پیند آجائے۔ بغلوں میں بھی پیند آئے۔

ٹاکٹرک ایسڈ 30 یا 200 'چار گھنٹے

بعد' تین مرتبہ

☆ چلنے سے پیند کم ہو۔ کپڑے پر پیلے دھبے پڑ جائیں۔

چیلی ڈونیم Q یا 30 'چار گھنٹے بعد'

☆ پیند میں سے سڑے ہوئے گوشت کی سی تیز بو آئے۔

پائرو ہینم 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ



## فربہی / موٹاپا

### Fatness/Obesity

بعض لوگ قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں یا چربی اور نشاستہ دار غذائیں کھانے سے موٹے ہو جاتے ہیں۔ موٹاپا موروثی بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ ادھیر عمری میں موٹے ہو جاتے ہیں۔ خواتین حیض کے موقوف ہو جانے کے بعد اکثر موٹی ہو جاتی ہیں۔ ان وجوہات کے علاوہ جلد کے اندرونی اور زیریں اعضاء کے گرد کثرت سے چربی جمع ہونے کی وجہ سے جسم بھاری اور بے ڈول ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے ہاضمے کی تکلیفات پیدا ہوتی ہیں اور اندرونی اعضاء کے افعال میں بھی خلل یا نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ اکثر موٹے اشخاص جوڑوں کے دردوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ موٹاپے سے بچنے کے لئے مرغن، میٹھی، نشاستہ دار اشیاء۔ چکنائی والی اشیاء اور گوشت اور انجور اور آم وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہئے۔ محنت کے کام اور ورزش کرنا نہایت مفید ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ موٹے مریض جو قبض، ریاچ، تھارائڈ کے غدد کے بڑھنے اور گومز وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہوں۔ جبکہ کلیریا کارب موثر نہ ہوا ہو۔

فوکس (Fucus ves) 10-20 Q

قطرے، چار گھنٹے بعد

☆ پنوں کو سخت اور مضبوط بنانے کے لئے۔ جسم سے گوشت اور چربی کم کرنے کے لئے۔ موٹاپا زیادہ اور گوشت کم ہو۔

کیلوٹروپس (Calotropis) 30 یا

200 چھ گھنٹے بعد

☆ مریض گرم موسم میں تھکا ماندہ محسوس کرے۔ زبان پر سفیدی کی موتی تہہ جی ہو۔ میس یا رتج کی وجہ سے موٹاپا۔

انٹم کروڈم 200 چھ گھنٹے بعد

☆ نئی چربی اور گوشت کے بڑھنے کو روکنے کے لئے۔ غیر معمولی بانٹوں کو جذب کرنے کے لئے۔ (گولیوں کی شکل میں بھی دستیاب ہوتی ہے)

فاسٹولا کا 10-15 Q قطرے، چار گھنٹے بعد

☆ پیلے اور ٹھنڈ محسوس کرنے والے مریض۔ پاؤں ٹھنڈے اور گیلے سے۔ انڈے کھانا پسند کریں۔ سر پر کثرت سے پینہ آئے۔ معدے کے آپریشن کے بعد کا موٹاپا۔ محنت کرنے سے بہت جلدی اور زیادہ تھک جائیں۔ رات کے وقت سر میں زیادہ پینہ آئے۔ مرطوب اور سرد موسم سے بہت زیادہ حساس۔

کلیریا کارب 200 یا 1M 4 گھنٹے بعد

☆ موٹے اور ٹھنڈ محسوس کرنے والے مریض جن کو قبض بھی ہو۔ خصوصاً ایسی عورتوں کے لئے جن کو ماہواری دیر سے شروع ہوئی ہو۔ جلدی بیماریوں کا رجحان رکھنے والے مریض۔ بہت ٹھنڈ محسوس کریں۔ گرمی اور سردی سے جلد متاثر ہونے والے مریض۔ موقوفیء حیض کے دوران موٹاپا۔

گریفائٹس 200 یا 1M ہفتہ وار چھ

مرتبہ

☆ ران اور کولے جسم کے باقی حصوں کی نسبت زیادہ موٹے ہوں۔

امونیم میور 200 چھ گھنٹے بعد

☆ کمزور دل والے موٹے مریض۔ ٹھنڈ سے بہت زیادہ حساس۔ پانی پینا پسند نہ کریں۔ صاف ستھرے نہ رہیں۔ ٹھنڈ لگنے کا رجحان رکھنے والے مریض۔

ایمن کارب 200 چھ گھنٹے بعد

☆ موٹی خواتین کے لئے جو مکمل طور پر تھک چکی ہوں۔ چاہے وہ کوئی کام کریں یا نہ کریں۔ بالکل تھکی ماندہ اور بد حال سی خواتین کے لئے۔

لیک ڈی فلوریٹم 200 ہفتہ وار چھ

مرتبہ

☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والے مریض۔ بچے جو غیر معمولی طور پر لمبے ہو رہے ہوں کے لئے۔

سلیسیا 3x یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ ایسی خواتین جو موقوفیء حیض کے قریب کی عمر کو پہنچ رہی ہوں اور سرد موسم سے بہت زیادہ حساس ہوں۔ ایسے مریض جن کی تلی اور جگر بڑھ گئے ہوں۔

کلکیریا آر سکم 200 چھ گھنٹے بعد

☆ جگر کی تکلیفات کے ساتھ جبکہ زبان پر مستقل طور پر سفیدی کی تہہ جمی ہو۔

کالی میور 30x یا 6 چار گھنٹے بعد

☆ معاون دوا خصوصاً ایسے مریضوں کے لئے جن کا موٹاپا تھارائڈ غدود کی بے قاعدگی یا بیماری کی وجہ سے ہو۔

تھارائڈ نیم 200 یا 1M ہفتہ وار تین

مرتبہ

دیگر اہم ادویات : ایمن برومانڈ، کیسی کم، فیرم، میٹلیکم، آیوڈو تھارائڈ نیم، کالی برومانڈ، کالی کارب اور میڈور نیم وغیرہ۔ بائو کیمک کی کلکیریا 6x نیزم میور 6x اور سلیسیا 30 بھی مفید ادویات ہیں جو چار گھنٹے بعد دی جا سکتی ہیں۔

## حالتِ نزع

Collapse (failure of vital power/sinking)

(See fainting and unconsciousness also)

جسمانی طور پر گہری ناطاقتی/لاغری یا افسردگی میں پڑ جانے کو حالتِ نزع کہا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں فوری طور پر مریض کو طبی امداد دینی چاہئے۔ جب تک مریض کو ضرورت کے مطابق طبی امداد دی جائے اس وقت تک فوری طور پر درج ذیل ادویات میں سے علامات کے مطابق دوا دے دینی چاہئے۔ اسی دوران حالتِ نزع میں جانے کی بنیادی وجہ تلاش یا معلوم کرنی چاہئے تاکہ اصل سبب معلوم کر کے اس کے مطابق صحیح تشخیص و علاج کیا جاسکے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ کسی چوٹ کی وجہ سے حالتِ نزع طاری ہو جانا۔  
آرنیکا 200 یا 1M 'آدھے گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ
- ☆ مرگی کے دورہ پڑنے کے لئے۔  
کوہریم میٹلیکم 30 یا 200 'آدھے گھنٹے بعد'
- ☆ جب اندرونی اور بیرونی طور پر جسم بالکل ٹھنڈا ہو۔ اچانک ہوا لگ جانے سے یا پیسے کے دوران۔  
کمفر Q یا 30 '15 منٹ بعد' چھ مرتبہ
- ☆ لو لگنے یا دھوپ کی تپش کی وجہ سے حالتِ نزع۔  
گلوٹامین 30 یا 200 'آدھے گھنٹے بعد'
- ☆ اگرچہ جسم ٹھنڈا ہو۔ اس کے باوجود مریض ہوا طلب کرے۔  
کاربوونج 30 یا 200 'آدھے گھنٹے بعد'
- ☆ ٹھنڈے پیسے کے ساتھ حالتِ نزع۔  
وٹارم البم 30 یا 200 'آدھے گھنٹے بعد'



☆ اچانک حالت نزع طاری ہو جائے یا خشک ٹھنڈی ہوا لگ جائے یا کسی خوف سے اس حالت کو پہنچ جائے۔

اکونائٹ 200 یا 1M 'آدھے گھنٹے بعد

☆ رطوبات زندگی مثلاً "خون" منی کے بہت زیادہ اخراج کی وجہ سے یا بہت زیادہ تھے اور دستوں کے ہوجانے سے حالت نزع طاری ہو جاتا۔

چائنا 30 'آدھے گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی کالی فاس 6x میگنیا فاس 6x اور نیڑم میور 12x نیم گرم پانی میں ملا کر آدھا گھنٹہ بعد دینا بھی بہت فائدہ مند ہے۔  
مندرجہ بالا ادویات کے علاوہ آرسنک الیم، فاسفورس، کوئیم 'mac ہائیڈروسیانک ایسڈ (Hydrocyanic Acid) اوقیم اور کالوسنتھ بھی بڑی مفید دوائیں ہیں۔



# بے ہوشی

## Fainting

(See collapse and unconsciousness also)

بے ہوشی سے مراد بے حس و حرکت ہو جانا ہے۔ اس کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں۔  
 مدے، چوٹ، خوشی کی خبر، بہت زیادہ کمزوری اور نقاہت، زیادہ خون بہہ جانا، لو لگ جانا، گرمی  
 سے نڈھال ہو جانا، کسی جگہ آکسیجن کی کمی، زیادہ دھواں اور حساس آدمیوں کے لئے زیادہ ڈانٹ  
 ڈپٹ وغیرہ بے ہوشی کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ جس کی وجہ سے مریض بے ہوش ہو کر گر سکتا  
 ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ سخت پسینہ آتا ہے۔ پتلیاں پھیل جاتی ہیں۔ اعصاب تن  
 جاتے ہیں اور جسم اکڑ جاتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ خوف کے بعد یا حادثے وغیرہ کے بعد کے اثرات۔  
 اوپیم 200 یا 1M آدھے گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ خوف یا جذباتیت کی وجہ سے بے ہوشی۔ اعصابی تناؤ۔  
 فاسفورس 200 آدھے گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ بہت زیادہ خوشی یا تفریح کی وجہ سے۔  
 کافیا (Coffea) 200 یا 1M آدھے

گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ غیر معمولی حساس مریض۔ کسی کے گالیاں دینے یا برا بھلا کہنے کے نتیجے میں غصہ آنے پر  
 بے ہوشی۔ شدید اور ناقابل برداشت درد کی وجہ سے۔  
 کیمومیل 200 آدھے گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ اسہال کے بعد۔ رسد ار پھل وغیرہ کھانے سے۔  
 آرسنک البم 200 آدھے گھنٹے بعد،

تین مرتبہ

☆ رطوبات زندگی مثلاً تے اور دستوں کے ذریعے پانی، خون، منی وغیرہ کے بہت زیادہ  
 خارج یا ضائع ہو جانے سے۔  
 چائنا، آدھے گھنٹے بعد

- ☆ پانی کے جہاز یا کسی اور سواری میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ نیند اڑ جانے کی وجہ سے۔  
 کوکولس انڈیکا (Cocculus ind)  
 200 'آدھے گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ 'تفحیک' بے عزتی ہو جانے یا کسی کے روکھے اور سخت برتاؤ کی وجہ سے۔  
 سینفی یگیا 200 یا 1M 'آدھے گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ آپریشن کے بعد کسی صدمے سے۔ شدید ٹھنڈ یا سردی سے۔ کمزوری سے۔ کسی بری خبر کے رنج سے۔  
 وراژم الہم 30 یا 200 'آدھے گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ گیس کی روشنی کے نیچے کام کرنے، سر پر گرمی پڑنے یا لو لگ جانے سے۔  
 گلوٹائین 3x یا 6 'آدھے گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ 'صد' کسی رطوبت کے اخراج کو روک دینے سے۔ گھٹن اور گرم ماحول سے۔  
 لیکے سس 200 'آدھے گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ مایوسی اور ناامیدی سے۔ صدمے اور رنج سے حادثے سے۔ جذبات کے اظہار میں خلل اندازی سے۔  
 اگیشیا 200 یا 1M 'آدھے گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ اچانک خشک سرد ہوا لگنے یا خوف سے۔  
 اکوانٹ 200 '10 منٹ بعد' تین مرتبہ
- ☆ کسی خدشے، ان دیکھے خیال اور خوف، جذباتی کیفیت اور بری خبر سے۔  
 جیلی میم 200 '10 منٹ بعد' تین مرتبہ
- ☆ غصے کے ساتھ جسم یا گوشت سڑے۔ بعض اوقات فصد دہائے جانے سے مریض سکتے ہیں چلا جاتا ہے۔  
 کالوستہ 200 یا 1M '10 منٹ بعد' تین مرتبہ

☆ رونما ہونے والے واقعات کے پیشگی تصور سے اور ان دیکھے خدشات سے۔  
ار جزم تا سترکیم 200 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ

☆ پن اور سوئیوں مثلاً "انجکشن کا خوف۔" ویکسین کے اثرات بد سے۔  
سلیسیا 200 یا 1M '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ

☆ اچانک مالی نقصان کی اطلاع ملنے سے۔ چوٹ کی وجہ سے۔ چھیڑنے یا تنگ کئے جانے سے۔

آرنیکا 200 یا 1M '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ

☆ مرگی کے دورے میں جبکہ حساسیت گھٹنوں سے شروع ہو کر زیریں بطن کی جانب جائے۔  
کوپرم بیسیکیم 30 یا 200 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ

☆ معاون دوا۔

سلفر 200 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ

بائیو کیمک کی کالی فاس 6x اور گنیسا فاس 6x آدھا گھنٹہ بعد دینا بہت مفید ہے۔

نوٹ : بے ہوشی کا اصل سبب جاننے کی کوشش اور اس کے مطابق علاج کرنا چاہئے۔ مرض پر قابو نہ پاسکے کی صورت میں مریض کو ہسپتال پہنچا دینا چاہئے۔

## بے ہوشی

### Unconsciousness

(See Collaps and fainting also)

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ بہت زیادہ خون اور رطوبات زندگی ضائع ہو جانے کی وجہ سے بے ہوشی۔  
چاکا 30 یا 200 'آدھے گھنٹے بعد

☆ غصے اور ناراضگی کے دبانے کی وجہ سے بے ہوشی۔  
کالوسنتھ 200 یا 1M 'چار گھنٹے بعد 'تین مرتبہ



☆ دماغی کمزوری، نقاہت کی وجہ سے جبکہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی ہسٹری پائی جائے۔  
اورم میلکیم 10M '15 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ جبکہ نومولود بچہ سانس نہ لے اور کسی واضح علامت یا رکاوٹ کے بغیر نیلا پڑ جائے۔  
لوروسیرس (Laurocerasus) 6 یا 15 '30 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ کسی قسم کے ڈر خوف یا بجلی کی چمک کی وجہ سے بے ہوشی۔  
فاسفورس 200 یا 1M '15 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ تارکول کی گیس دماغ کو چڑھ جانے کی وجہ سے بے ہوشی۔  
بووشا 15 '30 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ جب پیشاب اور نبض کی وجہ سے نقص پیدا ہوا ہو۔  
ہیلے بورس 200 یا 1M '15 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ زیادہ شراب پینے یا کونٹے کی گیس کی وجہ سے بے ہوشی۔  
کاربو سلف 15 '30 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ جب بے ہوشی کی علامات میں سوزاکی وجوہات شامل ہوں اور دل اور ہتھکڑوں میں  
طبعی تبدیلی رونما ہو رہی ہو۔  
سائی فیلیم 10M '15 منٹ بعد، ایک خوراک

☆ معاون دوا۔

سلفر 200 '15 منٹ بعد، ایک خوراک  
ہائیو کیملک کی کالی میور 6x اور فیرم فاس 6x بھی مفید ادویات ہیں۔



☆ کے دوران۔ کسی کام میں دلچسپی نہ لے۔

کوئیم میک 200 یا 1M 'تین گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ اکیلے یا تنہائی میں غمگینی۔

آرسنک الیم 200 یا 1M 'تین گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ کسی پیارے کی اچانک موت کا صدمہ۔ شدید بے چینی۔ فکر مندی اور خوف۔

اکوٹائٹ 200 یا 10 منٹ بعد 'تین مرتبہ'

☆ بلاوجہ کی مایوسی اور غمگینی۔ رات کے وقت غمگینی۔ اندھیرے میں افسردگی۔

فاسفورس 200 یا 1M '10 منٹ بعد'  
تین مرتبہ

☆ آرام کے دوران یا جب گھر پر ہو تو غمگین ہو۔

رہس ٹاکس 200 یا 1M '10 منٹ بعد'  
تین مرتبہ

☆ رطوبات زندگی ضائع ہو جانے کی وجہ سے۔ مشت زنی کی وجہ سے غمگینی۔

ایسڈ فاس 200 یا 1M '10 منٹ بعد'  
تین مرتبہ

☆ دھوپ میں سو کر اٹھنے کے بعد۔ صبح کے وقت اور چلنے کے بعد غمگینی۔

لیکے سس 200 یا 1M '10 منٹ بعد'  
تین مرتبہ

☆ غصے سے غمگینی۔ گرم کمرے میں افسردگی۔

پلساٹیل 200 یا 1M '10 منٹ بعد'  
تین مرتبہ

☆ محبت میں ناکامی کی وجہ سے غمگینی۔ آہیں بھرے۔ گوشت یا جسم کا کوئی حصہ گل سڑ جائے۔ کسی عزیز یا دوست کی جدائی یا موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔

اگنیسیا 200 یا 1M '10 منٹ بعد'  
تین مرتبہ

☆ چڑچڑاہٹ۔ کھانے کے بعد کی غمگینی۔

ٹکس وامیکا 200 یا 1M '10 منٹ بعد'  
تین مرتبہ

☆ دوران حمل غمگینی۔ احساس برتری۔

پلاٹینا 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ نامردی کی وجہ سے غمگینی اور مایوسی۔

کالی بروماٹم 200 یا 1M تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ جب بستر میں ہو۔ رات کے وقت۔ کسی غم کے بعد۔ گرمی کے دوران۔ رو بھی نہ سکے۔ کسی کی ہمدردی بھی پسند نہ کرے۔

نیزم میور 200 یا 1M تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

بایو کیمک کی نیزم میور 30x چار گھنٹے بعد دینا بھی مفید ہے۔

سکتہ

Apoplexy

(lack of sensation due to stroke)

(حس کی کمی کی وجہ سے غشی)

علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ غصے کے جذبات کو دبانے کے نتیجے میں ہونے والی بے ہوشی۔

کالوسنتھ 200 یا 1M تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ بے حس و حرکت۔ سر کی جانب خون کا اجتماع۔

بیلادونا 200 یا 1M تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ اچانک ادنیٰ چیزوں کے ساتھ غفلت اور مدہوشی اور حواس باختہ ہو جانا۔ بے حس و حرکت ہو جانا۔

ایس ملفیکا 200 یا 1M تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ ٹھنڈے ہوا کے جھونکے سے اچانک بے ہوش ہو جانا۔

ایکونائٹ 200 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ دھڑکن کے ساتھ۔ جلد ٹھنڈی اور نم۔ چہرے کے اعصاب تن جائیں یا اینٹھ جائیں۔

لوروسراس (Laurocerasus)

30 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ مکمل بے حسی اور بے ہوشی۔ غیر ارادی سکیاں اور آہیں۔ مریض کے چہرے سے

جنون اور بدحواسی ظاہر ہو۔

ہیلے بورس 200 یا 1M 'تین گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ منہ آدھا کھلا ہوا اور بہت جھاگ نکلے۔

برٹا کارب 200 یا 1M 'تین گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ جذباتی تناؤ، صدمے یا حادثے سے بے ہوشی۔

اگنیشیا 1M یا 10M 'تین گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ کسی مشین سے زخم آنے کی صورت میں بے ہوشی۔

آرنیکا 200 یا 1M 'تین گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

☆ مکمل بے ہوشی۔ دماغی چوٹ کی وجہ سے غفلت یا بے حسی۔ جڑے لٹک جائیں۔

اوپیم 1M یا 10M 'تین گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

علامات کے مطابق متعلقہ دوا کے ساتھ ساتھ سلفر 200 تین تین گھنٹے بعد دینے سے بہتر نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

بایو کیمک کی کالی فاس 6x اور میگنیا 6x بھی بہت مفید ادویات ہیں۔ کیس کی صحیح تشخیص کے لئے معالج کو چاہئے کہ بے ہوشی کے اسباب کی تحقیق و تصدیق کرے اور اس کے بعد صحیح دوا تجویز کرے۔



☆ کسی رنج کی وجہ سے پریشانی یا تحت الشعور میں موجود کسی صدمے یا بری خبر سے۔  
اگنسیا 200 یا 1M تین گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ شدید بیمار ہونے کے باوجود بزنس کے لئے فکرمند۔  
برائی ادویا البم 200، تین گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ وقفے وقفے سے طویل عرصہ تک پریشانی اور خوف و ہراس کے حملے۔  
آرسنک البم 200، ایک یا دو گھنٹے بعد،

تین مرتبہ

☆ کھانے کے بعد پریشانی و فکرمندی کم ہو جائے۔  
اینا کارڈیم 30، چار گھنٹے بعد

☆ خوف کی وجہ سے مریض تیز چلنے لگے۔ پیشگی احتیاط کی وجہ سے پریشانی۔  
ار جٹم نائٹرکیم 200، تین گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ اچانک بے چینی کے ساتھ خوف اور موت کا خوف۔  
اکونائٹ 30 یا 200، آدھے گھنٹے بعد،

تین مرتبہ

☆ شام کے وقت خدشات کے جمع ہونے سے خوف۔ خشک ٹھنڈی ہوا لگ جانے کے بعد  
بے چینی۔

کاشی کم 200، تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ

بائیو کیمک کی دوا کال فاس 6x بھی بہت موثر ہے۔



# زودحسی / پریشانی / گھبراہٹ

## Nervousness

(See Anxiety also)

ہر انسان شکل و صورت ایک جیسی رکھنے کے باوجود مختلف طبیعت اور مزاج کا مالک ہوتا ہے اور ہر شخص پر مختلف حالات و کیفیات کا مختلف ذہنی اور جسمانی رد عمل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت زودحس اور جلدی اثر قبول کرنے والے ہوتے ہیں جبکہ بعض لوگ لاپرواہ اور سیلابی طبیعت رکھتے ہیں۔ بعض افراد وہی، شرمیلے اور زودرنج ہوتے ہیں۔ ان کی ذہنی کیفیات بدلتی رہتی ہیں جس کا اثر ان کی جسمانی کارکردگی پر بھی پڑتا ہے ان کے رد عمل اور رویے بعض اوقات خود ان کے لئے اور دوسروں کے لئے بھی پریشانی کا سبب ہوتے ہیں۔ ایسی ہی مختلف علامات کے لئے ذیل میں چند ضروری اور اہم ادویات بیان کی گئی ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ ہر چیز اور بات ناقابل برداشت۔ کسی بات سے خوش نہ ہو۔ بد مزاج۔ انتہائی بے چینی۔  
کیمو میلا 200 تین گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ لوگوں سے ملنے سے کترائے۔ مایوسی اور غمگینی۔ کسی طویل ذہنی دباؤ اور کھچاؤ کی وجہ سے طبیعت میں زودحسی اور پریشانی۔  
کالی فاس 6 یا 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ فکر مندی کے ساتھ زودحسی۔ کھانے کے بعد بہتر ہو۔  
اناکارڈیم 30 یا 200، چار گھنٹے بعد
- ☆ کال، وہی، بدگمانیوں میں مبتلا۔ ایسا محسوس ہو کہ ذہن ماؤف ہو گیا ہے۔ زندگی کے ساتھ گذر کرنے کے قابل نہ ہو۔ گرنے کا خوف۔ مایوس۔ جلدی متاثر ہو جائے۔ نزلہ زکام کے بعد زودحسی۔  
جیلی میم 30 یا 200، چار گھنٹے بعد
- ☆ نرم خو۔ بہت زیادہ حساس، روہانسی طبیعت، کسی بری خبر سے متاثر ہو۔ جذباتی طور پر پرانگندہ۔ لوگوں کے پاس رہنا پسند کرے۔  
پہلاٹیل 200، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ امتحان میں بیٹھنے کا خوف۔ پانی، بند جگہ، بھیڑ (رشد)، بلندی وغیرہ سے خوفزدہ۔ رونما ہونے والے واقعات سے فکر مند۔

ار جشم ناسٹرکیم 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ کسی اچانک صدمے یا دباؤ کی وجہ سے زودحسی۔ چڑچڑا اور مایوس مریض۔ مزاج میں تبدیلی آتی رہے۔ بغیر کسی کو کچھ بتائے غم میں رہے۔ گزشتہ واقعات کو بھلا نہ سکے۔ غیر ارادی طور پر آنسو آجائیں۔ آہیں بھرے۔ درد اور تکلیف برداشت نہ کر سکے۔

اگنیشیا 200 یا 1M 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ ذہنی پراگندگی۔ خیالات اور تصورات یکے بعد دیگر گھیرے رکھیں۔ ذرا سا شور اور موسیقی بھی برداشت نہ کرے۔ انتہائی درجہ حسد۔ ذرا سی بات بھی برداشت نہ کرے۔ زبردست پریشانی اور فکر مندی۔ درد بھی برداشت نہ کرے۔

اکونائٹ 30 یا 200 'تین گھنٹے بعد'

☆ جھگڑالو، دوسروں پر تنقید کرنے والا۔ انتہا درجہ کا حساس اور حاسد۔ چیزیں پھینکنے کا رجحان رکھنے والا۔ مایوس لیکن تیز طرار شخص۔ ٹھنڈ محسوس کرنے والا۔ ہاضمہ ٹھیک نہ ہو۔

نکس و امیکا 30 'چھ گھنٹے بعد'

☆ فکرات اور صدمے کے نتیجے میں زودحسی۔ رونے کا رجحان ناخوش، ناامید، ذرا سے شور سے بھی اچھل پڑے۔ دوسروں پر تنقید کرے۔ بھول جانے والی طبیعت ہمدردی رکھنے والا۔

کاشی کم 200 'تین گھنٹے بعد' تین مرتبہ

بایو کیمک کی کالی فاس 6x بھی مفید دوا ہے۔





# رونا

## Weeping

رونا بذات خود کوئی مرض نہیں بلکہ کسی ذہنی پریشانی یا جسمانی تکلیف کے نتیجے میں رونا آتا ہے۔ جسمانی تکلیف یا درد کی وجہ سے رونا فطری امر ہے۔ البتہ احساسات اور جذبات کے منفی یا مثبت طور پر متاثر ہونے سے بھی انسان کو رونا آتا ہے۔ بعض حساس طبیعتوں اور نازک مزاج لوگوں کو بات بات پر رونا آجاتا ہے۔ وہ خوشی اور رنج دونوں سے یکساں طور پر متاثر ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں۔ بعض ذہنی امراض کی وجہ سے رونا آتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کسی پریشانی اور فکر کے بعد اور میوزک سننے سے رونا آجائے۔

گریفائٹس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ خوشی سے رونا آجائے۔ احساس برتری ہو۔

پلائنم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ

☆ دوران حمل روئے۔

بیکنشیا کارب 30 یا 200 'چار گھنٹے  
بعد' تین مرتبہ

☆ غم میں رونے لگے۔ کسی بات کی تردید برداشت نہ کر سکے اور رونے لگے۔

نکس و امیکا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ مطالبات پورے نہ ہونے پر رونے لگے۔ ذرا سا بھی چھو جانا برداشت نہ کرے اور  
رونے لگے۔

سائکا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ

☆ جب تنہا ہو تو رونے لگے۔ کوئی دلچسپی یا حوصلہ افزائی یا مزاج پر سی کرے تو رونے لگے۔  
گزرے ہوئے برے واقعات یاد کر کے رونے لگے۔

نیرم میو 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ



- ☆ کسی مدت یا مقررہ وقت کے بعد رونا شروع کر دے۔ مثلاً "ہر مینے کے بعد۔"  
 کوئیم میک 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
 تین مرتبہ
- ☆ بوڑھے لوگ بلاوجہ رونے لگیں۔ ذرا سا بھی جذبات کو چھیڑنے پر رو پڑیں۔ ذرا ذرا سی بات پر رو پڑے۔  
 کاشی کم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ رات دن روئے۔ کسی طور بھی خوش نہ ہو۔  
 ایس ملنیکا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
 تین مرتبہ
- ☆ اونچی آواز سے روئے۔ سسکیاں بھرے۔ چار سے آٹھ بچے کے دوران۔ شکریہ ادا کرنے پر رو پڑے۔  
 لائیکو پوڈیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
 تین مرتبہ
- ☆ لوگوں سے ملتے ہوئے رونے لگے۔ خودکشی کے خیالات آئیں۔  
 اورم میور 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
 تین مرتبہ
- ☆ تمام رات روتا اور سارے دن ہنستا رہے۔ کبھی خوش ہو جائے اور کبھی رنجیدہ۔ اندھیرے میں کبھی ہنسنے لگے۔  
 سٹرامونیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
 تین مرتبہ
- ☆ بچہ صرف اٹھائے پھرنے سے رونا بند کرے۔ خدی ہو جائے۔  
 کیومیل 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ کھانسی سے پہلے رونے لگے۔ لٹھ اور چھوٹے سے بہت زیادہ حساس۔  
 ہیر سلف 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'  
 تین مرتبہ
- ☆ اپنی بیماری کا حال بتاتے ہوئے جب تھوڑی سی بات کہیں۔ جب کسی بات پر روک روک کی جائے۔ نزلے زکام کے دوران۔ کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے۔ دلچسپی کرنے پر غرض یہ

کہ ہر حال میں رونا شروع کر دے۔

ہلکا ٹیلا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ

☆ گندگی یا مشت زنی کے بعد رونے لگے۔

آشی لاگو (Usti Lago) 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ صبح کے وقت یا گیارہ بجے رونے لگے۔

سلفر 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ

☆ بغیر کسی سبب جانے یا بے بات رونے لگے۔ بے چینی ہو۔

رہس ٹاکس 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ مزمن کیسوں کے لئے۔ ایسے کیسوں کے لئے جن میں مریض اور اس کے خاندان میں  
افسردگی، غمگینی کی علامات پائی جائیں۔

کاری نو سین 200 یا 1M 'ایک  
خوراک

☆ بولتے ہوئے روئے۔ خاص طور پر دن کے اوقات میں۔

میڈورینم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

☆ کھلی ہوا میں چلتے ہوئے رونے لگے۔

سپیا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین  
مرتبہ

☆ جب مریض سے بات کی جائے تو رونے لگے۔ پھٹ پڑے۔ چلانے لگے۔ کوئی بات چبھ  
جائے تو رونے لگے۔

شیفی ٹیکریا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ



# غصہ / جھنجلاہٹ

## Anger

(Annoyance)

اگرچہ غصہ آنا انسانی جبلت اور سرشت میں شامل ہے لیکن غیر معمولی غصہ کسی ذہنی یا جسمانی بیماری کی علامت ہوتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر طیش میں آجانا۔ مرنے مارنے پر آمادہ ہو جانا، کوئی بات برداشت نہ کر سکتا تشدد پر اتر آنا اور لڑنا جھگڑنا غیر صحتمندی کی علامات ہیں۔ یہ کیفیت کسی دماغی تکلیف، اعصابی کمزوری یا ذہنی پریشانی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ جسمانی تکلیفات سے بھی مزاج میں چڑچڑاہٹ اور غصہ پیدا ہو سکتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ تیز تیز نبض۔ جان سے مار دینا چاہے۔  
آیوڈیم (Iodine) 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ آسانی سے غصہ آجائے۔ جھگڑالو۔ منانا مشکل ہو۔  
بیر سلف 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ غصہ۔ تشددانہ دورے۔ بے ہوش ہو کر گر جائے۔  
ماسکس (Moschus) 200 ہر 10 منٹ بعد، تین مرتبہ
- ☆ تشددانہ غصہ۔ ملازموں اور دوستوں کو مارے۔  
ٹرنیولا ہسپانیہ 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ غلط چیزوں پر غصہ آجائے۔ غیر معمولی حساس۔  
ٹینیسیگیا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ کسی بات کی تردید پر شدید غصہ آئے۔ یا جب کسی بات کا جواب دینے پر اصرار کیا جائے۔  
ٹکس وامیکا 200 یا 1M ہر 10 منٹ بعد، تین مرتبہ
- ☆ مزاج (Moods) تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ غصہ۔ بعد میں شرمندہ یا معذرت خواہ

کروکس سیٹوا (Crocus Sat) 200

☆ غصے سے کانپنے لگے۔ شدید جھنجھلاہٹ۔ نفرت سے بھرا غصہ۔ بدلا لینے کا جذبہ اور دماغ مضبوط رکھنے والا شخص۔  
ہر 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

ٹائٹریک ایسڈ (Acid nit) 200 یا

☆ بچوں کا غصہ۔ کوئی نئی چیز مثلاً "کھلونے طلب کریں اور جب دیئے جائیں تو لینے سے انکار کر دیں۔ ان کا مزاج بدلتا (Changable) رہے۔  
1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

کیمو میلا 200 یا 1M ہر 10 منٹ بعد،

☆ معمولی معمولی باتوں پر غصہ آجائے۔ غدو دوں کی سوزش ہو۔ بلوغت پر جبرہ بڑھ جائے۔  
تین مرتبہ  
کلیکیریا آیوڈیم 200 ہر 10 منٹ بعد،  
تین مرتبہ  
☆ دوران حمل غصہ۔

نکس موسکاٹا 200 یا 1M ہر 10 منٹ

☆ غصہ آسانی سے آجائے۔ جھنجھلاہٹ اور ضدی پن۔ کھلی اور ٹھنڈی فضا میں بستر محسوس کرے۔  
بعد، تین مرتبہ

کالی سلف 200 ہر 10 منٹ بعد، تین

☆ ساتھیوں اور استادوں سے جھگڑا کرے۔ اگرچہ جلد خوف زدہ ہو جائے۔ اپنی طرف توجہ چاہے۔  
مرتبہ

فاسفورس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

☆ آسانی سے غصے میں آجائے۔ جھگڑالو۔ ضدی اور جھنجھلانے والا۔  
مرتبہ

کالی کارب 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

☆ غصیاریہ، جھنجھلانے والا، گالیاں بکنے والا اور ظالم شخص۔  
مرتبہ

کالی آیوڈیم 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ



☆ آسانی سے غصہ میں آجائے۔ ضدی مزاج۔ خطرناک مرض مثلاً ”پھوڑے“ رسولی یا بڑے زخم میں مبتلا۔

کاری نو سین 200 یا 1M

(Carcinocin) ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ خاندان کے افراد اور بچوں کے لئے غیر متعلقہ سا۔ کسی ایک سے پیار کرے۔ ماہواری سے پہلے زیادہ غصہ آئے۔

سیپیا 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ جماع کے بعد غصہ۔ ضدی، موٹے اور پلپے لوگ۔

کلیریا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار،

تین مرتبہ

☆ بد مزاج، بلاوجہ غصہ۔ کبھی ہنسے نہ کسی بات پر خوش ہو۔

ٹوبرکولینم 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ غصہ جب غلط بات سمجھے۔ بے اختیار ہنسی سے پہلے۔

بوفورانا 200 یا 1M ہر 10 منٹ بعد،

تین مرتبہ



☆ خون یا چاقو دیکھنے کے بعد خودکشی کرنے کا رجحان۔

الیومنا 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ کلہاڑی سے خودکشی کرنے کا رجحان۔

تاجاٹپ (Naja trip) 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ شدید درد کی وجہ سے خودکشی کا رجحان۔ اونچائی یا کھڑکی سے گر کر مرنے کا رجحان۔  
اورم میلکم 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ موت کے خوف سے خودکشی کرنے کا رجحان۔

ٹائٹلک ایسڈ 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ پسینہ آنے کے دوران چھرا مار کر خودکشی کرنے کا رجحان۔

کلکیریا کارب 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ خیالات خودکشی کی طرف آمادہ کریں یا غصے کی وجہ سے خودکشی کرنے کا رجحان۔

کاربودیج 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ کسی غم، رنج یا صدمے کی وجہ سے خودکشی کا رجحان۔ گولی مارنے کا ارادہ کرے۔

شیفنی سیکریا 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ دریا یا سمندر میں ڈوب کر مرنے کا ارادہ کرے۔

رہس ٹاکس 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ دوران حیض خودکشی کا رجحان۔ چاقو سے یا بھوک سے مرنے کا ارادہ کرے۔

مرکیورس سال 200 یا 1M چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

بائیو کیمک کی کالی فاس 6x یا 12x بھی بہترین دوا ہے۔

# بے خوابی / نیند نہ آنا

Insomnia

(Sleeplessness)

اس مرض میں رات کو نیند نہیں آتی۔ ذرا نیند یا غنودگی ہو تو نیند اچٹ جائے یا پریشان کن قسم کے خواب آتے رہیں۔ نیند نہ آنے کا سبب کوئی نہ کوئی دوسری بیماری یا ذہنی پریشانی ہوتی ہے۔ جب کئی روز تک نیند نہ آئے تو دماغ میں خرابی واقع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور کئی قسم کی تکلیفات جنم لیتی ہیں۔ جسم مضطرب اور تھکا ماندہ ہو جاتا ہے۔ اعصاب میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور دماغی اور جسمانی ہر قسم کی محنت اور کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

یہ مرض بد ہضمی، زیادہ چائے نوشی، شدید بخار، جگر میں فتور، فکرات، بعض قلبی و دماغی امراض کی عروق، جوڑوں کے درد، قبض اور خون میں زیادہ جوش کی وجہ سے لاحق ہو سکتا ہے۔

## علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ کسی خوف اور اضطراب کی وجہ سے بے خوابی۔ بے چینی اور بستر میں جھولنا۔ کسی صدمے یا خوف کے بعد نیند اڑ جائے۔

اکو ٹائٹ 30، چار گھنٹے بعد

☆ مایوسی اور ناامیدی، غمگینی۔ کسی اچانک صدمے یا حادثے کی وجہ سے بے خوابی۔  
اکنیشیا 200 یا 10'1M منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ موقوفی، حیض کے دوران بے خوابی۔

سینو (Senceio Aur) 30، چار گھنٹے بعد

☆ بستر کو سخت محسوس کرے۔ سکون اور نرم جگہ تلاش کرنے کے لئے بستر میں ادھر ادھر حرکت کرتا رہے۔ جسمانی یا دماغی تھکاوٹ کی وجہ سے بے خوابی۔

آرنیکا مونٹ 30 یا 200، آدھے گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ سوتے میں ہاتھ سر پر رکھے۔ نیند کے ابتدائی حصے میں بے چینی۔ اٹھنے کے وقت پر مگرمی نیند آجائے۔ بستر میں گرمی محسوس کر کے اٹھ بیٹھے۔ چادر یا کپل / رضائی ایک طرف پھینک دے۔ پھر سردی محسوس کرے اور پھر سے اوڑھ لے۔

اوپیم 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ اشتعال اور جذبات کی وجہ سے سو نہ سکے۔ ذہن کام کرتا رہے۔ رات کے ابتدائی



اوقات میں نہ سو سکے۔ بڑھاتا ہوا اٹھ جائے۔

کافیا 30' چھ گھنٹے بعد

☆ فکرات یا پریشانی کی وجہ سے درمیانہ رات کے بعد سو نہ سکے۔ اٹھ کر بیٹھ جائے اور ٹہلنے لگے۔

بیلادونا 30' چار گھنٹے بعد

☆ چوروں اور ڈاکوؤں کے خواب دیکھنے کے بعد اور کسی پرانے غم کو یاد کر کے بے خوابی۔

نیرم میور 200 یا 1M 10' منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ خوفناک یا ڈراؤنے خواب کی وجہ سے بے چین نیند۔ بچہ بستر میں جھولے۔ چادر یا کبل پاؤں سے اتار پھینکے۔ کھنچاؤ یا اینٹھن محسوس کرے۔ غنودگی ہو لیکن سو نہ سکے۔

آرسنک البم 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ بستر گرم محسوس ہو۔ ٹھنڈا حصہ تلاش کرنے کے لئے بستر میں ادھر ادھر حرکت کرتا رہے۔ لیکن ناکام رہے۔ دور کہیں گھسنے کی آواز سے بھی جاگ اٹھے۔ نیند آئے لیکن سو نہ سکے۔

ہلساٹیل 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ بے چین اور خوابوں والی نیند۔ رات کو تین بجے کے بعد نیند نہ آئے۔ تنہائی پسندی اور ذہن پر بوجھ کی وجہ سے بے خوابی۔

پہلے سات دن تک

☆ بے چینی اور بے خوابی خصوصاً رات کے ابتدائی حصے میں۔ اٹھ کر بیٹھ جائے اور ٹہلنا شروع کر دے۔ جیسے ہی سونے کا وقت آئے مریض اٹھ کر بیٹھ جائے۔ جاگ جائے۔

کیومیلا 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ نیند اڑ جانے کی وجہ سے تکلیفات میں اضافہ ہو۔ بچے کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے نیند نہ آئے۔

کوکولس اینڈیکا 30' چار گھنٹے بعد

☆ نیند سے پہلے اور بعد میں تکلیفات میں اضافہ ہو جائے۔

لیکے س 200 یا 1M 10' منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ خوشگوار نیند آنے کے بعد تکلیفات میں اضافہ ہو۔ فاسفورس 200' 10' منٹ بعد تین مرتبہ

مرتبہ

بائیو کیمک کی کالی فاس 6x اور فیرم فاس 30x روزانہ سونے سے پہلے دینا مفید ہے۔





☆ طوفان، بجلی کی کڑک، خطرہ وغیرہ۔

آرسنک الہم 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ دعوت، خوش و خرم، تفریح وغیرہ۔

ایسینوئڈا (Asafoetida) 200 یا

1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ چور، ڈاکو وغیرہ دیکھنا۔

نیزم میور 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ اپنے ساتھ کسی اور کو لینے یا سوئے ہوئے دیکھنا۔

پڑولیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ شادی اور خوشی کے خواب۔

اوپیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ کالے درندے اور جانور، سونا اور خوشی دیکھنا۔

ہلسائٹلا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ خود کو اڑتے ہوئے دیکھنا۔

ایس ملینکا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ ناخوشگوار، احتلام۔

سلفر 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ کاروبار میں مصروف یا میدانوں میں گھومتے دیکھنا۔

رہس ٹاکس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ سانپوں کا کاٹنا۔

بودشا 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ خود کو اندھا دیکھنا۔ شیر دیکھنا۔

فائی سو گما (Physostigma) 200

یا M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ بات کرنے کی ناکام کوشش کرتے دیکھنا۔

کنیشیا کارب 200 'ہفتہ وار' تین  
مرتبہ

☆ بہت خوش ہونا۔

کلیریا کارب 200 یا 1M 'ہفتہ وار'  
تین مرتبہ

☆ ذہنی کام میں عمدہ کارکردگی۔ آگ۔

اناکارڈیم 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین  
مرتبہ

☆ خوفزدہ، کتا پیچھے لگا دیکھنا، زلزلہ، گذشتہ واقعات، لڑائی جھگڑا، چوروں کو پیچھا کرتے دیکھنا۔

سلیسیا 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین  
مرتبہ

## بھیانک خواب

### Nightmare

بعض دفعہ مریض کو بہت زیادہ ڈراونے اور عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں۔ دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ خود کو کسی بھاری بوجھ کے نیچے دبا ہوا محسوس کرتا ہے اور اپنے اندر بولنے اور حرکت کرنے کی سکت تک نہیں پاتا ہے۔ اسی کیفیت میں مریض کی گھبرا کر آنکھ کھل جاتی ہے۔ مریض کچھ دیر تک حیران پریشان اور ہکا بکا سا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھٹن تو رفع ہو جاتی ہے البتہ تپش قلب باقی رہتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ مریض نیند میں بولے یا بڑبڑائے۔

سلفر 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ مریض رات میں کئی مرتبہ جاگے۔ چہانے اور نکلنے کی سی حرکتیں کرے۔ سر پر شدید قسم کا پینہ آئے۔

کلیریا کارب 200 یا 1M 'ہفتہ وار'  
تین مرتبہ

☆ نیند میں بھیاںک خواب دیکھے لیکن اٹھنے کے قابل نہ ہو۔

رہس ٹاکس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھگڑنے کے خواب دیکھے۔

سینڈرون (Cedron) 200 ہفتہ وار،

تین مرتبہ

☆ مریض نیند میں جھٹے جیسے ڈر گیا ہو۔ اپنی ماں یا اپنے کفیل سے چمٹ جائے۔

بوریکس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ ایسا خواب آئے جیسے اس کے اوپر کوئی بھاری پتھر رکھا ہے۔

کالی کارب 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ ڈراونے خواب دیکھنے سے مریض نیند میں اچانک چیخا چلانا یا رونا شروع کر دے۔

کیمومیل 200 چار گھنٹے بعد

☆ جب مریض آدمی آنکھیں بند کر کے لیٹے تو خواب آئیں۔

اوپیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ ڈراونے خواب دیکھنے کی وجہ سے مریض نیند میں سکرے اور کانپے لگے۔

کالی بروم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x کالی فاس 6x اور میکنسیا 6x بھی

مفید ادویات ہیں۔



# پانی سے خوف (مرگی جیسی علامتیں)

## Hydrophobia

### علامات 'دوا اور طاقت' دورانیہ

☆ اندھیرے سے خوف۔ خیالی چیزوں سے ڈر۔ شدید بے چینی اور حرکت۔ ٹھٹھے چلائے۔

سٹرامونیم 200 یا 1M 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ پانی سے ڈرے۔ جلد نیلی سرخ ہو جائے۔ کنارے سخت اور سوچے ہوئے۔

ہائیڈرو فوبیم 200 یا 1M 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ تشنج۔ گلا درم آلود۔ گلے میں کھپاؤ اور تشنج۔ گھٹنا مشکل ہو۔ بھونکنے کی سی آواز۔ آواز

بیٹھ جائے۔ دھوپ اور چمکیلی چیزوں سے حساس۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے۔ آنکھ کی پتلی

پھری ہوئی۔ طبیعت میں فکر اور پریشانی۔ فریب نظر کا شکار۔ وہی۔ کانے۔ دانت کٹکنا کر

کاٹ کھائے۔ جھپٹے مارے۔ چہرہ وحشت زدہ۔

یلاڈونا 30 یا 200 'آدھے گھنٹے بعد

☆ خیند میں بے قاعدگی کسی اچانک خوف سے۔ آس پاس کے لوگوں کو برا بھلا کہے۔ گلے

کے تشنج کے مقابلے میں عام جسمانی تشنج زیادہ۔ ڈرنے کے بعد تشنج ہو۔

ہائیوسائمس (Hyoscyamus) 200

یا 1M 10 منٹ بعد 'تین مرتبہ

☆ مرض کی انتہائی غیر حالت کے لئے۔

لیکے سس 200 یا 1M 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ نکلنے کی وجہ سے درد کے بعد تشنج اس صورت میں بھی جبکہ قائم الزکری ہو۔ (ایستادگی)

جب نہ صرف گلے کے تشنج کی وجہ سے بلکہ گلے کی سوزش یا زخم کی وجہ سے بھی نکلنے میں

روکاوت ہو۔

کیسترس 200 یا 1M 10 منٹ بعد

تین مرتبہ



## حساسیت

### Allergies

(بعض کھانوں، مشروبات اور ادویات سے غیر معمولی حساسیت)

بعض کیسوں میں الرجی کی حساسیت کو کم یا ختم کرنے کے لئے اسی قسم کی چیزوں کی قلیل مقدار (potentised) دینے سے بھی بہتر نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ یہ مقدار اتنی قلیل ہونی چاہئے کہ اس سے کسی طرح کی علامات ظاہر نہ ہوں۔ کیونکہ ہومیوپیتھی طریقہء علاج میں بالکل ہونا ضروری ہے۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ پٹھڑے کے گوشت سے الرجی۔ کالی ٹائٹریم 200 ہر چھ گھنٹے بعد
- ☆ پھولوں کی خوشبو سے۔ (دمہ) ایلنٹھس (Allanthus g) 6 یا 30 ہر چار گھنٹے بعد
- ☆ آئیوڈائنڈ آف پوٹاشیم سے (بطور مخروج بلغم، کھانسی دمہ میں) اورم سیلیکم 30 یا 200 ہر چھ گھنٹے بعد
- ☆ مٹھائی، پیاز اور چربی دار گوشت سے۔ تھو جا OC 30 یا 200 ہر چھ گھنٹے بعد
- ☆ بند گو بھی یا کرم کلمہ سے۔ پٹرو لیم 30 یا 200 ہر چھ گھنٹے بعد
- ☆ کان سے الرجک۔ نکس دامیکا 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ بیر اور اناج سے بنے ہوئے شیرے سے۔ کالی فک 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ دودھ سے الرجک۔ میگنیشیا کارب 30 یا 200 ہر چھ گھنٹے بعد
- ☆ شکر سے الرجک۔ ار جٹم ٹائٹریم 30 یا 200 ہر چھ گھنٹے بعد
- ☆ سڑا بری سے الرجک۔ اوکے لک ایسڈ 30 یا 200 ہفتہ وار

☆ گلی سڑی سبزیوں سے۔

کاربوا-نملس (Carbo animalis)  
30 یا 200 ہر چھ گھنٹے بعد  
نائٹری سپرٹس ڈولس

☆ پیر سے الرجک۔

یا Q (Nitri spiritus dulcis)  
30 ہر چھ گھنٹے بعد

☆ ٹھنڈے مشروبات، پھل سڑے ہوئے کھانے اور آلوڈین سے۔

آرسنک البم 30 ہر چار گھنٹے بعد  
رہوم (Rheum) 200 ہر چھ گھنٹے بعد

☆ کچے پھلوں سے یا شاخوں سے۔

☆ اسپرین، نمکین مکھن، خراب انڈوں، مرغی وغیرہ اور خراب شراب سے۔

کاربوونج 30 ہر چار گھنٹے بعد  
سلینیم 30 یا 200 ہر چھ گھنٹے بعد  
تھوجا OC 30 یا 200 ہر چار گھنٹے بعد  
سلفر 30 یا 200 ہر چار گھنٹے بعد  
اوپیم g 30 یا 200 ہر چار گھنٹے بعد  
لائکو پوڈیم 30 یا 200 ہر چار گھنٹے بعد  
سیکریم (Saccharum) 30 یا 200 ہر چار گھنٹے بعد

☆ لیموں اور کنگنجن سے۔

☆ پیاز سے الرجی۔

☆ انڈے سے۔

☆ اجوائن سے۔

☆ کستورا مچھلی سے۔

☆ چینی سے۔

برائی ادویا 30 یا 200 ہر چار گھنٹے بعد  
فریکیریا 30 یا 200 ہر چار گھنٹے بعد

☆ گاجر، سبزی اور چکن سلاڈ سے۔

☆ سڑا ہری سے۔

☆ جمور (کھانے سجانے کے لئے خوشبودار پتے) سے۔

پروڈیم 30 یا 200 ہر چار گھنٹے بعد

☆ بیر (Beer) اچار، کھٹے کھانے اور شراب سے۔

فیرم میٹلیکم 30 یا 200 ہر چار گھنٹے بعد  
چینیم سلف (Chin Sulph) 30 یا 200 ہر چار گھنٹے بعد

☆ کونین سے۔

☆ مرغن، مزیدار، مختلف النوع کھانے، گوشت سے بنے کھانے اور انڈے وغیرہ سے۔

پلساٹلا 30 یا 200 ہر چار گھنٹے بعد

☆ زیادہ کچے ہوئے پھلوں۔ رکھے ہوئے کھانوں اور مشروبات سے۔

آرسنک البم 30 یا 200 ہر چار گھنٹے بعد

- ☆ گندم اور دودھ وغیرہ سے۔  
☆ کیسٹرول سے الرجک۔  
☆ شکر اور کھٹے کھانوں سے۔  
☆ چادلوں سے الرجک۔
- ☆ ابلے ہوئے گرم دودھ سے۔  
☆ سرکے، اچار، کھٹے اور تیز کھانوں سے۔  
☆ گرمی سے الرجک۔  
☆ ناقابل ہضم کھانوں سے جبکہ زبان صاف ہو اور لگاتار متلی ہو۔
- ☆ روٹی اور تیز کھانوں سے۔  
☆ ٹھنڈے دودھ سے الرجک۔  
☆ کستورا مچھلی سے الرجک۔  
☆ مچھلی کے تیل سے۔ (Cod Liver oil)  
☆ تربوز اور خربوزے سے۔
- ☆ نمی یا مرطوب جگہ سے۔  
☆ گردوغبار، دھوئیں اور تیز قسم کے عطریات/خوشبو سے۔
- ☆ متعلقہ دوا کے ساتھ ساتھ۔  
☆ گردوغبار سے۔ (دمہ)
- ☆ پیسٹری، آئس کریم اور لے جے کھانوں سے۔
- ☆ ہسٹامائن (Histamine) 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ  
سورنیم 200 یا 1M پندرہویں روز،  
تین مرتبہ  
پوتھوس فوڈس 6 یا 30  
(Pothos foe) ہر چار گھنٹے بعد  
پلساٹیل 30 ہر چار گھنٹے بعد



# خواہش / پسندیدگی

## Cravings

(desires for eatables etc)

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ کیلے کھانے کی خواہش۔  
تھیریدیان (Theridion) 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ انڈوں کی خواہش۔  
کلیریا کارب 200 یا 1M 'چھ گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ دودھ کی خواہش۔  
رہس ٹاکس 200 'ہفتہ وار' تین مرتبہ
- ☆ صاف کپڑے یا کچے کھانے چبانے کی خواہش۔  
ایومنا 200 یا اس سے اوپر کی طاقت 'چھ گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ مٹھائیاں کھانے کی خواہش۔  
ار جشم ٹائٹرکیم 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ برف کی طرح ٹھنڈی چیزیں پینے کی خواہش۔  
فاسفورس 200 'چھ گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ نمک (کھانے میں عام نمک سے بھی زیادہ) کھانے کی خواہش۔  
نیزم میور 200 یا 1M 'چھ گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ اچار اور کھٹی چیزیں کھانے کی خواہش۔  
سیپا 200 یا 1M 'چھ گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ چربی، چونا، سلیٹ، پنسل، چاک اور مٹی وغیرہ کھانے کی خواہش۔  
ٹائٹرک ایسڈ 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد' تین مرتبہ
- ☆ کنگنجنس وغیرہ پینے کی خواہش۔  
پلساٹیل 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد' تین مرتبہ





# ناپسندیدگی / نفرت

## Aversion

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ سببوں سے نفرت۔  
انٹیم ٹارٹ 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ آکس کریم پسند نہ کرنا۔  
ریڈیم برومائڈ 200 یا 1M (Radium brom) ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ شہد یا دودھ پسند نہ ہونا۔  
نیزم کارب 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ ہیر سے نفرت۔  
نکس دامیکا 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ مرغی پسند نہ کرنا۔  
بیسی لینم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ ٹھنڈے مشروبات پسند نہ کرنا۔  
آرسنک الہم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ اندوں سے نفرت ہو جانا۔  
فیرم میٹ 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ سبزیاں پسند نہ کرنا۔  
میگنیشیا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ کیلے، کشمش میوے وغیرہ پسند نہ کرنا۔  
برٹا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ تربوز خربوزے اور پمپشری وغیرہ سے نفرت۔  
سلیسیا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ دودھ اور مکھن وغیرہ پسند نہ کرنا اور مٹھائیوں کی خواہش کرنا۔  
ساکٹا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ گائے کے گوشت، برائڈی اور خشک کھانوں سے نفرت۔  
مرک سال 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

- ☆ پیر سے نفرت اور مٹھائی کی خواہش۔  
ار جنٹم ٹائٹریکیم 200 یا 1M ہفتہ وار،  
تین مرتبہ
- ☆ بچے ہوئے کھانوں سے نفرت۔  
لائکوپوڈیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین  
مرتبہ
- ☆ مچھلی، گرم مشروبات، نمک، شوربے، یخنی اور مٹھائی سے نفرت۔  
گریفائٹس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین  
مرتبہ
- ☆ برانڈی اور گو بھی۔ کرم کلمہ وغیرہ سے نفرت۔  
ایس کنڈا کس (Abies Can) 200  
یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ اچار وغیرہ پسند نہ کرنا۔  
چاکلیٹ، کوکو اور مسالوں سے نفرت۔  
ٹرنڈلا ہسپانیہ 200 یا 1M ہفتہ وار،  
تین مرتبہ
- ☆ چکنائی، پھل، گرم مشروبات، پیسٹری، مسالوں وغیرہ سے نفرت۔  
ہلسائیل 200 یا 1M ہفتہ وار، تین  
مرتبہ
- ☆ کافی، دودھ اور دلیے سے نفرت۔  
کلکیر یا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار،  
تین مرتبہ
- ☆ شوربے اور یخنی وغیرہ پسند نہ کرنا۔  
رہس ٹاکس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین  
مرتبہ
- ☆ مٹھائی، نشاستہ والے کھانے اور سڑا بری سے نفرت۔ سلفر 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ ٹھنڈے پانی، پیاز، شراب اور لسن سے نفرت۔ سہاڈیلا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین  
مرتبہ
- ☆ روٹی، مکھن، گرم کھانے اور تربوز وغیرہ پسند نہ کرنا۔  
نیلرم میور 200 یا 1M ہفتہ وار، تین  
مرتبہ
- ☆ الجا ہوا دودھ، پیاز، سگترے، پیسٹری، کھیر، مسالے، گرم مشروبات اور اناج وغیرہ پسند نہ  
کرنا۔  
فاسفورس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین  
مرتبہ
- ☆ بچے مسکراتے چہرے اچھے نہ لگیں۔

امبرا گر - سیا (Ambra gr) 200 یا

1M 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ

امونیم میور 200 'چار گھنٹے بعد' تین

مرتبہ

فلورک ایسڈ 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ والدین اور بیوی کو پسند نہ کرے۔

☆ دوران حمل دوستوں اور سہیلیوں کو پسند نہ کرے۔

☆ وار 'تین مرتبہ

پلاٹینا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ اپنے ہی بچوں کو پسند نہ کرے۔



## اوسی نو فیلیا

### Eosinophilia

خون کے Eosinophil Cells کی تعداد بڑھ جانے کو Eosinophilia کہا جاتا ہے۔ یہ کئی وجوہات سے ہو سکتا ہے۔ مثلاً "بھسمرے کی نالیوں کے دمہ، جلدی امراض، فالٹی لیریا پیدا کرنے والے کرم، نزلے زکام کا الرجک بخار، مملک حد تک خون کی کمی اور کسی موسم کے اثرات کی وجہ سے۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ نظام انضام میں بے قاعدگی اور مختلف طریقے سے ظاہر ہونے والی الرجی۔

ہسٹامائن (Histamine) 200 یا

1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ بلغم، کف یا تھوک بہت کم اور مشکل سے نکلنے والا۔ مریض ذرا سا بھی اختلاف رائے برداشت نہ کر سکے۔ غدود کی بے قاعدگی۔

تھائرائڈین (Thyroidin) 200 یا 1M

ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ تنگی، نفس، سانس کی ٹھن۔ گلے کے گرد ہر چیز کا دباؤ محسوس ہو۔ سونے کے دوران اور جاگنے کے بعد تنگی، نفس اور ٹھن۔ کھنے اور انگور سے بنے ہوئے کھانے اور مشروبات سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

لیکے سس 0/5 اور اس سے اوپر کی

طاقت، چھ گھنٹے بعد

☆ چھینکوں کے ساتھ تنگی، نفس۔ ہر قسم کی ٹھنڈ سے تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔ مریض ہر طرح کی ٹھنڈ سے حساس ہو۔ حتیٰ کہ چھو جانا بھی پسند نہ کرے۔

بیبیر سلف 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ مرطوب موسم کے دوران میں تنگی، نفس۔ ذرا سے ہوا کے جھونکے سے بھی شکایت پیدا ہو جائے چاول اور کیلا وغیرہ کھانے کے بعد تکلیف بڑھ جائے۔

نیزم سلف 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ



☆ حاد اور مزمن ہر طرح کی تکلیف کے لئے آزمودہ دوا۔

کیسیا سفورا (Cassia Sophera) Q  
یا 30، چار گھنٹے بعد

☆ معاون دوا۔

تھوجا 200 OC یا 1M ہفتہ وار، تین  
مرتبہ

بائیو کیمک کی نیزم میور 12x اور نیزم سلف 12x ہر دو گھنٹے بعد یکے بعد  
دیگر۔

مذکورہ ادویات کے علاوہ درج ذیل دوائیں بھی بہت مفید ہیں۔  
سلیسیا، آرسنک البم، اپی کاک، بیسی لینم، ٹوبرکولینم، فاسفورس، میڈورنیم  
اور سفیلینم۔

احتیاط : چونکہ دودھ میں تھائراڈ گلیٹنڈ کی اندرونی رطوبت شامل ہوتی  
ہے اس لئے دودھ سے پرہیز کرنا اچھا ہے۔



# نسیج کے نیچے کی نالی یا خلا کی تکلیف

ناک کی ہڈی کی تکلیف / ناک بند ہونا

Sinusitis

(See cold catarrh etc also)

## علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ رطوبت والی نالیوں میں خشکی ہو۔ سر میں شدید چیرنے اور پھاڑنے والا درد ہو۔ ناک کی جڑ سے درد شروع ہو کر ماتھے کی جانب جائے اور متلی بھی ہو۔

نیزم میور 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ مزمن نزلہ زکام جس میں قوت شامہ (سوگھنے کی حس) جاتی رہے۔ پیلا اور سبز سا بلغم نکلے۔ ٹھنڈی اور کھلی ہوا میں بستر ہو۔

ہلائٹلا 30 یا 200 ' چار گھنٹے بعد

☆ دائیں جانب اور سامنے کے حصے کی ناک کی تکلیف۔ گاڑھی رطوبت خارج ہو پیلے سے رنگ کی۔ ٹھنڈ اور مرطوب یا نمی اور محنت سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

ہیسی لینم 30 یا 200 ' چھ گھنٹے بعد

☆ صبح سویرے کے وقت تکلیفات بڑھیں۔ مریض نمانا پسند نہ کرے۔

سلفر 200 ' ہفتہ وار ' تین مرتبہ

☆ سر کی گدی سے درد شروع ہو کر آنکھ پر ٹھہر جائے پچھے کے نیچے تکلیف میں اضافہ ہو۔

ہلیسیا 1M ' ہفتہ وار ' چھ مرتبہ

☆ پستان کے آپریشن کے بعد ناک کی تکلیف شروع ہو جائے۔

ہیکلا لاوا 3x یا 6x ' چار گھنٹے بعد

☆ ناک کی مزمن اور حاد تکلیف کے لئے۔ نزلے زکام میں تار دار رطوبت خارج ہو۔

کالی بائی کروم 30 ' چار گھنٹے بعد

☆ معاون دوا۔

ہیسی لینم 200 یا 1M ' پندرہویں روز '

تین مرتبہ

ہائیو کیملک کی کالی میور 6x اور ہلیسیا 30

چار گھنٹے بعد دینا بھی بہت فائدہ مند ہے۔

## عدودوں کی بیماریاں Ailments of glands

(See Goitre and Tonsillities also)

انسان کے جسم میں بہت سے غدود ہوتے ہیں ان میں سے بعض غدود ہارمونز بناتے ہیں۔ یہ ہارمونز مخصوص کیمیائی اجزا ہوتے ہیں جن میں بہت سی تبدیلیاں لانے کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ بے ٹالی کے غدود ہوتے ہیں اس لئے ان کے بنائے ہوئے ہارمونز براہ راست خون میں شامل ہوتے ہیں۔ ان غدودوں کے فعل میں کسی قسم کا نقص پیدا ہو جانے سے ہارمونز بنتا بند ہو جائیں تو انسانی جسم پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں اور مختلف امراض جنم لیتے ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ بائیں جانب کے غدودوں کی سوجن جو سخت اور سرخ ہوں۔

مرک بن آیوڈائڈ

3x (Merc bin iod) یا 6' چار گھنٹے

بعد

☆ خواتین کی چھاتیوں میں سخت گٹھی یا گانٹھ۔ پتھر کی سی سختی۔ کھڑ۔

گلکیریا فلور 12x یا 30' چار گھنٹے بعد

☆ دائیں جانب کے غدودوں کی سوجن۔ سختی اور سرخی۔

مرک پرڈو آیوڈائڈ 3x یا 6' چار گھنٹے

بعد

☆ چٹے کے غدودوں کی سوجن۔

ٹر۔ بستہ (Terebinth) Q یا 6' چار

گھنٹے بعد

☆ گردن سے متعلقہ غدودوں کی سوزش۔

رہس وینا (Rhus Ven) 30' چار

گھنٹے بعد

☆ غدودوں مثلاً "تھائرائڈ" گلے کے ٹونسل وغیرہ کا بڑھنا۔

گلکیریا آیوڈیم 3x یا 6' چار گھنٹے بعد

☆ نچلے جڑے کے غدودوں کی سوجن۔

پائنس (Pinus Syl) 6 یا 30 چار  
گھنٹے بعد

☆ کان کے پاس کے غدودوں کی بانٹوں کی سختی، کڑا پن اور بے حسی۔ تھارائنڈ اور دوسرے  
غدودوں کا بڑھ جانا۔

☆ برومیم 30 چار گھنٹے بعد  
غدود پتھر کی طرح سخت ہو جائیں خصوصاً "غیر شادی شدہ مرد اور عورتوں کے۔ آہستہ  
آہستہ کمزوری پیدا ہو رہی ہو۔

☆ کوئیم میک 200 یا 1M ہفتہ وار، تین  
مرتبہ

☆ معاون دوا۔

☆ ٹوبر کوئیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین  
مرتبہ

☆ بائو کیمک کی کلکیریا فاس 6x کالی میور 6x سلیسیا 30 چار  
گھنٹے بعد دینا مفید ہے۔ اور غدودوں کی ختازیری بو کے لئے  
نیزم فاس 6x فائدہ مند ہے۔





## ہچکی

## Hiccough

ہچکی آنا بذات خود کوئی مرض نہیں ہے۔ یہ مرض عام طور پر معدے کی خرابی اور بد ہضمی کی وجہ سے ہوتا ہے بعض اوقات پیٹ کے دوسرے امراض یا گلا خشک ہونے سے بھی ہچکی آجاتی ہے۔ درجہ عمل حجاب حاجز (ڈایا فرام) میں تشنج ہو کر سکڑنے سے ہچکی آتی ہے۔ بچوں کے معدے میں دودھ کے زیادہ پھٹ جانے یا زیادہ کھالینے سے اچھارہ ہو جاتا ہے اور ہچکی آتی ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو عموماً "بد ہضمی کی وجہ سے ہچکی آتی ہے۔ کلیجے کی جلن اور جگر کے فعل میں کستی بھی اس مرض کے اسباب سمجھے جاتے ہیں۔

## علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ ٹھنڈے خوس کرنے والا مریض۔ گیس یا ریاحی وجوہات سے ہچکی آئے۔  
نکس دامیکا 30 یا 200 ' آدھے گھنٹے  
بعد، تین مرتبہ
- ☆ سگریٹ نوشی کے بعد۔ گرم مشروبات پینے کے بعد زیادہ ہچکیاں آئیں۔  
دراثرم البم 30 یا 200 ' 10 منٹ بعد،  
تین مرتبہ
- ☆ ہسٹریا کی وجہ سے۔ کسی آپریشن کے بعد۔ تشنج یا اینٹھن کے ساتھ کھانے کے بعد۔  
ہائیو سائمس (Hyoscyamus) 30 یا  
200 ' تین گھنٹے بعد
- ☆ سخت بے چینی۔ سگریٹ نوشی کے بعد۔ ٹھنڈے مشروبات پینے کے بعد یا دوران بخار  
زیادہ ہچکیاں آئیں۔  
آرسنک البم 30 یا 200 ' آدھے گھنٹے  
بعد
- ☆ اونچی آواز کے ساتھ شدید ہچکیاں۔ تشنج یا اینٹھن کے ساتھ۔  
سکوٹا 30 یا 200 ' دو گھنٹے بعد
- ☆ کھانے، جذباتی بد نظمی یا سگریٹ نوشی کے بعد۔  
اگنسیا 200 یا 1M ' 10 منٹ بعد، تین  
مرتبہ
- ☆ ہر قسم کی اشتعال انگیزی یا تحریک مثلاً "ہنسنے بات کرنے یا کھانے کے بعد۔  
کاجوپوٹم (Cajuput) 30 ' تین گھنٹے  
بعد
- ☆ سوزشی اور ششی کیفیت میں ہائیو کیمک کی میگنسیا فاس 6x  
گرم پانی میں دینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔

## ہسٹیریا/باؤگولہ

### Hysteria

ہسٹیریا کا مرض نظام عصبی کے افعال میں خلل واقع ہونے سے پیدا ہوتا ہے لہذا یہ عصبی مرض ہوتا ہے عام طور پر یہ مرض عورتوں کو ہوتا ہے۔ البتہ مردوں میں بھی یہ مرض دیکھنے میں آتا ہے۔ اس بیماری میں مریض کا گلا گھٹتا ہے۔ اس مرض کو باؤگولہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مرض کا دورہ پڑنے پر مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ میں سے ایک گولہ اٹھ کر اور اوپر کو جا کر اس کے حلق میں اٹک گیا ہے۔

پہلے زمانے میں اطباء کا خیال تھا کہ عورتوں کو یہ مرض رحم کی خرابی کے سبب ہوتا ہے لیکن اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مرض نہ صرف ایسی مستورات کو بھی ہوتا ہے جن کے رحم میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے بلکہ ان خواتین کو بھی ہو جاتا ہے جن کا رحم ہوتا ہی نہیں۔ لہذا یہ مرض کسی عضو کے نقص کی وجہ سے نہیں بلکہ نظام عصبی کے فعل میں عارضی نقص ہونے سے اس مرض کا دورہ پڑتا ہے۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ سر آگے کی جانب جھٹکے کھائے۔ بے ہوشی کے دورے پڑیں۔

نکس موسکاٹا 30 یا 200 چم گھٹنے بعد

☆ صدے کے برے اثرات کی وجہ سے۔ خوف اور غصہ۔ بیماری کے نفسیاتی عوامل۔ جڑے بھیج جائیں۔

نیزم میور 200 چار گھٹنے بعد، تین مرتبہ

☆ مزاج بدلتا رہے۔ کبھی ہنسے اور کبھی چیخیں مارے۔

اکیشیا 200 یا 1M 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ تھائزائمڈ غدود اور لعاب اور کف بنانے والے بیضوی غدود فعل کرنا چھوڑ دیں۔ اچانک سانس رک جائے۔ چڑھتے ہوئے تکلیف بڑھ جائے۔

گلکیریا کارب 200 یا 1M 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ مہری غفلت اور بے ہوشی۔ جنون۔ شہوت پرستانہ خیالات۔ بھاگنے کی کوشش کرے۔  
غیر حاضر دماغی۔ مریض جسم سے کپڑے اتار دے۔

ہائیو سائمس (Hyoscyamus)  
200 'چار گھنٹے بعد

☆ اچانک رطوبات کا اخراج رک جانے کی وجہ سے۔  
ایسوٹڈا 200 'چار گھنٹے بعد' تین مرتبہ  
ہائیو کیمک کی کلکیریا فاس 6x 'کالی فاس 6x اور نیڑم میور  
12x 'چار گھنٹے بعد بہت فائدہ مند ہے۔



## دورے

### Convulsions (Fits)

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ مریض کی گرم اور سرخ جلد۔ چمکدار تہمتاتا چہرہ۔ چمکتی آنکھیں۔ خاص طور پر دانت نکالنے کی عمر میں بچوں کے دورے۔

بیلادونا 30 چار گھنٹے بعد

☆ پانی دیکھنے کے بعد دورہ۔ خاص طور پر مرگی کے مریض یا پانی سے خوف کھانے والے افراد کا دورہ۔

لائسن (Lyssin) 200 یا 1M یا 10

متن بعد، تین مرتبہ


☆ دورہ کی کیفیت میں جسم (مڑتڑ) بدوضع ہو جائے۔ کمر کمان کی طرح پیچھے مڑ جائے۔  
سکوتا (Cicuta V) 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ کھانسی کی وجہ سے دورہ۔  
کوہلم میٹلیکم 30 یا 200 تین گھنٹے بعد

☆ شدید قسم کا دورہ۔ جسم مڑتڑ جائے۔ اندھیرے سے خوف۔  
سٹرامونیم 30 تین گھنٹے بعد

☆ بچوں کے پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے دورہ۔  
سانا 200 یا 1M چھ گھنٹے بعد

ہائیپو کیمک کی کالی فاس 6x میگنسیا فاس 6x اور نیڑم فاس 6x بھی چار چار گھنٹے بعد دینا مفید ہے۔ شدید حملے کی صورت میں یہ دوا میں مختصر وقفے کے بعد بھی دی جاسکتی ہیں۔





# خوف/ڈر

## Fear

(See anxiety also)

ڈر اور خوف بذات خود کوئی مرض نہیں ہے بلکہ نفسیاتی اور ذہنی کیفیت کی وجہ سے انسان مختلف قسم کے ڈر اور خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ مریض کے دل سے ان چیزوں کا ڈر خوف نکال دیا جائے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ مریض بلاوجہ کے وہم میں گرفتار ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ تسنہ کا خوف۔  
لکے س 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ اندھیرے کا خوف۔  
سٹرامونیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ کتوں یا جانوروں سے خوف۔  
بیلا ڈونا 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ غربت کا خوف۔  
کلکیریا فلور 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ ناکامی (امتحان یا انٹرویو وغیرہ) کا خوف۔  
جیلی میم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ
- ☆ حادثے کا خوف۔  
کاربووٹیج 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ بلندی سے گرنے کا خطرہ یا خوف۔  
بوریکس 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ بچہ بستر پر اکیلا جانے سے ڈرے۔  
کاشی کم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ شیو کرتے ہوئے چہرہ کٹنے کا ڈر۔  
کیلڈ مس (Caladiums) 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ 'مرج چمک' طوفان اور بھوت وغیرہ کا ڈر۔ اکیلے پن سے خوف۔  
فاسفورس 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ زندگی سے تنگ۔ طویل بیماری۔ موت کا خوف۔

نیوکوکسین (Pneumococcin)  
200 '10 منٹ بعد 'تین مرتبہ

☆ جب کاربوئیج موثر نہ ہو۔

سورنیم 200 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ چھڑے چاقو یا نوکدار چیزوں سے خوف۔

سپائی جیلیا 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین  
مرتبہ

☆ ڈ-شٹ (دانتوں کے ڈاکٹر) کے پاس جاتے ہوئے خوف۔ دق یا ایسی بیماری کا خوف جس  
سے آدمی گھل جاتا ہے۔ چھوت کی بیماری کا ڈر۔

کلیریا کارب 200 یا 1M 'ہفتہ وار'  
تین مرتبہ

☆ حاضرین کے سامنے یا انٹرویو یا امتحان میں بیٹھنے کا خوف۔

ار جٹم ٹائٹریکیم 30 یا 200 '10 منٹ  
بعد' تین مرتبہ

☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والا مریض۔ تنہائی سے خوفزدہ۔ کھلی ہوا میں بہتر محسوس کرے۔

ہلٹاٹلا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ باہر جانے، ہجوم میں جانے، سڑک عبور کرنے، ریل اور بس میں سوار ہونے سے ڈر اور  
خوف۔

اکونائٹ 30 'چار گھنٹے بعد'

سلفر 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ معاون دوا۔



# جمائیاں

## Yawning

جمائی بذات خود کوئی مرض نہیں ہے۔ بلکہ اس کا عام سبب عمر کی مناسبت سے نیند کی ضرورت پورا نہ ہونا ہے۔ گویا رات کے وقت پر سکون اور گہری نیند نہ آنے کی وجہ سے دن کے وقت نیند کا غلبہ ہونے پر جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ چھٹکن یا زیادہ محنت کرنے سے بھی جمائی آ جاتی ہے۔ عام طور پر ہاتھ اوپر اٹھا کر جمائی لینے سے جسم کھل جاتا ہے اور سستی رفع ہو جاتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ شخی جمائیوں کے لئے۔

پلاٹینا 200 یا 1M 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ شدید قسم کی اور شخی جمائیوں کے لئے۔

روہس ٹاکس 200 یا 1M چار گھنٹے بعد

☆ کھانے کے بعد جمائیاں آئیں، اعضاء میں تناؤ کھچاؤ ہو۔

ٹکس دامیکا 30 یا 200، تین گھنٹے بعد

☆ جمائیوں کے ساتھ تنگی نفس ہو۔

برائی اونیا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد

☆ جسمانی طور پر مصروف ہونے کے باوجود جمائیاں آئیں۔ طبیعت میں بے چینی اور تشویش

اکونائٹ 30 یا 200، دو گھنٹے بعد

پائی جائے۔

☆ جمائیوں کے بغیر غنودگی اور اونگھ۔

چیلی ڈونیم 30، چار گھنٹے بعد

☆ دن کے وقت میں سونے کی خواہش کرے اور جمائیاں آئیں۔ مسلسل خیالات آنے کی وجہ سے گہری نیند نہ ہو سکے۔ ذہن ہمیشہ سوچنے میں مصروف رہے۔ نظریات کا سلسلہ بندھا

سلفر 200 یا 1M 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

مرتبہ

☆ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اور کھنچ کر جمائیاں لے۔

☆ روٹا 30 g یا 200 'چار گھنٹے بعد  
☆ اگرچہ رات کو خوب اچھی طرح سو لے۔ تاہم دن میں سونے کی خواہش کے ساتھ  
جمائیاں آئیں۔

☆ لائیکو پوڈیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد  
☆ جمائیاں آنے پر مریض کو مختلف شکایات/تکالیف پیدا ہو جائیں۔ مثلاً "کانپے اور روتنے  
کھڑے ہونا۔

☆ سائنا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد  
جمائیوں کے لئے آرنیکا، اگنیشا، اور نیزم میور بھی اچھی ادویات  
ہیں۔





## لو لگنا

### Affections of Sun Stroke

لو لگنے سے مراد سورج کی تیز گرمی سے جھلس جانا ہے۔ اس میں حرارت بڑھ جانے کی وجہ سے خون جوش میں آ جاتا ہے۔ دماغ اور ریڑھ کے ستون کو صدمہ پہنچتا ہے اور شدید کمزوری ہو جانے کی وجہ سے نقاہت اور غشی طاری ہو جاتی ہے۔ بروقت علاج اور دیکھ بھال نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس تکلیف میں چہرہ زرد پڑ جاتا ہے نبض بھری ہوئی ہوتی ہے اور حرارت جسم بہت بڑھ جاتی ہے۔ دماغ میں اجتماع ہڈیاں سر درد، تیز بخار اور بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ عصبی نظام پر برا اثر پڑتا ہے۔ تشنج اور آنکھ کی پتلیاں بھی پھیل سکتی ہیں۔ اس مرض سے بچنے کے لئے تیز دھوپ گرم ہوا اور تمازت سے پرہیز کرنا چاہئے۔ سخت گرمی کے دنوں میں زیادہ محنت، ورزش اور سفر سے بھی گریز کرنا چاہئے۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ بے ہوشی۔ آنکھیں قریباً بند۔ چہرہ سرخ، سیاہی مائل اور دھبے دار۔ مریض بے سدھ ہو۔

ادویم 200 یا 1M آدھے گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ سر بہت زیادہ سرخ۔ تکلیف کا اچانک حملہ ہوا ہو۔ پیشاب اور پاخانہ غیر ارادی طور پر خطا ہو جائے یا نکل جائے۔

آرنیکا مونٹ 30 آدھے گھنٹے بعد

☆ اچانک سر بھاری ہو جائے۔ ایسا لگے کہ کسی چیز سے باندھ دیا گیا ہے۔ پھاڑنے والا سر درد جس میں ناطاقتی ہو اور مریض بے حال ہو جائے۔

کیکٹس گرینڈی فلورس Q یا 30 آدھے گھنٹے بعد

☆ دھوپ میں سر کھلا رہا ہو اور دھوپ یا لو لگ گئی ہو۔ خاص طور پر جب مریض سو رہا ہو۔ بہت زیادہ پیاس۔ آنکھیں اور چہرہ سرخ ہو۔ شدید بے چینی اور فکر۔ موت کا خوف۔ اکونائٹ 30 یا 200 آدھے گھنٹے بعد

☆ لو لگنے کے بعد ذہنی پر آگندگی۔ کپکپی اور افسردگی اور بے حال پن۔ نظر دھندلا جائے۔ پشت سر پر شدید درد۔

جیلی میم 30 آدھے گھنٹے بعد

☆ حیاتیاتی قوتوں کے نڈھال پڑنے کے ساتھ جھٹکے پڑیں۔  
 سکیمفورا Q 5-10 قطرے، آدھے گھنٹے

☆ سر درد، متلی، سر چکرائے۔ تے ہو۔ نظر جاتی رہے۔ حرکت کرنے شور اور آنکھیں کھولنے سے تکلیف بڑھے۔

☆ دل ڈوبے بہت زیادہ متلی اور تے۔ سخت چٹکن والا سر درد۔ ایسا محسوس ہو کہ دماغ پھیل رہا ہے۔

☆ اچانک حملہ ہو اور سر بھاری ہو جائے۔ سر بوجھل اور بھرا محسوس ہو۔ تے ہو۔ ہاتھ پاؤں اور چہرے کے اوپر ٹھنڈا پھیند آئے۔

☆ سرخی کے ساتھ گرمی اور چٹکن والا درد ہو۔  
 ورائزم درائڈ 30، آدھے گھنٹے بعد

☆ لو لگنے کے ایک دن بعد۔ جبکہ اس کا رد عمل ہونے کا امکان ہو۔  
 پیلاڈونا 30، آدھے گھنٹے بعد

☆ کیسترس 6 یا 30، تین گھنٹے بعد  
 بائیو کیمک کی نیزم میور 6x اور کالی فاس 6x آدھا گھنٹہ بعد  
 دینا بھی بہت فائدہ مند ہے۔

## لو لگنے کے اثرات

### After Effects of Sun Stroke

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ خون کی کمی ہو جائے۔ دھوپ اور گرمی میں تکلیف محسوس کرے۔ جسمانی یا دماغی نقص پیدا ہو جائے۔ دھوپ میں بے ہوش ہو جائے۔ شدید پیاس لگے۔ پاخانہ قبض سے ہو۔  
 نیزم میور 200، 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ سورج کی گرمی اور ماحول میں بجلی کی تبدیلی سے مریض کی تکلیف میں اضافہ۔ سر میں ہتھوڑے سے لگنے کا درد۔ مریض موسم گرما میں کمزوری محسوس کرے۔

لیکے سس 200 '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ سورج نکلنے اور بڑھنے کے ساتھ ہی مریض کی شکایات میں اضافہ ہو جائے اور جیسے جیسے سورج غروب ہو مریض توانائی محسوس کرے۔

سیلینم (Selenium) 30 'چار گھنٹے

بعد

☆ مریض گرمی کے موسم میں زیادہ تکلیف محسوس کرے۔ سر درد ہو۔ دھوپ میں رہتے ہوئے صحیح طور پر سوچ بچار نہ کر سکے۔

نیزم کارب 200 '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ لو لگ جانے کی وجہ سے جانی پہچانی گلیوں اور سڑکوں کو بھول جائے۔

گلوٹائٹن 3x یا 30 'چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی نیزم میور 6x بھی مفید دوا ہے۔



## سفری بیماریاں / امراض

### Travel Sickness

بعض افراد خاص طور پر خواتین کو سفر کے دوران متلی اور تے ہونے لگتی ہے۔ پیٹ میں مروڑ ہونے لگتی ہے۔ پیٹھے اکڑ جاتے ہیں۔ دل ڈوبنے لگتا ہے۔ چکر آنے لگتے ہیں۔ نازک مزاجی اور ذکی الحسی اس کا خاص سبب ہوتے ہیں۔ جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی تحسُن، متلی اور تے ہوتی ہے۔ معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی سفر میں تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ پہاڑ پر جانے سے پیدا ہونے والی بیماریاں۔

کوکا 6x یا 30' دو گھنٹے بعد

☆ سفر کے دوران لگا تار متلی اور زبان صاف ہو۔

اپی کاک 30' آدھے گھنٹے بعد

☆ ہوائی جہاز، سمندر، ریل اور سڑک سے سفر کرتے ہوئے متلی ہو۔ تے کرنے کے لئے آمادہ ہو۔ کچھ کھانے کو جی نہ چاہے۔

کوکولس اینڈیکا 30' آدھے گھنٹے بعد

☆ متلی ہو۔ منہ میں پانی جمع ہو جائے۔ خالی پیٹ درد۔ کھانے سے بہتر ہو۔ پیٹھ کراٹھنے سے تکلیف بڑھے۔ پیٹھے اکڑ جائیں۔

نکس دامیکا 30 یا 200' آدھے گھنٹے

بعد

☆ انتہائی شدید متلی اور تے۔ بے ہوش ہونے اور دل ڈوبنے کا احساس۔ تمباکو کی بو سے تکلیف بڑھ جائے۔ سمندر میں بیمار ہو جائے۔

ٹناکم 30' آدھے گھنٹے بعد

☆ بھوک اڑ جانے کے ساتھ متلی اور تے۔ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے چکر آئیں۔ کھوپڑی چھوئے تک سے ذکی الحسی۔ ہوا میں ہونے کی وجہ سے بیماریاں۔ روہس ٹاکس 30 یا 200' آدھے گھنٹے

بعد

☆ ہوائی سفر میں۔ نیچے کی طرف حرکت کرنے سے خوف آئے۔ پوریکس 30' آدھے گھنٹے بعد



## پياس نڊارد

### Absence of Thirst

دنيا ميں شايد هي ايسا کوئي شخص هو جس کو پياس نه لگتي هو البته پياس کي شدت موسم حالات اور کيفيات کي مناسبت سے کم زياده هو سکتی ہے۔ کچھ لوگ زياده پاني پيتے هيں جبکہ کچھ لوگ کم پيتے هيں۔ کچھ لوگ وقفے وقفے سے جلدی جلدی اور تھوڑا تھوڑا پاني پيتے هيں اور کچھ طويل وقفے کے بعد زياده مقدار ميں پاني پيتے هيں۔ سردی کي نسبت گرمی ميں زياده پاني پيا جاتا ہے۔ اسي طرح بعض تکاليف ميں مريض زياده پاني پيتا ہے۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانيہ

- ☆ تيز نمبر پکڑ هونے کے باوجود پياس نه هو۔ جيلي ميم 30 يا 200 دو گھنٹے بعد
- ☆ گلے کي سوجن اور ورم کے ساتھ پياس نه هو۔ ايسس مليفکا 30 يا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ منہ خشک هونے کے باوجود پياس نڊارد۔ پلساٹيلا 30 يا 200 چار گھنٹے بعد

## شديد پياس

### Excessive Thirst

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانيہ

- ☆ منہ اور گلا خشک هو۔ دودھ پينے کي خواهش کرے۔ روہس ٹاکس 30 يا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ تيز بخار اور بے چيني کے ساتھ سخت پياس۔ اکونائٹ 30 يا 200 دو گھنٹے بعد
- ☆ نه بچنے والی پياس۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ذرا ذرا سا پاني پئے۔ آرسنک الہم 30 چار گھنٹے بعد
- ☆ ٹھنڈی چیزوں کي پياس ايک وقت ميں بہت مقدار ميں پاني يا مشروبات پئے۔ برائی ادنيا 30 يا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ بہت زياده نمک کھا لینے کي وجہ سے پياس۔ قبض هو۔ نيزم ميور 30 يا 200 چار گھنٹے بعد
- ☆ بايو کيمک کي کالی فاس 6x اور نيزم ميور 12x چار گھنٹے بعد دينا بھی مفيد ہے۔

# خوبصورتی کی ہلکی سی ضربیں

## Beauty Tips

چہرہ سرخ ہو جانا، تھماہٹ (glow)

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ خون کی کمی کی وجہ سے چہرے کی پیلی رنگت۔

فیرم میٹلیکم 3x چار گھنٹے بعد

☆ طویل عرصے سے اعصابی تناؤ یا اعصابی کمزوری کی وجہ سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔

فاسفورس 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ خشک کھردری جلد کے لئے۔ نہانا پسند نہ کرے۔ متاثرہ جگہ پر خارش یا اس جگہ کو کھرچے۔

سلفر 30 یا 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ پرانے جلے یا زخموں کے نشان۔ آسانی سے خون بہہ نکلے۔ مسے نکل آئیں۔

کاشی کم 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ کھجانے کے بعد درد۔ جلد خشک اور کھردری۔ مریض ٹھنڈا موسم پسند کرے۔

سورنیم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ چہرہ جھنسیوں سے بھرا ہو۔ جلد خشک، کھردری، چھلکے والی۔ رنگت صاف کرنے کے لئے۔

بربرس ایکوی فولیم Q 4-5 قطرے، چار گھنٹے بعد

☆ سیاہ دھبے۔ جلد خشک، کھردری اور چھلکے والی۔ جلد میں جلن کا احساس۔ طبیعت میں بے چینی۔

آرسنک البم 30 چار گھنٹے بعد

☆ کسی صدمے یا رنج کی وجہ سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جائیں۔

نیرم میور 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ چہرے پر مردے کی سی پیلاہٹ اور آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔

سمتھ 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ تاک اور گالوں پر گھوڑے کی زین کی طرح بھورے رنگ کے دھبے۔ سینے پر زرد دھبے۔  
زرد رنگت۔

سیپا 200 ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ نسیج کے داغ دھبے یا زخم کے نشان صاف کرنے کے لئے۔

تھائیوسنا مینم (Thiosinaminum)

3x چار گھنٹے بعد

☆ رطوبات حیات ضائع ہو جانے کی وجہ سے چہرہ زرد اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی۔

چائنا 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ نیلے، ارغوانی دھبے۔ زرد چہرہ۔ یرقان زدہ۔ مریض گردن، چھاتی اور پیٹ پر کپڑوں تک کا دباؤ برداشت نہ کر سکے۔

لیکے سس 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد  
تین مرتبہ

☆ مے، جلد کا سرطان، جلد پر لہسن کے نشان، بڑی پھنسیاں اور بھورے داغ دھبے۔

تھوجا 200 OC ہفتہ وار، چھ مرتبہ

پیدائشی نشانات، داغ اور سخت جلد کے لئے بائیو کیمک کی  
کلیریا فلور 12x بہت مفید دوا ہے۔



## چلنے کا انداز

Gait (walking)

علامات 'دوا اور طاقت' دورانہ

- ☆ ٹانگیں بھاری محسوس ہوں جیسے لکڑی یا شیشے کی بنی ہوں۔  
تھوچا 200 OC یا 1M 'پندرہویں روز'  
چھ مرتبہ
- ☆ ناہموار زمین پر چلنا مشکل ہو۔  
للیم ننگ (Lillum Tig) 30 یا  
200 'ہفتہ وار' چھ مرتبہ
- ☆ تیزی۔ تمام اعضاء کی عملی حرکات کو بڑھانے اور چست رکھنے کے لئے۔  
کافیا (Coffea) 30 یا 200 'ہفتہ وار'  
تین مرتبہ
- ☆ چلتے ہوئے پاؤں کو کھینچے۔  
نکس دامیکا 30 'چھ گھنٹے بعد'
- ☆ چلتے چلتے اچانک گر جائے۔  
کنیشیا کارب 30 'ہفتہ وار' چھ مرتبہ
- ☆ چلتے ہوئے غیر ارادی طور پر لٹکرائے۔  
بیلاڈونا 200 'چھ گھنٹے بعد'
- ☆ ششی کھچاؤ۔ چلتے ہوئے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔  
لیکے سس 30 یا 200 'پندرہویں روز'  
چھ مرتبہ
- ☆ چلتے ہوئے ٹانگیں سے کی طرح بھاری لگیں۔  
میڈورنیم 200 یا 1M 'پندرہویں روز'  
تین مرتبہ
- ☆ سیدھا نہ چلے۔ لڑکھڑائے یا ڈمکائے۔  
ارہشم ٹائٹریکیم 30 یا 200 'پندرہویں روز'  
چھ مرتبہ



☆ معمول سے زیادہ پاؤں اوپر اٹھائے اور نیچے بھاری پن کے ساتھ لائے۔  
ہیلوڈرما 200 'ہفتہ وار' چھ مرتبہ

☆ چلتے ہوئے ایڑی زمین کو نہ لگے۔

لیتھارس (Lathyrus) 200

پندرہویں روز 'چھ مرتبہ

☆ چلتے ہوئے غیر ارادی طور پر لاتیں پیچھے کو پھینکے۔

مرکیورس سال 30 یا 200 'چھ گھنٹے  
بعد

☆ سر اور کندھے جھکا کر چلے۔

آرنیکا 200 'ہفتہ وار' چھ مرتبہ

جب مذکورہ ادویات دی ہوئی طاقتوں میں کام کرنا چھوڑ دیں تو

اس سے اوپر کی طاقت علامات کے مطابق دینی چاہئے۔



# لاغری

## Emaciation

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ ٹانگیں کمزور ہو جائیں۔ دستوں کے بعد ٹانگوں کی لاغری۔  
بودشا 30 ' چار گھنٹے بعد
- ☆ اعصابی تھکن اور کمزوری کے لئے بہترین ٹانک۔  
کالی فاس 6x یا 30 ' چار گھنٹے بعد
- ☆ اعصابی تناؤ۔ نیند نہ آنے کے سبب کمزوری کے لئے۔  
فاسفورس 200 ' 10 منٹ بعد ' تین مرتبہ
- ☆ کسی حادثہ بیماری کے بعد کی لاغری کے لئے۔ بظاہر کمزوری کا کوئی سبب نہ ہو۔  
الفلفا ٹانک ' کھانے سے پہلے
- ☆ ٹھنڈ محسوس کرنے والے مریض۔ اعصابی تھکن کی وجہ سے کمزوری کے لئے۔  
کلکیریا کارب 200 ' چار گھنٹے بعد ' تین مرتبہ
- ☆ معاون دوا۔ خاص طور پر سورا کے مریضوں کے لئے۔  
سورینم 200 یا 1M ' ہفتہ وار ' تین مرتبہ
- ☆ بچوں کا دیر سے چلنا اور بولنا سیکھنا۔ کمزور بچے۔ گردن میں خاص طور سے لاغری۔ جسم پر گوشت کی کمی۔  
نیزم میور 30 یا 200 ' پندرہویں روز ' تین مرتبہ
- ☆ نچلے اعضاء کی لاغری جو اوپر کے اعضاء کی جانب بڑھے۔  
ابروٹینم (Abrotanum) 30 یا 200 ' پندرہویں روز ' تین مرتبہ
- ☆ اگرچہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے کھائے پئے لیکن جسم سے گوشت کم ہوتا جائے۔  
آیوڈیم 30 یا 200 ' پندرہویں روز ' تین مرتبہ
- ☆ اس قسم کی تکلیف میں طبی علاج بہتر ہے۔ مریض کی خوراک اور کھانے پینے کا خصوصی خیال رکھنا چاہئے۔

## چہرے کی جلد کا دق

### Lupus

یہ بیماری چالیس سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں پائی جاتی ہے۔ اس مرض میں عموماً ناک اور رخسار سرخ ہو جاتے ہیں اور جلد پر ورم آجاتا ہے جس پر باریک باریک چھلکے بن جاتے ہیں۔ کسی کسی جگہ سے جلد ٹھیک ہو کر داغ پڑ جاتے ہیں۔ دھوپ اور گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔

خیال یہ ہے کہ یہ مرض جسم کے اندر کسی قسم کے حساسیاتی رد عمل کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ تاحال اس مرض کا اصل سبب معلوم نہیں ہو سکا۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ بہترین اور بطور معاون دوا۔

ریڈیم برومائڈ 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ چہرے پر داغ دھبے پڑ جائیں۔ دھوپ میں جانے سے بڑھ جائیں۔

نیٹرم کارب 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ ناک پر گھوڑے کی زین کی طرح کی بھوری لکیر۔ پیاروں اور رشتہ داروں سے لاپرواہ اور ناپسندیدگی۔

سپیا 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ چہرے کی جلد کی دق جلن کے احساس کے ساتھ۔ بے چینی اور تھکن۔ گرمی سے بہتر۔ ٹھنڈ سے تکلیف بڑھے۔ نہ بجھنے والی پیاس۔

آرسنک البم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

دیگر اہم ادویات : کلیریا کارب، گریفائٹس، لائیگوپوڈیم، مرک سال، نیڑم میور، روہس ٹاکس، سلیسیا، شفٹی یگریا، سلفر اور سیڈیم وغیرہ۔



# ناخن کی تکلیفات

## Affections of Nails

اس مرض میں ناخن کے ارد گرد اور اس کی جڑ میں سوجن ہو جاتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے۔ ناخن کے نیچے زخم بن کر پک جاتا ہے اور اس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ ناخن کو دبانے سے مواد خارج ہوتا ہے اور انگلی سے ناخن الگ ہو جاتا ہے اور نیچے سے زخم نکل آتا ہے۔ اس کے علاوہ ناہموار اور ٹیڑھے میڑھے کمزور اور بد شکل، درد کرنے والے، داغ دھبوں والے، گوشت کے اندر گھے ہوئے ناخن بھی ہوتے ہیں۔ پاؤں کے انگوٹھوں اور انگلیوں پر بوائیاں بن جاتی ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ غیر صحت مند ناخن اور بال۔ ذرا سے بھی چھونے سے حساس۔  
میکنیشیا کارب 30، چھ گھنٹے بعد
- ☆ نرم اور جلد ٹوٹنے والے ناخن۔ ناخن موم کی طرح نرم و نازک ہو جائیں اور شکل بگڑ جائے۔  
تھو جا 200 OC یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ
- ☆ انگلیوں اور انگوٹھوں کے درمیان چھالے اور پھنسیاں ناخن گرنے لگیں۔  
بیلے بورس 30 یا 200، چھ گھنٹے بعد
- ☆ ناخن گوشت کے اندر بڑھنے لگیں۔ ان میں درد ہو۔  
میکٹس پولس  
'30 (Magnetis Pol australis)  
چھ گھنٹے بعد
- ☆ ناخنوں پر دھبے اور جھریاں پڑ جائیں۔ ناہموار ناخن۔  
کلیریا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار، چھ مرتبہ
- ☆ بہت زیادہ حساس، ڈھیلے ہو جائیں۔ درد بھرے۔  
بیر سلف 30 یا 200، چار گھنٹے بعد
- ☆ نقرے لولے، ٹوٹے پھوٹے ناخن۔ انگلیوں کے ناخنوں میں زخم۔ ناخنوں پر سفید دھبے۔  
پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن اندر کو گھس جائیں۔  
سلیسا 12x یا 30، چھ گھنٹے بعد



☆ تاهوار ناخن۔ نرم اور جلد ٹوٹنے والے۔ بد شکل آسانی سے ٹوٹ جائیں۔ بہت تیزی سے بڑھیں۔

فلورک ایسڈ 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد

☆ پاؤں کے انگوٹھوں پر بوئیاں بن جائیں۔ ٹھنڈے اور نیلے ناخن۔ درد بھرے۔

ٹائٹرک ایسڈ 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد

☆ انگلیوں اور پاؤں کے انگوٹھوں کے ناخن موٹے ہو جائیں۔ اگرچہ سخت ہوں لیکن جلدی ٹوٹنے لگیں اور گرنے لگیں۔ سیاہ ہوں۔

گریفائٹس 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد

☆ انگلیوں میں درد اور سوجن اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی باریک ہڈیوں میں درد۔

مارٹینکاسیب (Myristica Seb) 3x یا

6 'تین گھنٹے بعد

☆ ناخن چرے اور سخت لیکن جلد ٹوٹنے والے ہوں۔

امبرا 30 gr یا 200 'چھ گھنٹے بعد

☆ خون کی کمی اور عام کمزوری والا مریض۔ ناخنوں کی جڑوں میں درد۔

ٹکیریا فاس 6x یا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ ناخن بہت آہستہ آہستہ بڑھیں 'مرطوب آب دہوا میں بہتر ہوں۔

کاشی کم 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد

☆ ناخن بے رنگ اور بد شکل ہو جائیں۔

نیٹرم آر سنکم 30 یا 200 'چھ گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی نیزم میور 12x اور سلیسیا 30x چار چار گھنٹے

بعد دینا بھی بڑا فائدہ ہے۔



## کراز چاندنی (بدن یا اعضاء کا اکڑ جانا)

### ٹیتنس Tatanus

ٹیتنس کا مرض بیسی لس آف ٹیتنس نامی کرم سے پیدا ہوتا ہے۔ جو اسطبل کی کھاد اور سڑکوں کی مٹی میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ کسی زخم کو غلاقت لگنے یا سڑک پر حادثہ ہو جانے سے چوٹ لگنے پر جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس کا زہر جب اعصابی مرکزوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو بدن یا اعضاء اکڑ جاتے ہیں۔ اگر اس مرض کا بروقت اور مدافعتی علاج نہ کرایا جائے تو نوبت موت واقع ہونے تک پہنچ جاتی ہے۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ موت کی سی ٹھنڈک کے ساتھ بدن اکڑ جانا۔

کمفورا 200 یا 1M 'آدھے گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ ٹیتنس کی اینٹھن اور تشخ۔

دراثرم ورائڈ 200 یا 1M 'آدھے گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ زخم لگ جانے کے بعد ٹیتنس سے بچاؤ کے لئے۔

لیڈم پال 200 یا 1M 'آدھے گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ منہ کے کوئے کے کھچاؤ کے ساتھ ٹیتنس۔

سٹراپنچن (Strychnine) 200 یا 1M 'آدھے گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ منہ سے جھاگ آئے اور جسم نیلا پڑ جائے۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ 3x 'آدھے گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ آنکھ کی پتلیاں باری باری پھیلیں اور سکڑیں۔ ٹانگوں میں اکڑاؤ۔

فائی سو سنگما 3x یا Q 'آدھے گھنٹے بعد'  
تین مرتبہ

☆ مریض کی آنکھ کسی ایک نکتے پر ٹکی رہے۔ جسم اچانک اڑ جائے۔  
سائی کوٹارو  $3x$  آدھے گھنٹے بعد تین  
مرتبہ

☆ شیر خوار بچوں میں ٹیٹس کے لئے بہترین دوا۔  
بیلا ڈونا  $2x$  یا  $1x$  آدھے گھنٹے بعد تین  
مرتبہ

☆ اعصاب کو چوٹ لگنے یا زخم کی وجہ سے ٹیٹس۔  
ہائی پرکیم  $3x$  یا  $30$  آدھے گھنٹے بعد  
تین مرتبہ  
بائیو کیمک کی کالی فاس  $3x$  اور میگنیا فاس  $3x$  بھی آدھا  
گھنٹہ بعد دینا مفید ہے۔



# حرارت کی تبدیلی

## Thermal Variations

(effects of hot and cold)

کسی مرض کی صورت میں مریض مختلف کیفیات سے گذرتا ہے۔ کبھی اسے گرمی اور کبھی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ کسی وقت گرمائش سے آرام اور کبھی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے کبھی ٹھنڈک سے فرحت اور سکون محسوس کرتا ہے اور بعض امراض ٹھنڈ اور ہوا لگنے سے بڑھتے ہیں۔ بستر کی گرمی سے بھی تکلیف میں اضافہ یا افادہ ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ مریض دوا کی کافی مقدار سے تکلیف میں اضافہ محسوس کرے۔

بیلا ڈونا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ اندرونی حرارت کے بغیر بیرونی طور پر گرمی محسوس کرے۔

اگیشیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ ٹھنڈ محسوس کرے لیکن ساتھ ہی ٹھنڈک سے اچھا محسوس کرے۔ ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بہتر محسوس کرے۔ بستر میں گرم ہونے کے بعد تکلیف بڑھے۔

لیڈم پال 30 یا 200 چار گھنٹے بعد،

تین مرتبہ

☆ مریض کسی طرح کی بھی گرمی اور دھوپ برداشت نہ کرے۔

گلوٹامین 30 یا 200 چار گھنٹے بعد،

تین مرتبہ

☆ ہر چیز پینے کے بعد سردی اور جاڑا محسوس کرے۔

کپسی کم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد،

تین مرتبہ

☆ ٹھنڈ سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

سپیا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ



☆ جلن کا احساس۔ گرمائش سے آرام آئے۔ بستر میں گرم ہونے کے بعد بستر محسوس کرے۔

آرٹک الیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

☆ ذرا سی بھی حرکت سے ٹھنڈ محسوس کرے۔ اگرچہ ٹھنڈا ہو لیکن اسے محسوس نہ کرے۔  
تین مرتبہ گرمائش سے بستر ہو۔

نکس و امیکا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ اگرچہ جسم ٹھنڈا ہو لیکن پچھلے کی ہوا لینا پسند کرے۔

کاربووٹیج 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ



# کنہنی کا تناؤ/کھچاؤ

## Tennis Elbow

کنہنی کا جوڑ نہایت حساس ہوتا ہے۔ ذرا سی بھی چوٹ لگنے سے تمام جسم میں ارتعاش سا آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ کنہنی میں اکڑاہٹ اور اعصابی درد بھی ہو جاتا ہے۔ بازو کے پٹھے اکڑنے کی وجہ سے شدید کھچاؤ اور درد ہوتا ہے۔ حرکت کرنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ انگوٹھے اور انگلیوں میں کھچاؤ۔ پھاڑنے والا درد ایسا محسوس ہو کہ کنہنی میں موج آگئی ہے یا فالج پڑ گیا ہے۔

امبراگر۔ سیا 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ محنت کرنے کے بعد بازو کانپنے لگے۔ کنہنی میں درد ہو۔ بازو اکڑ جائے۔  
رہس ٹاکس 1M یا 10M' چار گھنٹے بعد،  
تین مرتبہ

☆ کسی زناٹے یا جھٹکے کی وجہ سے کنہنی میں درد ہو۔

ایلم سپا 30' چار گھنٹے بعد

☆ پوری کنہنی میں اکڑاہٹ۔ جلد کے نیچے چیرنے والا تیز اعصابی درد۔ حرکت کرنے سے تکلیف بڑھ جائے۔

ایگریکس 30 یا 200' چار گھنٹے بعد

☆ بازو کی ہڈیوں کا چٹخنا۔ کلائی اور ہاتھ کی پچھلی ہڈیوں میں خراشدار اور کھینچنے والا درد اور جھٹکے۔ حرکت کرنے سے تکلیف بڑھ جائے۔  
روٹا 30 g یا 200' چار گھنٹے بعد



## خصیے

### Affections of Testicles

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ جوان لڑکوں کے خصیے سکڑے ہوئے یعنی ڈھیلے اور لٹکے ہوئے نہ ہوں۔  
تھائرایڈینم 1M '10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ اکڑے ہوئے اور سکڑے ہوئے خصیوں کے لئے آزمودہ دوا۔  
اورم بیور نیٹرونیٹم 3x، چار گھنٹے بعد (دو  
سے تین ماہ تک)



# دانت گرنا

## Carries of Teeth

### علامات 'دوا اور طاقت' دورانیہ

☆ بچوں کے جیسے ہی دانت نکلیں دیے ہی جلدی سے ٹوٹ جائیں۔ بستر پر پیشاب کر دیں یا بستر گھیر کر دیں۔

کریازوٹ 30 'چار گھنٹے بعد

☆ دانتوں کا گرنا۔ دانتوں میں درد اور سوزش۔

پلائینگو 30 'چار گھنٹے بعد

☆ دانتوں کا ٹوٹنا۔ مسوڑھوں سے خون جاری ہو۔ گرم اور ٹھنڈی چیزیں دانتوں میں لگیں۔

مرک سال 30 'چار گھنٹے بعد

☆ معاون دوا۔

سفیلنم 200 یا 1M 'آدھے گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

بائیو کیمک کی کلکیریا فاس 12x 'کلکیریا فاس 6x اور سلیسیا

12x بھی دانتوں کی تکلیفات کے لئے اچھی ادویات ہیں۔ ان

کے چار چار گھنٹے بعد استعمال سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

بیرونی استعمال کے لئے پلائینگو Q اور کریازوٹ Q بھی مفید

ہیں۔





## سوکھیا مسان / لاغری بچوں کا سوکھیا Marasmus

(See Emaciation also)

سوکھیا مسان کے مرض میں بچہ بہت زیادہ دست آنے کی وجہ سے کمزور و لاغر ہوتا جاتا ہے پیٹ کے غدود بڑھ جاتے ہیں اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ ٹانگیں پتلی اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ چہرہ مرجھا جاتا ہے اور جسم کی کھال لٹک جاتی ہے۔ اس مرض میں بھوک بڑھ جاتی ہے اور بچہ ہر وقت کچھ کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کھانسی بھی ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں میں نقص پیدا ہو جانے کی وجہ سے بچے کی نشوونما ٹھیک طور سے نہیں ہوتی ہے۔  
اس مرض کا سبب بچے کے پیٹ کے غدودوں میں نقص پیدا ہو جانا ہے۔ بچے کو ماں کے دودھ کے بجائے اوپرا دودھ ملنے سے بھی مرض پیدا ہوتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ معاون دوا۔ جبکہ خاندان میں دق کی ہسٹری پائی جائے۔ موسم کی تبدیلی سے بہت زیادہ حساس ہو۔

ٹوبر کو لینم 200 یا 1M ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ بہت تیزی سے لاغری ہو۔ کسی بھی چیز کے کھانے اور پینے کے فوراً بعد دست لگ جائیں۔ معدے میں جلن کا احساس ہو۔

آرسنک البم 30، چار گھنٹے بعد

☆ ٹانگوں میں زبردست لاغری۔ پٹھے چڑھ جائیں۔ گردن کمزور ہو جائے۔ سر کو نہ سہار سکے۔ پٹلی اور ڈھیلی جلد۔ دستوں کے ہونے سے کچھ بہتر محسوس کرے۔

ایرو ٹینم 30 یا 200، چھ گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ بہت زیادہ ریاح اور گیس بنے۔ مسلسل لاغر ہوتا جائے۔ مٹھائیوں کی خواہش کرے اور وہ موافق نہ آئیں۔

ار جٹم ٹائٹریکیم 30 یا 200، چار گھنٹے

بعد

☆ گوشت کھانے کی خواہش کرے۔ دودھ پینے کی خواہش کرے لیکن ہضم نہ کر سکے۔ لاغری ہو۔

کنیشیا کارب 30 یا 200، چار گھنٹے

بعد

☆ جسم میں پانی کی کمی ہو جائے۔ گردن بہت زیادہ کمزور ہو۔ قبض ہو۔ زیادہ نمک کھانے کی خواہش ہو۔ رانیں بہت کمزور ہو رہی ہوں۔ ہڈیوں میں معمولی غم پذیری ہو۔

☆ کھایا پیا ہضم اور جذب نہ ہونے کی وجہ سے لاغری۔ پاؤں میں بہت زیادہ پینہ آئے۔ مریض کو بہت ٹھنڈ لگے۔

☆ شریلی طبیعت کا مریض۔ غدودوں کی سوجن کے ساتھ لاغری۔ پیٹ بڑھ جائے۔

برٹا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار، تین مرتبہ

☆ بچوں کی لاغری۔ ذہنی طور پر کمزور۔ چڑچڑے اور اعصابی طور پر کمزور۔

☆ مریض میٹھی چیزوں اور گرم مشروبات کی خواہش کرے۔ ریاچ بہت زیادہ بنے۔ گردن اور چہرہ لاغر ہو۔

☆ لائیو پوڈیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد جوڑوں میں سوجن اور ان کی ہیئت بگڑ جائے۔ مریض اچھی طرح کھانے کے باوجود لاغر ہوتا جائے۔

☆ آئیوڈیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد ذہنی یا جسمانی محنت کے بعد کمزوری۔ ہاضمہ اچھا ہونے کے باوجود لاغری ہو۔

پکریک ایسڈ چار گھنٹے بعد

☆ شیر خوار بچوں کا سوکھیا۔

☆ نیلرم فاس 6x یا 30 چار گھنٹے بعد بچے کو اسہال لگیں۔ شدید لاغری ہو اور انتہائی کمزور ہو جائے۔ تالو یا چندیا بہت زیادہ کھلی رہے۔

☆ کلیریا فاس 12x یا 30 چار گھنٹے بعد کمر کے مرے ٹیڑھے ہو جائیں۔ آنکھ میں حینکا پن آجائے یا آنکھیں ادھ کھلی رکھے۔ آنکھ کی پتلی پھیل جائے۔ کوئی چیز نگتے ہوئے گلے میں درد ہو۔ آنتیں موٹی اور باہر کو نکلی ہوں۔

بیلاڈونا 30 چار گھنٹے بعد

☆ بچے کے دانت مشکل سے اور آہستہ آہستہ نکل رہے ہوں۔ سر پر کثیر پینہ آتا ہو۔ تالو

یا چند یا کھلی ہو۔ پیٹ بڑھ گیا ہو۔ سفید جھاگ دار دست ہو رہے ہوں۔ پٹھے اور اعصاب بد وضع ہو رہے ہوں اور ریزھ کی ہڈی میں خم آنے لگا ہو۔  
 کلیریا کارب 200 یا 1M ہفتہ وار

چھ مرتبہ

☆ زور لگانے سے پتلے یا قبض سے پاخانے ہوں۔ پسینہ بالکل نہ آئے۔ بال خشک اور بغیر چمک کے بھوسلے سے ہو جائیں۔ بولنے اور چلنے میں سستی اور آہستگی۔ دانت کاٹنا ہو۔ سر بڑا ہو۔ تالو یا چند یا کھلی ہو۔ ٹھنڈے پینے سے نما جاتا ہو۔ شدید قسم کی بھوک محسوس کرنا ہو۔ غیر معمولی اشیاء کی خواہش کرنے لگے۔

ایومنا 30 چار گھنٹے بعد

دیگر اہم ادویات : آیوڈیم، مرک سال، فاسفورس، سیپیا، تحیریڈیان، سلفر، شینی میگرا، لائیکوپوڈیم، میزیریم، فلورک ایسڈ، سلیسیا، آسٹوڈا، آرم میور، ہیپر سلف، فاسفورک ایسڈ، سمفاسٹم، وغیرہ۔



# تمباکو نوشی / تمباکو کی خواہش / عادت

## Tobacco Craving

عموماً "تمباکو نوشی کی ابتداء شہروں میں فیشن کے طور پر ہوتی ہے اور گاؤں میں معاشرتی ماحول کی وجہ سے۔ شہروں میں لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور گاؤں میں حقہ پیتے ہیں۔ ہر حال تمباکو نوشی ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ اس سے متعدد امراض خصوصاً "بھسروں کی تکلیفات پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے نظام تنفس کی بیماریاں نزلہ زکام کھانسی، دمہ، بھسروں کی ٹی بی، دل کی شریانوں کی بیماری، آنتوں میں زخم اور سرطان وغیرہ جنم لیتی ہیں۔ گلے کی خشکی، ٹانگوں کی کمزوری، پٹھوں کا درد تیز دھڑکن اور کھانسی جیسی بیماریاں بھی سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ دل کی تکلیفات اور اعصابی شریانوں کا بند ہونا بھی تمباکو نوشی کے سبب ہوتا ہے۔ اس سے نظام انہضام بھی کمزور ہو جاتا ہے اور معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تمباکو نوشی نہ کرنا اچھی صحت کی ضمانت ہوتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ سگریٹ پینے کی شدید خواہش۔ دل سے تمباکو کی طرف مائل اور متاثر۔ دمہ کی طرح سانس میں دباؤ کھچاؤ۔

کیلڈیم 30 S 'چار گھنٹے بعد

☆ تمباکو کی خواہش کم کرنے کے لئے۔ جبکہ تمباکو نوشی چھوڑنا مقصود ہو۔

ٹیا کم 30 'چار گھنٹے بعد

☆ تمباکو کھانے کے عادی لوگوں کو تمباکو سے نفرت پیدا کرنے کے لئے۔

پلائینگو 30 'چار گھنٹے بعد

☆ اگرچہ تمباکو کا عادی ہو لیکن اس کی بو برداشت نہ کر سکے۔

لو۔بیل یا انفلٹا Q 5-10 قطرے، چار

گھنٹے بعد



## نشہ کی عادت

### Addictions

نشہ آور ادویات اور منشیات کا استعمال صحت کے لئے انتہائی مضر ہے۔ عام طور پر منشیات کا عادی ایسی نشہ آور چیزوں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے جس سے اس کو سرور حاصل ہوتا ہے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کی مقدار بڑھاتا جاتا ہے اور ان کے مسلسل استعمال سے اس کے اعضاء کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ اس بری عادت کو چھڑانے کے لئے ذیل میں چند دوائیں تجویز کی جاتی ہیں۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ ایسے اشخاص جن کو منشیات کی طلب وراثت میں ملی ہو۔  
سفلینم 1M ہفتہ وار، چھ مرتبہ  
☆ الیون کی عادت۔

بریس وگلرس Q 5-10 قطرے، ہر چار گھنٹے بعد

☆ الیون کاست (Morphia)

اوپتا سیوا Q 10-20 قطرے، ہر چار گھنٹے بعد

چونکہ نشی کے اعصاب کمزور ہوتے جاتے ہیں لہذا علامات کے مطابق مندرجہ بالا ادویات کے ساتھ ساتھ اعصاب کی کمزوری کو دور کرنے کے لئے ہائیڈرکیمک کی کالی فاس 6x اور نیزم فاس 3x ہر چار گھنٹے بعد دینے سے بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

## نشے کے اثرات بد

### Bad Effects of Alcohol

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ پہلوانی کیفیت۔ بکواس کرنا۔ مسلسل اول فول بکتے رہتا۔

ہائیڈرو سائمس (Hyoscyamus) 30 یا

200 ہر 10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ تھوڑی مقدار میں منشیات استعمال کر کے بھی مریض نشے میں دھت ہو جائے خاص طور

پر بوڑھے جنہوں نے شادی نہ کی ہو۔

کوئیم میک 200' ہر چھ گھنٹے بعد' چھ

☆ منشیات کے زیادہ استعمال کے بد اثرات جس کے نتیجے میں لرزہ یا رعشہ سا طاری ہو جائے مسلسل بکواس کرے۔ گیس کی شکایت ہو۔ طبیعت میں جھنجلاہٹ اور اعصابی کمزوری۔

نکس دامیکا 30 یا 200' ہر چار گھنٹے بعد

☆ بدکردار لوگ۔ جو مبعاً" بدمعاش ہوں اور حاسد۔ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوں۔ اس وقت بھی جبکہ انہوں نے نشہ نہ کیا ہو۔

لیکے س 30 یا 200' ہر چھ گھنٹے بعد

☆ ہلپائی، جنونی، دماغی فتور والے وہی۔ فریب نظر، دھوکے اور وہم میں مبتلا جن کو اندھیرے سے ڈر لگے۔

سٹرامونیم 200 یا 1M' ہر 10 منٹ بعد' تین مرتبہ

☆ جب مریض شراب کے بغیر ذرا سا بھی کھانا ہضم نہ کر سکے۔

سلفورک ایسڈ 30' ہر چار گھنٹے بعد

☆ بہت زیادہ بکواسی۔ جس کے دماغ کی طرف خون کا بہاؤ تیز ہو جائے۔

بیلادونا 30' آدھے گھنٹے بعد

☆ ایسے مریض جو بلانوش ہوں اور ان کے ذہن میں طرح طرح کے خدشات اور خوف ہوں اور بہت زیادہ بکواس کرتے ہوں۔

اوپیم 200 یا 1M' ہر 10 منٹ بعد' تین مرتبہ

☆ ذہنی دباؤ۔ رعشہ اور لرزہ۔ خود کو زخمی کرنے پر آمادہ۔

سی سی فوگا 30 یا 200' آدھے گھنٹے بعد

☆ اکثر اوقات قبض۔ پاخانہ سخت۔ شراب کی تھوڑی مقدار سے بھی نشہ میں دمت ہو جائے۔

الیومنا (Alumina) 30 یا 0/5 اور اس سے زیادہ' ہر چار گھنٹے بعد

☆ مسلسل شراب نوشی کے بعد مریض تشدد ہو جائے۔ مارنے مرنے پر آجائے اور ضرورت سے زیادہ بولنے لگے۔

کیٹابلس انڈیکا 30 یا 200 ہر چار گھنٹے

بعد

علامات کے مطابق متعلقہ دوا کے ساتھ ساتھ اعصابی طاقت کے لئے بائیو کیمک کی کالی فاس 6x دینا مفید ہے۔

## نشہ چھڑانے کے لئے ادویات

علامات 'دوا اور طاقت' دورانیہ

☆ پانی کے بجائے شراب یا دیگر نشہ آور چیزیں پینے کی خواہش۔  
آرسنک الیم 30 ہر تین گھنٹے بعد یا  
جب ضرورت ہو

☆ نشہ اور شراب سے نفرت پیدا کرنے کے لئے۔  
انجیلیکا (Angelica) 'Q' 10 قطرے  
ہر چار گھنٹے بعد

☆ عادی نشی لوگ جن کے دل کمزور ہوں۔  
سٹرو فینٹس (Strophanthus) 'Q'  
10 قطرے ہر چار گھنٹے بعد

☆ پانی سے پیٹ میں ٹھنڈک پیدا ہو اور شراب کے ساتھ پانی ملانا پڑے۔ شراب اور نشہ کی دوسری چیزوں سے نفرت پیدا کرنے کے لئے۔

سلفورک ایسڈ 30 ہر چار گھنٹے بعد  
☆ وراثت سے ملنے والی خواہش کے لئے یا بہت زیادہ خواہش ہو شراب کے لئے۔  
سفلینم 1M یا 10M ہفتہ وار بارہ

مرتبہ

☆ اسے کمزور اور اعصابی لوگ جو نشہ کے عادی ہو چکے ہوں۔  
ایونا سیوا Q 10-15 قطرے ہر تین گھنٹے بعد یا جب ضرورت ہو

☆ جب Angelica Q سے فائدہ نہ ہو رہا ہو۔  
کمفر Q 5 قطرے، حسب ضرورت

# نبض کی تکلیفات

## Affections of Pulse

ایک صحتمند آدمی کی نبض ستر سے اسی مرتبہ فی منٹ حرکت کرتی ہے۔ اس سے کم یا زیادہ نبض چلنا کسی نہ کسی مرض کی علامت ہوتی ہے اور دونوں حالتیں قابل تشویش ہوتی ہیں۔ عام طور پر اختلاج قلب میں نبض کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ مختلف قسم کے بخاروں کے دوران میں بھی نبض تیز چلتی ہے۔ اسی طرح کمزور کر دینے والے امراض میں نبض ست ہو جاتی ہے۔ نبض کا اچھل کر چلنا، دھڑکن سے چلنا، باریک چلنا اور نبض کی حرکت کے دوران کم یا زیادہ وقفہ بھی مختلف بیماریوں کی علامت ہوتا ہے اور مرض کی تشخیص میں نبض کی کیفیت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ کھانے کے بعد تیز نبض۔

لائیکو پوڈیم 200 یا 1M 10 منٹ بعد  
تمن مرتبہ

☆ نمبر پچ (حرارت) کے غیر متناسب نبض۔

پائرو جینم 200 یا 1M 10 منٹ بعد  
تمن مرتبہ

☆ بھاری اور ست نبض۔ جسم برف کی طرح ٹھنڈا۔ کمزور کرنے والی تکلیفات میں۔

درازم 30 V آدھے گھنٹے بعد

☆ دھامکے کی طرح اور مسلسل اور تیز نبض۔ اندرونی طور پر خون کے اخراج کی صورت میں۔ ٹھنڈ کے احساس اور بے چینی کے ساتھ۔

آرسنک البم 30 یا 200 آدھے گھنٹے  
بعد، تمن مرتبہ

☆ جب بستر میں ہو تو سرعت سے چلنے والی نبض۔

سلفیورک ایسڈ 30 چار گھنٹے بعد

☆ اچھلتی ہوئی نبض۔ چلنے کے بعد۔

پٹرو لیم 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ دوران آرام سرعت سے یا لگاتار چلنے والی نبض۔

میکیشیا میور 200 10 منٹ بعد، تمن  
مرتبہ



☆ دھڑکن اور کثرت سے چلنے والی نبض۔ ٹھنڈ محسوس ہو۔ ہر چوتھی پانچویں دھڑکن کے بعد وقفہ۔

نکس دامیکا 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ آدھی رات کے بعد نبض تیز ہو۔

بنزوک ایسڈ 30 چار گھنٹے بعد

☆ ہر دوسری دھڑکن کے بعد وقفہ۔

☆ ہر تیسری دھڑکن کے بعد وقفہ۔ محنت کے بعد بے قاعدہ نبض۔ بائیں جانب لیٹنے سے وقفہ۔ شدید پیاس اور قبض۔

نیٹرم میور 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ ہر تیسری اور چوتھی دھڑکن کے بعد وقفہ۔

ٹائٹریک ایسڈ 200 '10 منٹ بعد' تین مرتبہ

☆ ہر چوتھی یا پانچویں دھڑکن کے بعد وقفہ۔

سیسی سی فوگا 30 چار گھنٹے بعد

☆ ہر چھٹی ساتویں دھڑکن کے بعد وقفہ۔

میورک ایسڈ 30 چار گھنٹے بعد

☆ ہر دسویں دھڑکن کے بعد وقفہ۔ کسی قسم کے وہم یا محنت کے بعد تکلیف بڑھے۔

جیلی میم 30 چار گھنٹے بعد

☆ دسویں سے تیرھویں نبض کے درمیان وقفہ۔

سائٹا 200 یا 1M '10 منٹ بعد' تین

مرتبہ

☆ شام کے وقت نبض ست ہو۔ پاخانہ قبض کے ساتھ ہو۔

گریفائٹس 30 یا 200 چھ گھنٹے بعد

☆ رفع حاجت کے بعد نبض تیز ہو۔

کونیم میک 200 '10 منٹ بعد' تین

مرتبہ



## بائیں جانب کی ادویات

### Left sided Remedies

ایسی ادویات جو جسم کے بائیں حصوں کے اعضاء کے لئے نہایت مفید ہیں نیچے بیان کی گئی ہیں۔ ان کا دوبارہ جائزہ لینے کے لئے کتاب میں دیئے گئے متعلقہ امراض کا مطالعہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ دوا کے وقفے کے لئے بھی متعلقہ ابواب دیکھے جائیں۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ ہینٹ بائیں جانب کے حصے پر زیادہ آنے کے لئے۔  
جیراندی 30 یا 200
- ☆ بائیں جانب کے امراض کی ایسی علامات کے لئے جو شام تین بجے کے قریب بڑھ جائیں۔  
تھوجا 30 یا 200
- ☆ بائیں طرف کے دوروں کے لئے۔  
کالمی کم 30 یا 200
- ☆ گلے کے بائیں جانب کی شکایات کے لئے۔  
لیکے سس 30 یا 200
- ☆ بائیں جانب کے بازو، ٹانگ اور پیٹ کے حصے کے لئے۔  
آسٹوڈا 30 یا 200
- ☆ بائیں جانب کی شکایات کے لئے خصوصاً "تلی کی چھن کی تکلیف کے لئے۔  
بیلز پرفنس (Bellis Perennis)  
30 یا 200
- ☆ گلے کے بائیں جانب کی شکایات کے لئے۔ گلے کی سوزش، زخم اور خناق کے لئے۔  
مرک بن آیوڈیم 30
- ☆ پیٹ کے بائیں جانب درد کے لئے جو کمر کی طرف بڑھے۔  
السونیا (Alstonia) 30 یا 200
- ☆ بائیں جانب کا گھٹیا۔ تیز درد جو کہ بائیں ہتھکڑے کے نچلے جوف کی طرف بڑھے۔  
اوکلک ایسڈ 30 یا 200
- ☆ ایسی علامات جو بائیں جانب سے شروع ہوں اور پھر دائیں جانب بھی ہو جائیں۔  
بنزوک ایسڈ 30 یا 200

☆ بائیں جانب کا سردرد۔ پانچویں اعصاب کا درد اعصاب۔

سپائی جیلیا 30 یا 200

☆ بائیں جانب کے ہاتھ اور پاؤں کا استسقا۔

کینکٹس 30 یا 200

☆ بائیں جانب کا آدھا چہرہ سرخ اور گرم اور دائیں جانب کا آدھا پیلا اور ٹھنڈا۔  
پیرس کواڈر فولیا 30 یا 200

☆ معدہ کا درد اعصاب جس کی بائیں جانب زیادہ تکلیف ہو۔

نکس وامیکا 30 یا 200

☆ بائیں جانب کی پسلیوں کے بیچ درد اعصاب جس میں بائیں جانب کا پورا بازو سن ہو جائے۔

کالیا Lat 30 یا 200

☆ دورے کا سا درد اعصاب خصوصاً "بائیں جانب جب کہ عرق النساء دائیں جانب ہو۔  
کالوسنتھ 30 یا 200

☆ پستان کے نیچے کا درد جس سے اندام نہانی کی تکلیفات کا پتہ بھی چلے۔

سی سی فوگا 30 یا 200



# دائیں جانب کی ادویات

## Right sided Remedies

### علامات 'دوا اور طاقت' دورانیہ

- ☆ دائیں جانب کے خصیت الرحم کے بڑھ جانے اور استسقا کے لئے۔  
ایس ملنیکا 30 یا 200
- ☆ شکم کے نچلے حصے کی داہنی جانب کاٹنے اور مروڑ والے درد۔  
الیو 30 یا 200
- ☆ دائیں بھسمرے کی تکلیف کے نمونیہ کے ساتھ یرقان۔  
انٹی مونیم ٹار ٹیکم 30 یا 200
- ☆ داہنے کولے اور شکم کے درمیانی مقام میں درد جس کو ذرا چھونے تک سے تکلیف بڑھ جائے۔  
بیلا ڈٹا 30 یا 200
- ☆ علامات دائیں سے بائیں کو جائیں۔  
لائیکو پوڈیم 30 یا 200
- ☆ دائیں ابرو کے اوپر درد۔ دائیں بھسمرے کا نمونیہ۔ دائیں چوڑے کا درد۔ دایاں پاؤں برف کی مانند ٹھنڈا ہو۔ دائیں شانے کی ہڈی کے نچلے کونے میں مستقل درد۔  
چیلی ڈونیم 30 یا 200
- ☆ دائیں کولے سے دائیں گھٹنے تک باہر کی جانب درد۔  
کالی کارب 30 یا 200
- ☆ عصبی درد۔ دائیں جانب نوبتی تیر لگنے اور کٹنے کا سادرد۔  
کینشیا فاس 30 یا 200
- ☆ دائیں جانب کا سر درد۔ گدی سے چل کر دائیں آنکھ پر جا ٹھہرے۔ دائیں کندھے اور بازو کا درد۔ چھاتی کے دائیں جانب کی تکالیف۔ گلے کے دائیں طرف کی تکلیف۔  
سگونیہ 30 یا 200
- ☆ حلق کا داہنا حصہ۔ داہنا خصیت الرحم۔ شکم کا داہنا حصہ ماؤف ہو۔ داہنے خصیت الرحم کے داہنی ران میں جانے والے درد اور سن ہونے کا احساس۔  
پوڈوفاللم 30 یا 200
- ☆ دائیں پستان میں درد۔  
سی سی فوگا 30 یا 200



# مختلف اوقات میں مرض میں کمی بیشی

## Time Modalities

(Aggravation of symptoms at a specific time)

ہومیو پیتھک طریقہ علاج میں مختلف اوقات میں مرض میں کمی بیشی کی علامت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مختلف امراض میں مختلف اوقات میں تکلیف کی شدت کم زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح ایک سے مرض میں بھی انفرادی طور پر ہر مریض کی تکلیف میں اضافے و اقلانے کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں۔ لہذا ایک کامیاب ہومیو معالج بیماری کی شدت اور کمی کا انفرادی طور پر جائزہ لے کر اس کی مناسبت سے دوا تجویز کرتا ہے۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ رات کے ایک اور دو بجے کے دوران تکلیف میں اضافہ ہو۔  
آرسنک البم
- ☆ رات کے دو اور تین بجے کے دوران تکلیف بڑھے۔  
کالی پنچ
- ☆ آدمی رات کے قریب تکلیف بڑھے۔ باقی اوقات میں سکون سے رہے۔  
رہس ٹاکس
- ☆ دن کے اوقات میں تکلیف میں اضافہ ہو۔  
میڈورنیم
- ☆ آدمی رات سے پہلے تکلیف بڑھے۔  
اکونائٹ
- ☆ تمام رات اور خاص طور پر ابتدائی رات میں تکلیف میں اضافہ ہو۔  
مرک سال
- ☆ رات کے وقت تکلیفات بڑھیں۔  
سفلینم
- ☆ دو بجے دوپہر کے قریب تکلیف بڑھے۔  
گلیریا کارب
- ☆ دن کے چار سے پانچ بجے کے دوران تکلیف میں اضافہ ہو۔  
کاربوونج

☆ شام چار سے چھ بجے کے دوران تکلیفات بڑھیں۔

ایس ملنیکا

☆ شام چار سے آٹھ تک تکلیف میں اضافہ ہو۔

لائیکو پوڈیم

☆ شام پانچ سے چھ بجے کے دوران تکلیف بڑھے۔

ہیپر سلف

☆ شام سات بجے کے قریب تکلیفات میں اضافہ ہو۔

رہس ٹاکس

☆ شام تین بجے کے قریب تکلیف بڑھے۔

ہیلاڈونا

☆ شام چار بجے بخار وغیرہ کی تکلیف بڑھے۔

ہلساٹلا

☆ رات کو آدھی رات سے تین بجے رات تک تکلیف میں اضافہ ہو۔

ڈرویرا

☆ دن کے گیارہ بجے کے قریب تکلیف بڑھے۔

اپی کاک، سلفر

☆ رات تین بجے کے قریب تکلیفات میں اضافہ ہو۔

ٹکس وامیکا، تھوجا

☆ صبح کے وقت تکلیف بڑھے۔

اکیشیا

☆ رات تین تا چار تکلیف بڑھے۔

ہائپریم

☆ رات تین بجے کے قریب تکلیف بڑھے۔

کالی کارب

☆ دن کے دس سے گیارہ کے دوران تکلیف بڑھے۔

ہیلی میم، نیرم میور

# صبح کے وقت کی تکلیفات

## Morning Sickness

Vomiting etc. During Pregnancy

(See travel sickness and vomiting etc. also)

### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ مسلسل متلی اور تے سخت بے چینی کے ساتھ۔ ضدی قسم کی الٹیاں جو کسی طرح بھی نہ رکیں۔

لیک ویک ڈی فلوریٹم

30 (Lac Vac def) چار گھنٹے بعد

☆ جوف شکم کے بالائی حصے پر کمزوری۔ بیہوشی سی۔ شدید قسم کی متلی اور تے۔

لو۔ بیلیا انفلٹا 6 یا 30 چار گھنٹے بعد

☆ منہ میں تری اور تھوک۔ متلی۔ زبان صاف۔ لیٹنے کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو۔

اپی کاک 30 چار گھنٹے بعد

☆ کچھ کھانے پینے کے بعد زیادہ الٹیاں ہوں۔ بے چینی۔ تھوڑا تھوڑا اور وقفے وقفے سے پانی پئے۔ نہ بجھنے والی پیاس۔

آرسنک البم، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

☆ قبض اور کمزور ذائقہ۔ متلی۔ ریاحی تکلیفات کے ساتھ لگاتار تے۔

سمفوری کارلس (Symph race)

30 چار گھنٹے بعد

☆ پانی پینے کے بعد جیسے ہی وہ معدے میں گرم ہو تو فوراً باہر نکال دے یا الٹ دے۔ پانی دیکھنے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

فاسفورس 30 یا 200 10 منٹ بعد

تین مرتبہ

☆ صبح کے وقت اور کھانے کے بعد زیادہ الٹیاں ہوں۔ بہت زیادہ ریاح بنے۔ زبان میلے ہو۔

نکس و امیکا 30 چار گھنٹے بعد

بائیو کیمک کی فیرم فاس 6x نیڑم میور 12x اور نیڑم فاس 6x

بھی مفید ادویات ہیں۔

# متضاد نوعیت کی علامات

## Opposite Characteristic Syptoms

### علامات 'دوا اور طاقت' دورانہ

- ☆ کھانسی ٹھنڈے مشروبات سے بڑھے۔  
سپانچیا ٹوشا
- ☆ کھانسی کو ٹھنڈے مشروبات سے افادہ ہو۔  
کوپرم میٹلیکم
- ☆ حیض سے پہلے اور دوران حیض قبض۔  
سلیسیا
- ☆ حیض سے پہلے اور حیض کے دوران پاخانے لگیں۔  
بووشا، ورائزم الیم، امونیا کارب
- ☆ دانتوں کی جڑیں گرنے لگیں۔  
تھوجا، میزیریم
- ☆ دانتوں کے کنارے جھڑیں۔  
سینی سیکریا، مرک سال
- ☆ کھلی ہوا سے گرم کمرے میں آنے سے کھانسی بڑھے۔  
برائی اونیا
- ☆ گرم کمرے سے کھلی ہوا میں آنے سے کھانسی بڑھے۔  
فاسفورس
- ☆ بچہ سارے دن روئے چلائے اور تمام رات سوئے۔  
لائیکو پوڈیم
- ☆ بچہ سارے دن سکون سے رہے اور سوئے اور رات بھر روئے اور بے چین رہے۔  
سورنیم، جلاپا
- ☆ ٹھنڈے پانی سے دانت کے درد کو افادہ ہو۔  
کافیا، نیرم سلف، سمیتو
- ☆ گرم پانی سے دانت کے درد کو افادہ ہو۔  
کمیشیا فاس



- ☆ تر منہ ہونے کے باوجود پیاس لگے۔  
مرک سال
- ☆ منہ خشک ہو لیکن پیاس ندارد۔  
پلساٹلا
- ☆ سانس اندر لینے سے کھانسی بڑھے۔  
سپا نیجا ٹوشا
- ☆ سانس خارج کرنے سے کھانسی بڑھے۔  
اکوٹائٹ، کاشی کم
- ☆ سو کر اٹھنے کے بعد پینہ آئے۔  
مہو کس نانگرا
- ☆ جیسے ہی سونے کے لئے آنکھیں بند کرے پینہ آ جائے۔  
کوٹیم، چائنا
- ☆ بیماریاں دائیں جانب سے شروع ہو کر بائیں جانب کو پھیلیں۔  
لائیکو پوڈیم
- ☆ بیماریاں بائیں جانب سے شروع ہو کر دائیں طرف بڑھیں۔  
لیکے کس
- ☆ دوہرا ہونے سے درد میں کمی ہو۔  
کالوسنتھ
- ☆ پیچھے کی جانب مڑنے سے درد میں کمی ہو۔  
ڈائس کوریا ۷
- ☆ بے ضرر نزلہ زکام میں خراشدار پانی بنے۔  
یوفرزیا
- ☆ بے ضرر پانی کے ساتھ خراشدار نزلہ زکام۔  
ا۔ لیم سپا
- ☆ حرکت کرنے سے درد کی شدت میں اضافہ ہو۔  
برائی اونیا الیم
- ☆ حرکت کرنے سے درد میں کمی واقع ہو۔  
رہس ٹاکس

# کچھ وقفے کے بعد پرانی علامات ظاہر ہونے کا رجحان

## Periodicity

(Periodical appearance of symptoms)

ایسی ادویات جو مخصوص اوقاتِ نوعیت کی حامل ہیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ ان ادویات کی تفصیلات متعلقہ امراض کے بیان میں دی جا چکی ہیں۔ یہاں صرف چند اہم ادویات کا ذکر کیا گیا ہے۔

### علامات 'دوا اور طاقت' دورانیہ

ٹریٹولا ہسپانیہ

☆ سالانہ۔

کوئلس ہرائڈس (مقررہ وقفے سے

☆ ہر موسم بہار میں۔

شکایت واپس لوٹے۔ چودھویں روز

سونے کے بعد۔ لیجے کس

آئرس ۷

☆ آنھویں روز۔

رہس ٹاکس (مقررہ وقفے سے شکایت

☆ معمول میں۔

واپس لوٹے 'اٹھائیسویں روز۔ نکس

وامیکا

سفلیئم

☆ تمام رات۔

میڈورینم

☆ تمام دن۔

پروڈیم

☆ ہر سرد موسم میں۔ جلد پھٹ جائے۔

ایومنا

☆ ہر صبح کھانسی۔

نیزم سلف

☆ نو بجے اٹھنے پر دست آئیں۔

☆ صبح پانچ بجے سے دست لگیں یا اس میں اضافہ ہو۔

سلفر

☆ چوتھے دن آدمی رات کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو۔

آرسنک البم

☆ تکلیف میں دن کے دو سے چار بجے کے دوران اضافہ۔

کالی کارب

☆ تین سے پانچ بجے کے دوران تکلیف بڑھے۔

کالی بچ

☆ صبح آٹھ سے گیارہ بجے کے دوران تکلیف میں اضافہ۔

نیٹرم میور

☆ شام چھ سے سات بجے کے دوران۔ کثرت سے پیشاب آئے۔

برائی اونیا الہم

☆ مقررہ وقفے کے ساتھ شکایت واپس لوٹے۔ شام کے وقت، گرمائش سے۔

ہلساٹلا

☆ مقررہ وقفے سے شکایت واپس لوٹے۔ تیسرے دن، اکیسویں دن، بخار وغیرہ۔

چائنا سلف

☆ مقررہ وقفے سے شکایت واپس لوٹے۔ ساتویں دن۔ صبح کے وقت۔

سلفر

☆ مقررہ وقفے سے شکایت لوٹے۔ دسویں روز۔

فاسفورس



# مختلف امراض کو دبائے جانے کے اثرات بد

## Bad effects of Suppressions

(See other relevant ailments also)

دنیا میں ہر شخص کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہوتا ہے اور اس کا صحیح علاج ہو جانے کی صورت میں وہ بیماری رفع ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ بعض امراض کی صحیح تشخیص نہ ہونے اور غلط طور پر مرض کو دبا دینے کی وجہ سے دوسرے امراض یا پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

☆ لیکوریا کو دبائے جانے کی وجہ سے بواسیر ہو جائے۔

اسونیم میور 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

☆ پاؤں کے پسینے کو دبائے جانے کے نتیجے میں تشنگ یا موتیا ہو جائے۔

سلیسیا 200 یا 1M 10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ توہین، ہلک اور بے عزتی کے اثرات بد۔

شینی سیکریا 200 یا 1M 10 منٹ بعد،

تین مرتبہ

☆ پھنسیاں پھوڑے اور دانے دبائے جانے کی وجہ سے جنون یا بدحواسی۔

زنگم سیلیکم 200 یا 1M 10 منٹ

بعد، تین مرتبہ

☆ آتشک کو دبائے جانے کی وجہ سے بہرہ پن ہو جائے۔

کریازوٹ 30 یا 200 10 منٹ بعد،

تین مرتبہ

☆ سوزاک کے بعد کے اثرات۔

میڈورنیم 200 یا 1M 10 منٹ بعد،

تین مرتبہ

☆ دستوں کو روک دینے کی وجہ سے جوڑوں کا درد ہو جائے۔

ایرو-نیم 30 یا 200 چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ



☆ پاؤں کے پھیند کو دبانے کی وجہ سے دمہ ہو جائے۔

اولیم اینی مل (Oleum an) 200

10 منٹ بعد، تین مرتبہ

☆ پھوڑے بھنسیوں اور دانوں کو دبانے کی وجہ سے خارش ہو جائے۔

آرسنک البم 30 یا 200، چار گھنٹے بعد،

تین مرتبہ

☆ خناق، لال بخار یا ٹائی فائڈ کو دبانے کے نتیجے میں گردے کی تکلیف ہو جائے۔

ٹیر-بسم Q یا 30، چار گھنٹے بعد

☆ جلنے کے بعد کے اثرات۔

کاشی کم 30 یا 200، ہفتہ وار، تین

مرتبہ

☆ پھوڑے بھنسی اور دانوں کو دبانے کی وجہ سے بے حسی اور بدحواسی۔

سلفر 200 یا 1M، 10 منٹ بعد، تین

مرتبہ

☆ پھوڑے بھنسی اور دانے دبانے کی وجہ سے اینٹھن اور کھچاؤ۔

زنگم میٹلیکم 200، 10 منٹ بعد، تین

مرتبہ



# مانع امراض ادویات

## Prophylactics

(Preventive Remedies)

علامات 'دوا اور طاقت' دورانہ

- ☆ قلو۔  
انفلوآنزہ 30 یا 200 10 منٹ بعد  
تین مرتبہ پہلے دن 'آرسنک الیم 6  
دوسرے روز سے صبح شام
- ☆ لمبیرا۔  
لمبیرا 200 off یا 1M 10 منٹ بعد  
تین مرتبہ لمبیرا off کی ناکامی کی صورت  
میں فیروز میور 200  
لیتھیرس سیوا (Lathyrus Sat)
- ☆ پولیو۔  
200 پہلے مہینے میں ایک خوراک (ہفتہ  
دار تین مرتبہ) دوسرے مہینے 1M  
تیسرے مہینے 10M کی ایک ایک  
خوراک
- ☆ چچک۔  
ہیڈائٹا 30 یا 200 ایک مرتبہ 'دو  
تین دن تک چھ مرتبہ  
کوہنم بیلیکم 30 یا 200 تین دن
- ☆ کارا۔ (ایضہ)  
☆ یرقان۔  
مرک سال 200 پہلے دن (10 منٹ  
بعد تین مرتبہ) اگلے دن سے کالی میور  
6x ہار کھئے بعد
- ☆ آشوب چشم۔  
طاووتا 30 صبح شام 'باقی تین دن (چھ  
مرتبہ)
- ☆ کالی کمانی۔  
پرتوسن (Pertussin) 200 یا 1M  
10 منٹ بعد 'تین مرتبہ
- ☆ سردی لگنے کے لئے۔  
اکوٹنٹ 6 یا 30 شروع میں کوہے  
کھئے بعد اور بعد ازاں چھ کھئے بعد  
ساتھ ہی فیروز کاس 6x 30 کھئے بعد

☆ کن پڑے۔

پروٹی ڈی نم (Parotidinum)

200 ایک خوراک اور پلوکارپس

(Pilocarpus) 6 گھنٹے بعد چھ مرتبہ

ویرو لینم 200 10 منٹ بعد تین مرتبہ

ویرو لینم ناکام ہونے کی صورت میں

انٹیم موویم ٹارٹ 10 منٹ بعد تین

مرتبہ

کلکیریا فلور 12x چار گھنٹے بعد اور

ساتھ ہی نیٹرم میور 6x + کلکیریا فاس

6x + کالی فاس 6x - ہر دوا کی دو گولی

صبح شام

بیلا ڈونا 200 ہفتہ وار تین مرتبہ

بیلا ڈونا 30 تین گھنٹے بعد چھ مرتبہ

فاس 12x تین گھنٹے بعد

آرسنک البم 200 10 منٹ بعد تین

مرتبہ

ڈیپتھرینم (Diptherinum) 200 یا

1M ایک خوراک

لیڈم پال 200 اور ہائپریمکم 200 کے

بعد دیگر تین گھنٹے بعد ایک دوا تین مرتبہ

بریا کارب 200 یا 1M پندرہویں روز

چھ مرتبہ

ٹوبرکولینم 10M K پہلے مہینے میں 50M

دوسرے مہینے اور سی ایم تیسرے مہینے

ہر مرتبہ ایک خوراک

ٹائی فائیڈنیم (Typhoidinum)

200 یا 1M 10 منٹ بعد تین مرتبہ

کیسی کم 30 چھ گھنٹے بعد پہلے تین

چار روز اور بعد میں کلکیریا فلور 30x

چھ گھنٹے بعد

ٹیرنٹولا ہسپانیہ 30 یا 20 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ کالا موتیا۔

☆ دماغی بخار۔

☆ دماغ کی تھیلیوں کا ورم۔

☆ معدے اور انتڑیوں کا ورم۔

☆ خناق۔

☆ پشش۔

☆ ناسل (گلے کے اندر دوں کا ورم)۔

☆ تپ دق۔

☆ ٹائی فائیڈ بخار۔

☆ فلیریا۔

☆ پلگ (طاعون)۔

# خصوصی علامات کے حامل امراض

## Peculiar symptoms

☆ کوکے چبانے کی خواہش۔

سکوٹا 30 V یا 200 'چھ گھنٹے بعد

☆ قبض کی حالت میں بہتر محسوس کرے۔

کلیریا کارب 200 'ہفتہ وار' تین

مرتبہ

☆ ہمیشہ کسی شدید بیماری کے حملے سے پہلے بہتر محسوس کرے۔

سورنیم 200 یا 1M 'پندرہویں روز'

تین مرتبہ

☆ 'سر' سینے اور پیٹ میں کھوکھلا پن محسوس کرے۔

کوکولس انڈیکا 30 'چار گھنٹے بعد

☆ بستر بہت سخت محسوس ہو۔

آرنیکا 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ ضرورت سے زیادہ باتونی۔ موضوعات بدل بدل کر بولتا رہے۔

لیکے کس 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین

مرتبہ

☆ ناپنے کے بعد یا کوئی مشقت کرنے کے بعد بہتر محسوس کرے۔

سپیا 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین مرتبہ

☆ اپنی شکایات کے بارے میں سوچتے ہوئے بہتر محسوس کرے۔

کنفر 30 'چار گھنٹے بعد

☆ ناک کے سوراخوں کے اگلے حصوں کا پچھلے کی طرح حرکت کرنا۔

لائیکو پوڈیم 30 یا 200 'چار گھنٹے بعد

☆ کافی پینے کے بعد ہر قسم کی علامات میں اضافہ ہو۔

کاشی کم 200 یا 1M 'ہفتہ وار' تین

مرتبہ



## انسدادی ٹیکہ کے امراض

### Affections of vaccination

ویکسین : مردہ یا لاغر بیکٹریا کے خلیوں پر مبنی یا ان سے حاصل کردہ جوہریا عرق جو بعض امراض کے تدارک کے لئے انسدادی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح انسانی بدن کو جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ تنہا ویکسین تین امراض کو روکتی ہے۔ یعنی خناق، ٹیسس اور کالی کھانسی کو۔ دیگر امراض کے لئے بھی ویکسین ہوتی ہیں۔ مثلاً "پولیو" سے ہین۔ ساک اور بی سی جی وغیرہ۔

کسی مملک بیماری بالخصوص چچک کا خاص طریقہ سے تیار کیا ہوا زہریلا مادہ جس کا ٹیکہ لگانے سے انسان اس بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانہ

☆ (Vaccination) ٹیکے کے اثرات بد کے لئے۔ چچک کے انسداد کے لئے اعلیٰ ترین دوا۔

تھو جا 200 OC یا 1M '10 منٹ بعد'

تین مرتبہ

☆ جب ویکسینیشن اثرات بد کو رفع کرنے میں غیر موثر ہو جائے۔

انٹی موٹیم ٹارٹ 200، ایک خوراک

☆ ویکسینیشن کے سالہا سال بعد تک جلد خشک اور کھردری رہے۔

میلنڈرینیم 200، ہفتہ وار، چھ مرتبہ

ویکسی نیم 200، ہفتہ وار، چھ مرتبہ

ایس ملیفکا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد'

تین مرتبہ

☆ ویکسینیشن کے بعد ایگزیمہ اور دانے نکل آئیں جن میں خارش ہو۔

میزیریم 30، چار گھنٹے بعد

سلیسیا 30 یا 200، چار گھنٹے بعد، تین

مرتبہ

☆ ویکسینیشن کے بعد چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں سے دانے اور خارش ختم کرنے کے لئے۔

سار ساپریلا 30، چار گھنٹے بعد

☆ جلد کے متاثرہ حصوں کی سوزش اور بخار کے لئے۔

بیلا ڈوتا 30، چار گھنٹے بعد، تین مرتبہ

## پیشہ ورانہ امراض

### Occupational Ailments

ہر شخص کے پیشے کی مناسبت سے اس کی زندگی کے معمولات پر مختلف قسم کے اثرات پڑتے ہیں۔ چنانچہ صحت پر بھی دماغی اور جسمانی لحاظ سے پیشے کا اثر ہوتا ہے۔ مثلاً "زیادہ بیٹھ کر کام کرنے والے لوگوں کو اکثر معدے کے امراض کی شکایات ہو جاتی ہیں۔ ذہنی اور جسمانی محنت کرنے والے اشخاص کو تھکن، نزلہ زکام اور بخار وغیرہ کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ گردوغبار اور گندے ماحول میں کام کاج کرنے والے لوگ اکثر سانس کی تکلیفات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ زیادہ بولنے اور تقریر کرنے والے افراد گلے کی تکلیفات کا شکار ہوتے ہیں۔

#### علامات، دوا اور طاقت، دورانیہ

- ☆ اساتذہ اور کاروباری حضرات کی دماغی تھکن اور سر درد۔
- ☆ بکرک ایسڈ 30، چھ گھنٹے بعد
- ☆ گانے والوں اور مقررین کی تھکاوٹ۔
- ☆ جلیسی میم 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ جولاہوں یا بنائی کرنے والوں کے لئے۔
- ☆ گاسی میم 30، چھ گھنٹے بعد
- ☆ ایکٹروں۔ نیلاہی کی آواز لگانے والوں۔ تقریر کرنے والوں اور مولویوں اور پادریوں کے لئے۔
- ☆ اورم ٹری فائلیم 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ ذہنی اور جسمانی دباؤ کی وجہ سے کمزوری۔
- ☆ کوکا Q 5 تا 10 قطرے، کالی فاس 6x
- ☆ چار گھنٹے بعد
- ☆ کونکے کی کان میں کام کرنے والوں کے لئے۔ کونکے کا گرد سانس کے ساتھ داخل ہونے کی وجہ سے دمہ۔
- ☆ نیٹرم آر سکیم 30، چار گھنٹے بعد
- ☆ پانی میں کام کرنے اور کپڑے دھونے والی خواتین کے لئے۔
- ☆ بیٹھ کر کام کرنے والوں۔ فکر مند، عیس کی شکایت والوں کے لئے۔ کھانسی۔ کتابی کیڑوں یعنی بہت زیادہ لکھنے پڑھنے والے لوگوں کے لئے۔ تمنائی پسند لوگوں کے لئے۔
- ☆ نکس وامیکا 30، چھ گھنٹے بعد

☆ مہاجرین۔ راگ ترتیب دینے والے۔ شعر کہنے والے اور قبض میں جلا لوگ۔  
پلاٹینا 200 یا 1M چار گھنٹے بعد تین

☆ پتھر کا کام کرنے والے۔ کھانسی۔ دم۔ بھیسروں کی تکلیفات سینے کی انفیکشن وغیرہ کے لئے۔

سلیسیا 6x یا 30 (احتیاط کے ساتھ استعمال کرائی جائے) چھ گھنٹے بعد

☆ زیادہ مطالعہ کرنے والے یا پڑھا کو قسم کی لڑکیوں لڑکوں اور لوگوں کے سر درد کے لئے۔

کلیریا فاس 6x یا 30 چھ گھنٹے بعد

☆ مولویوں اور پادریوں یا مذہبی مقررین کے لئے جن کے گلے بیٹھ جائیں۔ کپڑے دھونے والی خواتین کے دانت درد کے لئے۔

فاسفورس 30 یا 200 چار گھنٹے بعد

تین مرتبہ

☆ ملاحوں کے لئے۔ سمندر میں جانے سے دم کی تکلیف کو افادہ ہو۔  
برومیم 30 چار گھنٹے بعد

☆ پینٹرز اور رنگ سازوں کی دوا۔

پلمبر میٹلیکم 30 چھ گھنٹے بعد

☆ نرسوں کے لئے جو مسلسل کام کرنے اور جاگنے کی وجہ سے تھک گئی ہوں۔

کوکولس انڈیکا 30 چھ گھنٹے بعد

☆ درزیوں کے لئے دوا۔ مزدوروں کے بھاری بوجھ اٹھانے کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکلیفات۔

روٹا 30 g چھ گھنٹے بعد

☆ پاؤں نازک اور کمزور سے ہوں خصوصاً "سیلز گرل وغیرہ کے لئے۔

سکوٹلا 30 چھ گھنٹے بعد

☆ ایسی ملازم پیشہ لڑکیاں جو گاؤں سے آئی ہوں اور خون کی کمی کا شکار ہو جائیں۔

پلساٹلا 30 چھ گھنٹے بعد

☆ لوہاروں یا ٹیکڑی میں کام کرنے والے لوگوں کے لئے جن کو آنکھوں اور عصب بینائی کی تکلیف ہو۔

مرکیورس سال 30 چار گھنٹے بعد



# آپ کیا چاہتے ہیں؟

ہومیوپیتھک و بائیو کیمک ادویات

ہومیوپیتھک کتب و گائیڈس

ملک شوگر، گولیاں، ٹکیاں یا

ہومیوپیتھک سے متعلقہ کوئی اور چیز مثلاً

سٹیٹو سکوپ، بلڈ پریشر ناپنے کا آلہ اور ڈاکٹری

کوٹ وغیرہ۔ اور اسے ہاں تشریف لائیں۔

رحیم ہومیوپیتھک سٹور اینڈ کلینک

فٹ فلور لاہور آرٹ پریس بلڈنگ بالمقابل جالندھر روٹی چور

۱۵، نیوانار کلی، لاہور۔ فون ۴۳۵۴۵۱۳-۴۳۵۱۸۹۸